

294

-1

中醫百日通

中國醫藥 入門叢書 幼科入門

上海
中西醫藥書局印行

5	
083 (1-16)	
11	

叢書
總目

診脈入門	內經入門	女科入門	外科入門
辨舌入門	金匱入門	產科入門	傷科入門
藥性入門	傷寒入門	痘科入門	喉科入門
湯頭入門	溫病入門	幼科入門	眼科入門

【附 疔科】

中國醫藥
入門叢書
(幼) (科) (人) (門)

上海
中西醫藥書局印行



南京中医药大学图书馆版权所有


中國醫藥入門叢書

中醫百通六十種

● 眼科入門	● 喉科入門	● 傷科入門	● 外科入門	● 痘科入門	● 幼科入門	● 產科入門	● 女科入門	● 溫病入門	● 傷寒入門	● 金匱入門	● 內經入門	● 湯頭入門	● 藥性入門	● 辨舌入門	● 診脈入門
定價洋三角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋五角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角	定價洋三角	定價洋四角

附
外科
疔科

全部六十種加錦套定價洋伍圓正



外埠函購注意

本局發行各類書籍，依照定價大都為特價六折發售，外埠函購加寄費一成，如蒙惠顧，請直接函寄「上海望平街中西書局總店」即妥，郵票代洋十足通用，如需圖書目錄函索即寄。

編輯者 陳景歧
校閱者 吳嘉寶
發行者 吳駿公
印刷者 中西書局
發行所 上海望平街中市
中西書局總店

中國醫藥
入門叢書

幼科入門目錄

幼科雜病心法要訣

四診總括

察色

聽聲

審病

切脈

虎口三關部位

脈紋圖

虎口三關部位脈紋形色

初生門

驚風門

癩

證門

疳證門

吐證門

瀉證門

感冒門

瘟疫門

暑證門

霍亂門

痢疾門

瘧疾門

咳嗽門

喘證

門

痰證門

疝證門

淋證門

頭痛門

腹痛門

黃疸門

水腫門

腹脹門

發熱門

積滯門

癰疾門

汗證門

失血門

雜證門

中國醫藥
入門叢書
幼科入門

【一】幼科雜病心法要訣

【四診總括】兒科自古最爲難。毫釐之差千里愆。氣血未充難據脈。神識未發不知言。惟憑面色識因病。再向三關診熱寒。聽聲審病兼切脈。表裏虛實隨証參。

面部部圖



面部五臟位圖



【察色】欲識小兒百病原。先從面部色詳觀。五部五色應五藏。誠中形外理昭然。額心顏腎鼻脾位。右腮屬肺左屬肝。青肝赤心黃脾色。白爲肺色黑腎顏。青主驚風赤火熱。黃傷脾食白虛寒。黑色主痛多惡候。明顯濁晦輕重參。部色相生爲病順。部色相尅病多難。相生實者邪助病。相尅虛者正難堪。天庭青暗驚風至。紅主內熱黑難痊。太陽青驚入耳惡。印堂青色驚瀉纏。風氣青驚紫吐逆。兩眉青吉紅熱煩。鼻赤脾熱黑則死。唇亦脾熱白脾寒。左腮赤色肝經熱。右腮發赤肺熱痰。承漿青驚黃嘔吐。黑主抽搐病纏綿。此是察色之大要。還將脈證一同參。

【聽聲】診兒之法聽五聲。聆音察理始能明。五聲相應五藏病。五聲不和五藏情。心病聲急多言笑。肺病聲悲音不清。肝病多呼多狂叫。脾病歌聲音顫輕。腎病聲呻長且細。五音昭著證分明。啼而不哭知腹痛。哭而不啼

將作驚。嘔煎不安。心煩熱。嘔聲聲重。感寒風。有餘聲。雄多壯厲。不足聲短。怯而輕。多言體熱。陽府證。懶語身冷。陰藏形。狂言焦躁。邪熱盛。譫語神昏。病熱凶。鴨聲在喉。音不出。直聲無淚。病將傾。虛實寒熱。從聲別。聞而知之。無遁情。

【審病】審兒之病。貴詳參。要在安煩苦欲間。能食不食。渴不渴。二便調和通祕。發熱無汗。爲表病。內熱便鞭。作裏看。安煩晝夜陰陽證。欲苦冷煖。定熱寒。能食不食。胃壯弱。渴與不渴。胃濕乾。便稠黏穢。爲滯熱。尿清不赤。乃寒占。耳尻肢涼。知痘疹。指梢發冷。主驚癇。肚腹熱悶。乃內熱。四肢厥冷。是中寒。眉皺曲啼。腹作痛。風熱來臨耳。熱纏。腹痛須按軟與鞭。喜按不喜。虛實參。用保起子。誠心辨。對證施方。治不難。

【切脈】小兒週歲當切脈。位小一指。定三關。脉浮輕取。皮膚得。沉脈重取。

筋骨間。一息六至平和脈。過則爲數減遲傳。滑脈如珠多流利。澹脈滯澹往來艱。三部無力爲虛脈。三部有力作實言。中取無力爲芤脈。微脈微細有無間。洪脈來盛去無力。數緩時止促結占。緊脈左右如轉索。弦則端直張弓弦。浮爲在表外感病。沉爲在裏內傷端。數爲在府屬陽熱。遲爲在藏乃陰寒。滑痰洪火微怯弱。弦飲結聚促驚癇。芤主失血澹血少。沈緊腹痛浮感寒。虛主諸虛不足病。實主諸實有餘看。痘疹欲發脈供緊。大小不勻中惡勦。一息三至虛寒極。九至十至熱極炎。一二十一十二死。浮散無根沉伏難。表裏陰陽虛實診。惟在兒科隨脈參。


虎口三關部位脈紋圖

風關次指第一節氣關
次指第二節命關次指
第三節虎口又手處男
先看左手次指內側女
先看右手次指內側


圖手左 圖手右




形指射關透 形珠長




形甲射關透 形珠流




形字乙 形裏反弓




形環 形蛇去




形鉤如曲二 形外反弓




形蟲曲 形蛇來




形蟲如曲三 形左向斜紋



形蟲亂 形鎗 形骨魚 形針



形字水 形右向斜紋



【虎口三關部位脈紋形色】初生小兒診虎口。男從左手女右看。次指三節風氣命。脈紋形色隱隱安。形見色變知有病。紫屬內熱紅傷寒。黃主脾病黑中惡。青主驚風白是疳。風關病輕氣關重。命關若見病多難。大小曲紫傷滯熱。曲青人驚走獸占。赤色水火飛禽撲。黃色雷驚黑陰癰。長珠傷食流珠熱。去蛇吐瀉來蛇疳。弓裏感冒外痰熱。左斜傷風右斜寒。鉞形槍形生痰熱。射指射甲命難全。紋見乙字爲抽搐。二曲如鈎傷冷傳。三曲如蟲傷硬物。水紋咳嗽吐瀉環。積滯曲蟲驚魚骨。形似亂蟲有蛔纏。脈紋形色相參合。醫者留神仔細觀。

初生門

【拭口附下胎毒法】拭口須用臘脂法。穢淨方無口病生。古云未啼先取穢。只緣未察此中情。

【甘草法】甘草之法自古稱能解諸毒性味平。濃煎頻令兒吮服。免使胎毒蘊腹中。

【黃連法】素稟胎熱蘊於中。惟有黃連法最靈。水浸濃汁滴口內。臍糞胎毒自此清。

【珠蜜法】珠蜜鎮神利腸胃。清熱防驚大有功。胎熱便秘皆堪用。稟賦怯弱慎而行。

【豆豉法】怯弱之兒豆豉法。宣發胎毒功最良。兒生冬月亦宜此。服取濃汁當乳嘗。

【斷臍】臍帶剪下卽用烙。男女六寸始合宜。烙臍灸法防風襲。胡粉封臍爲避濕。

【胡粉散】胡粉 甌帶灰 乾姜 白石脂 棉灰各等分 麝香少許

右共爲細末。每用一錢。敷臍上封之。

【烙臍餅子】

豆豉 黃蠟等分

麝香少許

上以豆豉麝香研勻。鎔蠟量

臍大小。捻爲餅灸用。

【浴兒】浴兒之法五枝湯。冬夏寒溫適可當。加猪胆汁去穢污。且滋肌膚。免生瘡。

【不啼】小兒生下不能啼。俗語名之爲草迷。多因臨產難生育。或值嚴寒氣所逼。氣閉不通。聲不出。奄奄呼吸。命須臾。氣閉不通。葱鞭背。寒逼急。用火熏臍。

【鞭背法】小兒初生氣不通。奄奄呼吸。少啼聲。用葱鞭背。輕輕擊。須臾聲發。可回生。

【熏臍帶法】小兒生下或冒寒。氣閉無聲。啼則難。油撚熏臍。休剪帶。暖氣

入腹自通安。

【不乳】兒生能乳本天然。若不吮兮必有緣。腹中穢惡未下淨。或在胎中素稟寒。穢惡不淨一捻效。胎寒不乳勻氣先。若更面青肢冷厥。此是寒虛理中煎。

【一捻金】生大黃 黑丑 白丑 人參 檳榔各等分 上爲細末。每少許。蜜水調服。

【勻氣散】陳皮 桔梗各一錢 炮薑 砂仁 炙甘草各五分 木香三分 右共爲細末。每服五分。紅棗煎湯調服。

【理中湯】人參 白朮土砂 乾姜 炙甘草 引用紅棗肉。水煎服。

方歌

嘗。

【眼不開】兒生眼閉不能開。皆因脾熱受於胎。內用地黃湯最妙。熊胆洗目効靈哉。

【生地黃湯】生地黃 赤芍藥 當歸 川芎 生甘草 天花粉 水

煎服。

方歌

目閉不開胎熱成。生地黃湯赤芍芎。當歸花粉生地草。水

煎速服莫消停。

【熊膽洗法】熊胆 黃連各少許 用滾湯淬洗。其目自開。

【吐不止】兒吐不止何因生。穢惡停留胃內成。或由稟賦胎寒熱。或因生時感寒風穢惡。一捻金散下。外感香蘇溫散能。熱延酸黏運陳治。寒吐清沫用理中。

【一捻金方見不乳】

【香蘇飲】藿香 蘇葉 厚朴 姜炒 陳皮 枳殼 麩炒 茯苓 木香 煨 炙

甘草。引用生姜水煎服。

方歌

香蘇飲用藿香蘇。厚朴陳皮枳殼茯。甘草

木香一併入。生姜爲引吐能除。

【黃連二陳湯】半夏姜製

陳皮

茯苓

生甘草

黃連姜炒

引用生姜

水煎服。

方歌

兒生防熱吐頻頻。醫治須當用二陳。半夏陳皮茯苓草。姜

連加入效如神。

【理中湯方見不乳】

【不小便】小便不通胎熱壅。導赤八正二方從。外用豆豉貼臍法。須臾小

便自能通。

【導赤散】生地黃

本通

生甘草

引用燈心竹葉。水煎服。

加黃連滑石赤苓更妙。

方歌

方名導赤妙難言。生地木通甘草煎。引用

燈心共竹葉。清熱利水便如泉。

【八正散】扁蓄 瞿麥 滑石飛 木通 赤苓 車前子 生大黃

生梔子 引用燈心水煎服。方歌八正散治小便祕。扁蓄瞿麥車前利。

木通滑石赤茯苓。大黃梔子合成劑。

【豆豉膏】淡豆豉一勺 田螺十九個 上搗爛。用芭蕉汁調貼臍上。

【不大便】大便不通名鎖肚。皆緣熱毒受胎中。珠蜜捻金俱可用。急嘔五心臍下通。

【珠蜜法方見拭口】

【一捻金方見不乳】

【大小便不通】二便俱祕胎熱極。木通散與紫霜丸。行熱開結真神妙。口撮之法悉如前。

【木通散】車前子 扁蓄 瞿麥 木通 赤苓 山梔 滑石飛 黃芩

生甘草 大黃 引用燈心水煎服。或入薄荷同煎。方歌 二便閉兮如

何醫。木通散用甚爲奇。車蓄瞿通苓梔子。滑苓甘草太黃宜。

【紫霜丸】代赭石一兩火煨醋浸三五次研 赤石脂一兩 杏仁六十粒炒去皮尖

巴豆三十粒去油膜 右爲末。飯糊爲丸如麻子。每日服三丸。白水下。

【肛門內合】有因熱毒肛門結。或是內合無隙通。消毒宜服黑白散。脂瞞
簪通導法精。

【黑白散】黑牽牛半生半炒 白牽牛半生半炒 生大黃 檳榔 陳皮各

五錢 生甘草三錢 元明粉一兩 右除檳榔不過火。餘五味或晒或焙。仍
合檳榔爲末。同元明粉入乳鉢內研細。每服五分至六七分。溫蜜湯調
化。

【蘇合香丸】蘇合香油五錢入安息香內 安息香 一兩另爲末用無灰酒半斤熬膏