

吳克潛編

腸胃病與痔瘡病

上海大眾書局印行

中華民國二十五年四月重版

腸胃病與痔瘡病

全

冊

定價七角

〔外埠酌加郵費匯費〕

編輯者 吳克潛

發行人 樊劍剛

印刷者 大眾書局

出版者 大眾書局

總發行所 上海四馬路 大眾書局

代售處 各省各大書局



1954

南京中医药大学图书馆版权所有

國醫

萬病自療叢書

腸胃痔瘡病

目次

第一章 腸胃病

A 通論

B 分類

吐瀉

脹痛

霍亂

窄狹

奇癢

關格

失血

一

二

二

六

八

一

三

三

五

第二章 腸病

A	通論	一七
B	分類	一八
	腹痛	一八
	腹脹	二〇
	瀉利	二三
	痢疾	二八
	腸覃	三三
	腸鳴	三四
	腸癰	三五
	腸風	三六
	腸出	四〇

第三章 胃病

腸癰·····	四一
便結·····	四四

A 通論·····	四七
-----------	----

B 分類·····	四七
-----------	----

胃脹·····	四七
---------	----

嘔吐·····	四八
---------	----

胃呃·····	五二
---------	----

胃風·····	五三
---------	----

反胃·····	五四
---------	----

胃痛·····	五六
---------	----

胃癰·····	六〇
---------	----

胃囊

六二

噎膈

六三

節四章 痔瘡病

A 通論

六六

B 分類

六七

痔瘡

六七

內痔

六九

外痔

六九

氣痔

七一

血痔

七二

蟲痔

七三

牡痔

七三

牝痔	七四
腸痔	七四
脈痔	七五
酒痔	七六
諸痔	七七
痔漏	七九
脫肛	八二
附錄胃病痔疾良方	八四

國醫

萬病自療叢書

腸胃痔瘡病

吳克潛編

第一章 腸胃病

A 通論

吾人出生之後。賴以維護後天之生命者。盡人皆知爲飲食。故飲食者。養命之源也。然有飲食而無腸胃消化之功能。則飲食等於無用。必也飲食由食管而達胃。則胃爲之消化。由胃而達腸。則腸爲之消化。然後擷採精微。營養身體。以充四肢百骸。此腸胃之所以爲後天之本。注重衛生者。不能不隨時加之意也。若腸胃偶沾疾患。小之影響目前之健康。大之短促將來之生命。此腸胃病之所以不容忽視而必須亟亟調治也。考腸胃病云者。腸胃同病也。其證有虛有實。有寒有熱。有寒熱錯雜。有虛實並見。治之宜因勢利導。積滯痰溼。不可不行。虛寒停頓。不可不溫。熱則不可不清。虛則不可不補。虛實寒熱錯雜並見者。更宜確立治法。隨機應

變。夫如是。庶無因循姑息之患。而得常保健康之旨矣。

B 分類

■ 吐瀉

【病狀】上吐下瀉。或腹中作痛。或作脹作響。吐瀉之物。或渣滓不化。或酸臭異常。或吐瀉清水。或吐多瀉少。或瀉多吐少。

【病因】吐出於胃。瀉出於腸。腸胃有病。則吐瀉交作。其原因多由飲食積滯。不能運化。或感受暑熱。或招受寒涼。或停飲蓄痰。或溼熱醞釀。皆足致此。其有先吐而後瀉者。病由胃及腸。先瀉而後吐者。病由腸及胃。蓋腸胃雖以幽門爲界。而究屬銜接連通者。故胃與腸恆互有牽涉。胃病有時亦能致瀉。腸病有時亦能致吐。又爲胃行其精液者在脾。爲腸分別水穀者亦在脾。脾不健運。則精液不行。水穀不別。壅塞既久。迫而上行。則爲吐。迫而下行。則爲瀉。故腸胃不和。吐瀉之因。脾不健運。亦足以成吐瀉也。

【治療】腸胃之中。最宜清肅。故飲食宜有定。大便宜有時。若腸胃向不清肅。一旦

傷食傷暑。或感冒風寒。清濁之氣交亂於中。吐瀉遂爲引動。吐瀉通治方。宜加味四苓散。夏秋炎令。宜冲和湯。飲食積滯。吐瀉渣滓者。宜二陳湯加神麴查炭厚朴麥芽。感受暑熱者。宜燃照湯。感冒風寒者。宜藿香正氣丸。停痰蓄飲者。宜胃苓湯。溼熱醞釀者。宜桂苓甘露飲。去肉桂酌加川連厚朴。熱甚脘悶。吐瀉酸臭者。宜竹葉石膏湯。去人參加神麴枳殼。吐瀉清水。由於虛寒者。宜參苓白朮散。或理中湯酌加附子肉桂。久病脾胃虛弱。易於作吐。易於作瀉者。宜用八仙糕調理之。

一 加味四苓散 治溼熱吐瀉。胸悶脹痛。溺瀦煩渴。

茯苓 豬苓 澤瀉 陳皮 厚朴 半夏 神麴

二 冲和湯 治飲食不化。發爲吐瀉。行氣化積。使臻中和。四時均宜。

厚朴 神麴 白芍 黃芩各錢半 半夏 豆豉 佩蘭各二錢 滑石 赤苓各三錢 甘草五

分

三 二陳湯 治胃中寒溼痰濁等證。

陳皮（去白。脅下引痛醋炒。乾欬蜜製。） 半夏（生姜汁製。熱痰竹瀝製。妊娠惡阻醋製。） 茯苓（停飲心悸。桂枝煎酒製。）各二錢 甘草（炙。痞脹砂仁汁製。）一錢 生姜七片（欬逆痰結蜜煎。） 一方有烏梅肉一個（瀉利炒焦用）

四 燃照湯 治暑穢挾溼。霍亂吐下。腕痞煩渴。惡寒肢冷。

草果 豆豉 山梔 省頭草 川朴 半夏 黃芩 滑石

五 藿香正氣丸 治外感風寒。內傷飲食。憎寒。壯熱。頭痛。嘔逆。胸悶。

腹脹。痰嗽。氣喘。傷冷。傷溼。傷暑。霍亂吐瀉。不服水土等證。

藿香 大腹皮 白芷 茯苓 紫蘇 陳皮 白朮 厚朴 桔梗 半夏 甘草 加薑棗

六 胃苓湯 和血補血。治脾胃受溼。飲食停積。霍亂嘔吐。浮腫泄瀉。

四肢痠痛。小便短少。及溼瘡水蠱。

蒼朮 厚朴 陳皮 白朮 茯苓各一錢五分 澤瀉 豬苓各一錢 甘草六分 肉桂五分

加生姜三片 大棗三枚

七 桂苓甘露飲 治溫熱病。煩渴引飲。小便不通。上吐下瀉。

滑石 赤苓 澤瀉 石膏 寒水石 甘草(炙) 白朮 豬苓 肉桂

八 竹葉石膏湯 治傷寒胃虛而熱。煩渴作嘔。

竹葉 石膏 半夏 人參 甘草(炙) 粳米 麥冬(去心)

九 參苓白朮散 治脾胃虛弱。飲食不進。多困少氣。胸中痞滿。噫嘔腹逆。大便不實。

人參 茯苓 於朮 山藥 石蓮肉(去心炒) 白扁豆(去皮姜汁浸炒) 桔梗 砂仁

薏苡仁 (炒) 甘草(炙)

十 理中湯 治中焦脾胃虛寒。不能運化。嘔吐泄瀉。四肢冷逆。身汗脈虛。不飲不食。胸痹胸痞。

人參 炙甘草 白朮各三錢 乾姜一錢 清水煎服

十一 八仙糕 治脾胃虛弱。食少體倦。易吐易瀉。

人參 茯苓 山藥 芡實 蓮子肉各六兩 研爲細末。加糯米粉三升。粳米粉七升。和勻。以白蜜

一斤白糖二斤八兩。用水熬化。拌藥粉中。置蒸籠上蒸熟。切成條糕。火上烘乾。瓷器收貯。

脹痛

【病狀】腹中或脹或痛。或胃脘作脹而泄瀉。或胃中善飢。腹中作痛。或當臍腹痛。時作噯氣。或腹滿上走胸臆。喘息不甯。或腹滿而痛。脹急而堅。或腹滿時減。按之不痛。

【病因】腸胃有宿食積滯。痰溼停留。邪不從吐瀉而行。則阻塞中宮而爲脹痛。暴怒氣逆。阻塞中宮者。亦作脹痛。脹雖滿而按之減而不痛者虛也。脹之實而按之不減而痛者實也。腹中作痛。滯欲行而難行也。臍腹作痛。胃中噯氣者虛寒也。胃寒而腸熱。則脹而且泄。胃熱而腸寒。則飢而腹痛。若痛有定處。痛不可忍。發熱拒按者將作癰也。

【治療】腸胃積滯而作脹痛者。治宜行氣化積。用勻氣湯加香附烏藥檳榔麥芽。甚者加大黃芒硝。痰溼停留。以致脹痛者。宜消痰祛溼。用二陳湯加厚朴枳殼大腹皮。甚者加大黃厚朴木香。暴怒氣逆。阻塞作痛者。宜勻氣湯加

烏藥青皮。脹雖滿而按之減而不痛者。宜參苓白朮散。脹之實而按之不減而痛者。宜厚朴三物湯。發熱脈浮數者。厚朴七物湯。滯欲行而難行。腹中陣陣作痛者。宜勻氣湯。加白芍檳榔之屬。或再加神麴麥芽磨積之品。臍腹作痛。胃中噯氣者。宜肉桂當歸炮薑茯苓甘草溫養之。胃寒腸熱。脹而且泄。宜厚朴致和湯。胃熱腸寒。飢而腹痛。宜吳萸致和湯。怪證有腸胃寒極。猝然腹脹如鼓者。濁陰阻塞於中宮。牢不可破。以致神疲肢冷者。宜用火藥二錢。燒酒煎滾。沖服以開之。得吐下則生。然非危急及不解事者。所可用。至於胃癰及腸癰。則另有專條述治也。

一 勻氣湯 治腸胃之氣。阻塞不通。脹悶作痛。

厚朴 枳實各二錢 木香 陳皮 白蔻殼各一錢 清水煎服。甚者倍量用。

二 二陳湯 見前吐瀉類。

三 參苓白朮散 見前吐瀉類。

四 厚朴三物湯 治腹滿痛而便閉者。

厚朴 大黃 枳實 小承氣湯與此方藥味相同。但小承氣湯以大黃爲君。此厚朴三物湯以厚朴爲君。

五 厚朴七物湯 治腹滿發熱十日。脈浮而數。飲食如故。

厚朴 甘草 大黃 枳實 桂枝 生薑 大棗

六 厚朴致和湯 治胃寒腸熱。脘腹作脹。大便泄瀉。

厚朴 白豆蔻 黃芩 白朮 白芍 木香 檳榔

七 吳萸致和湯 治胃熱腸寒。腹痛能食。

淡吳萸 黃連 白芍 木香 枳殼 神麴 煨草果 煨薑

霍亂

【病狀】勃然上吐下瀉。或先瀉後吐。腹中絞痛。汗出如注。或大渴引飲。或吐瀉酸臭。或吐瀉清水。或腹中擾亂而吐瀉不得。皆謂之霍亂。甚者手足攣急。羅紋麻癢。神氣疲弱。脈微欲絕。

【病因】此證在夏月秋令。患之最多。蓋以人當炎令。腸胃最弱而感受最易。若有

宿食留滯。痰溼交阻。一經感受外邪。觸犯穢濁。腸胃不運。清濁之氣交亂於中。上下奔馳。遂致發爲腹痛吐瀉。名爲霍亂者。形其揮霍擾亂之狀也。此證若數度吐瀉。腸胃所蘊之邪。宣洩無餘。其證自平。若上不得吐。下不得瀉。腸胃之邪已訖於內而不得泄於外。最爲危篤。其有吐瀉過甚。津液已耗而病邪未衰者亦凶。挾食挾溼挾熱而作者常爲較輕。內傷飲食。感受時邪。挾寒而作。肢冷自汗。轉筋拘急。瀉利清穀者常爲較重。若見手足攣急。羅紋麻癢。是爲津液將竭。肝邪鴟張。爲尤重之候也。

【治療】

凡傷食傷暑。感冒風寒。以致勃然上吐下瀉。胸腹絞痛者。此爲似霍亂證。宜藿香正氣丸。吐下污濁臭穢。口渴有汗。小便赤而少者。此爲熱霍亂。宜白虎湯或桂苓甘露飲。吐瀉清水。小便利。口不渴者。此爲寒霍亂。卽近今所謂眞性霍亂也。宜四逆湯或附子理中湯。泄水過多羅紋麻癢者。宜鹽水鍼注射。神氣疲弱者。宜服樟腦白蘭地酒。或用樟腦鍼注射。四肢冷者。宜以生附子搗爛揩擦。或以燒酒揩擦之。凡諸般霍亂。泄水過多。筋不能

榮而爲拘急轉筋之狀。皆可酌加木瓜白芍以舒之。乾霍亂吐瀉不得轉筋危急者。宜以鹽湯探吐。或明礬探吐。或先用大黃攻下。再用雷公救疫散灸之。

一 藿香正氣丸 見前吐瀉類。

二 白虎湯 治陽明證汗出。渴欲飲水。脈洪大浮滑。不惡寒反惡熱。及中喝煩熱而渴。

石膏 知母 甘草 梗米

三 桂苓甘露飲 見前吐瀉類。

四 逆湯 治少陰病表熱裏寒。下利清穀。四肢拘急。手足厥冷。脈微欲絕者。

甘草(炙) 乾姜 附子(生用去皮) 加人參名四逆加人參湯。治霍亂脈微。利而復利。利止亡血。

五 附子理中湯 治脾胃虛寒。飲食不化。四肢厥冷。腸鳴腹痛。霍亂轉筋。體冷微汗。嘔吐泄瀉。一切沉寒痼冷等證。