

清武林潘

楫碩甫著

證治寶鑑

上海中華新教育社印行

中華民國廿三年四月出版

證治寶鑑全書二冊

定價大洋壹元貳角

編著者

武林

潘楫

校訂者

閩侯潘

衍

印刷者

中華新教育社

發行者

中華新教育社

分售處

上海大東書局

各省各大書局



分發行所

中華新教育社

上海棋盤街交通路

總發行所上海

愛而近路
德潤坊

中華新教育社



南京中医药大学图书馆版权所有

571
015

證治寶鑑 卷九

▲痞

脉多沈微。沉者為中焦有物。浮者瀉肝。弦遲心下痞堅。乍緊手足厥。結胸當吐。脉浮大便秘。心下痞當下。痞滿滑大。痰火作孽。弦伏中虛。微瀉衰劣。

治法

滿而不實為痞。外無形勢。而內若痞塞不通也。兩寸關弦滑滯瀉。屬肝氣鬱而不伸。膈上有稠痰也。宜吐以達之。後用舒鬱。

疎肝平胃


肥人濕痰。易老理中湯加半夏。人參 白朮 枳實 炙草 乾薑

瘦人多火。三黃瀉心湯下理中丸。黃連 黃芩 黃芩

痞而熱。胸中有實熱。膈上有稠痰。寸浮關沈。黃芩利膈丸。黃芩 黃連

黃柏 南星 半夏 枳殼 陳皮 白礬 萊菔子 小皂角 澤瀉

1351
1P-2



附子瀉心丸
消痞湯

小陷胸湯

疎肝益肺保脾丸

白朮 為末。蒸餅丸。湯下五十丸。

瘡而寒。附子瀉心丸。附子芩連與大黃。

或消痞湯。消痞紅花草薳香。半甘歸止橘薑柴。

傷寒下早而瘡。枳桔小柴胡湯。不已。對小陷胸湯。小陷瓜姜黃連半。

大怒之後成瘡。或痰中見血。或口中見血腥氣。是瘀血症。牡丹皮。江西

紅麴。麥芽。香附子童便浸炒。通草。穿山甲。降香。紅花。山查肉。

蘇木錢各一許。酒童便煎服。甚者加大黃。臨服入韭汁桃仁泥。

痰挾瘀血。成窠囊作瘡。脉沈濇。日久不愈。多鬱人悲哀過度者有之。宜從血

鬱治。桃仁。紅花香附丹皮韭汁之類。

兩脇下瘡者。疎肝益肺保脾丸。

一人身肥盛。夏秋間因勞。至冬得瘡滿證。兩脇氣攻。胸中飽悶。不能卧。欲

成脹滿等證。醫以疏氣耗散之劑不效。十月初脉得兩手關前浮洪而弦

濇。兩關後脉沈伏。虞花溪曰。此膈上稠痰。加木鬱制脾而不伸也。法當吐

奈值冬月降沈之令。不宜此法。且先與豁痰疏肝。兼瀉土中之木。用平胃

家傳治瘡方
八味理中湯
見卷八泄瀉

調中益氣湯
三花神佑丸
羌花炒黑
甘遂。大
戟等分。大
黃。黑。且。
輕粉水丸。
治強實人風
痰鬱熱肢體
麻痺走注疼
痛濕熱腫滿
氣血壅滯不
得宣通及積

加半夏 茯苓 青皮 川芎 膽草 香附 砂仁 柴胡 黃連

瓜蒌仁等藥。病退十之三四。待次年二月初旬。行倒倉法平安。

胸前瘡者。用陳皮 三錢 白朮 二錢五分 薑汁炒黃連 枳實 半夏 萊菔

子 各一錢 茯苓 山查 各一錢五分 薑水煎。

家傳治瘡煎藥方。八味理中湯去甘草。倍白朮。加海藻 海帶 昆布

吳茱萸 黃連 桃仁 蟬甲 白芥子 半夏 茯苓 甚者加苓澤。

此在左。如在右。去桃仁。紅花加南星。桔梗。前胡。

虛而瘡者。調中益氣湯加減。即補中益氣湯。去白朮。當歸。加蒼朮。木香。

久瘡而甚者。先用三花神佑丸。後用大消瘡丸。○婦人血結胸。頭汗。眼黃。手

不可近。海蛤。芒硝。甘草。滑。每服二錢。雞清調下。

附方

一方。瓜蒌炒熟。連皮或丸。最蕩滌胸中垢膩。

一婦瘡積。膨脹不通。坐卧不安。用麥芽末酒調服。良久自通。

膈上諸般冷氣。不問瘡塞及疼痛。且與薑汁一二盞。痰飲尤宜。

▲諸積

脉

細而附骨為積。

寸口在胸。

微出寸在喉。

當關在臍旁。

關上在心

下。

微下關在小腹。

尺中在氣街。

左見在左。

右見在右。

兩旁見在

中。

沉而有力為積。

寸口沈橫脇下。

及腹有橫積痛。左見在左。右見在右。

脉頭大者在上。頭小者在下。

弦為癥。

沉小實者。

腹中積氣。嘔不能

食。

沉緊者。心下寒積聚。

關上脉大。尺寸細為腹痛。遲滑中寒有癥結。

五積屬陰。沉伏附骨。積見腹中。虛弱忌刺。肝積肥氣。弦細青色。心為伏梁。

沉托赤色。肺積息賁。浮毛喘卒。腎為奔豚。沉急面黑。脾名痞氣。浮大長則。

積聚沉細。伏寸見在胸中。微出於寸口。其積見喉嚨。上關心下積。關見臍

傍生。關下小腸積。尺微積氣衝。右脉右出積。左脉左積從。脉如雙手出。當

斷積居中。

生死脉

堅強急者生。虛弱者死。

弦而伏者。腹中有癥。不可轉也。必死不治。

丸後轉加痛。悶此痰涎壅。塞頻攻不開。再加二九快。利則止。虛人慎用。即十。東湯減大棗。如此三味也。小胃丹。花炒黑。甘。遂。大戟各。五錢。黃柏。二兩酒炒。大黃兩半。煨。粥丸。治。胸膈腸胃熱。痰濕。控涎丹。白。芥子辛溫通。經絡利氣。豁。痰。大戟去。皮製苦寒瀉。藏府水濕。甘遂去心製。苦寒瀉經隧。水濕。右等分為細。

本神麴糊為丸梧子大每服九丸薑湯

下壯者加之

弱者減之以

知為度

大消痞丸

疏肝益肺保脾丸見上頁

八味理中湯見卷八泄瀉

四物湯俱見

卷一厥門

二陳湯見卷

一厥門

小柴胡湯見

卷一傷風

疎肝益肺保脾丸見上痞

門

當歸龍薈丸

當歸。龍

死證

諸痞積見腹腫者必死。脾先欲絕也。

治法

腸胃之絡傷。則血溢於腹外。與痰沫相搏。復遇外寒凝聚而成積矣。居于皮裏膜外。苟非破腹割腸。何能滌除。但不妨礙飲食。宜養胃補中。

五積通用疏肝益肺保脾丸。左加漆查。

小腹有塊者。本方亦加漆查。

煎藥方八味理中湯。去甘草調理。

或六君子湯。血虛四物加減。

肝積左脇如覆杯。宜二陳對小柴胡湯。加白芥子。紅花。桃仁。海石。蛤粉。當歸。

川芎。青皮。煎服。○痛甚加全蝎。兼下疏肝益肺保脾丸。○脇下有塊。龍薈

丸。二錢五分。對薑黃。桃仁。泥各五錢。蜜丸。桐大子。每服五拾丸。溫水下。

心積臍上橫如臂。禁灸。禁大針。禁熱藥。忌膏朮。禁針。用三黃瀉心湯。或兼火府丹。見卷十以

木通通心氣則愈。煎下伏梁丸。或疏肝益肺保脾丸。

○青黛○木

香。山梔。
黃芩。黃連。

○黃柏。大
黃。射香。

蜜丸薑湯下
三黃瀉心湯

見上痞門

東垣痞氣丸

○黃芩○乾

桂。厚朴。

人參。巴豆。

蒲。紅豆。

痞氣丸 黃連八錢。黃

芩二錢。乾薑一錢五分。

川烏五分。

脾積胃脘如覆杯易老理中湯

肺積右脇如覆杯用二陳湯加桔梗人參海石全蝎石碱少許桃仁白芥子

下息貢丸或息貢飲 息貢吳萸半甘草 桑皮葶藶桂人參

腎積小腹如江豚跳躍上冲用五苓散去白朮加防風川練肉桂延胡索全

蠋下奔豚丸或奔豚飲 奔豚芍藥苓芍 半單當歸甘李根

腎積腎氣湯
橘核巴川棟
玄胡青牡丹
薯蕷通芷芍
沈澤桂甘櫟

積在中為痰飲。在右為食積。在左為死血。誠丹溪之確論。然胃脘有食積而

病發在中者。亦有肝氣與宿食相假而積在左者。診治之際。尤當詳之。

一少年體薄弱且咳血。左邊一塊不時上攻作痛。左金蘆薈俱不應。其脉

三部俱弦。而細澀不流利。因作陰虛治。四物加黃柏玄參丹皮。不六劑

頓愈。此又陰虛似肝積。故臨證不可拘泥也。

玄辟青聚。通利三焦。刺蓬煎丸。三凌醋浸蓬莪茂酒浸各二兩各浸冬三夏一日

上二味用巴豆三十八粒。銀器內炒黃色。去巴豆不用。木香。枳殼。青。

皮
茴香
兵郎各二
為細末。麴糊丸如桐子大。每服三十丸。生薑湯下。

[illegible]

白朮二錢。厚朴五錢。吳萸三錢。澤瀉一錢。茵陳一錢五分。砂仁一錢五分。肉桂四分。巴霜四分。蜜九燈草湯下。息責丸。即痞氣丸。除吳萸。白朮。砂仁。黃芩。茵陳。澤瀉。加紫苑。桔梗。天冬。白朮。陳皮。青皮。三稜。淡鹽湯下。息責飲。奔豚丸。即痞氣丸。除吳萸。白朮。砂仁。黃芩。

雜因

癰瘰癧。時發刺痛。三稜煎丸。稜莖各二兩。羌花五錢。一方加青皮五錢。同入磁器中。用醋五升浸。封口。以炭火煨熟。取稜莖出。將羌花以餘醋焙乾。為末。醋糊丸。每服五十九丸。薑湯下。

腸中痰積。行倒倉法妙。但虛人不可輕試耳。

輕積酒積食積血積。勝紅丸。陳皮 青皮 三稜 莪茂俱醋炒 炮薑

良薑各一兩 香附二兩 醋糊丸。每服二十丸。薑湯下。

腹中蟲積。丑末二兩 檳榔末一兩 極壯者五錢一分零三厘。次者及小

者二錢零。五更砂糖湯調下。

又取蟲方。胡黃連 蕪荑 雷丸 鶴虱 大黃 使君子 錫灰

三稜 莪茂 木香 檳榔 青皮 大凡偏食一物。中必有蟲。即以其

所好投之。隨下蟲藥。無不應手獲效。

吃泥為胃熱。黃芩白虎朮苓陳

吃茶葉面黃成茶癖者。白朮 石膏 片苓 白芍 胆星 薄荷 為

末。砂糖調成膏。臨卧津唾下嚥。一方有升麻。

一人飲茶過度。素多憤滿。腹中且漉漉有聲。秋來發熱惡寒似瘧。以十棗湯料黑豆煮晒乾研末。棗肉為丸。芥子大。而以棗湯下之。初服五分不動。又服五分。無何腹痛甚。以大棗湯飲。大便五六行。皆溏糞。時蓋晡時也。夜半乃大下數斗。積水而平。當其下時。瞑眩特甚。手足厥冷。絕而復甦。舉家號泣。咸咎藥峻。嗟乎。藥可輕哉。

若病人果有積水。瘀血。實者可用小胃丹行水。抵當湯行血。虛者不若且以淡滲之劑。加竹瀝薑汁以治痰。而於隨證藥中加桃仁韭汁之屬以活血。由漸而平。慎無取旦夕之功。而貽後悔也。

附方諸積按證加藥法。

食積巴豆類。○酒積神佑丸類。

又治水積。

○商陸亦治水積。○血積桃仁丹皮。

五靈脂三稜。甚者蝨蟲水蛭瓦礮子。

痰積瓜蒌半夏枳實蕩滌痰。石碱老痰兼海石。

涎積硃砂膩粉。○痰在皮裏膜外。最宜白芥子。

穀積麥芽神麴砂仁。甚者雞內金。○瘧積鱉甲草果。○茶積乾薑吳茱萸。

茵陳。人參。川椒。乾姜。加薑。蒲。丁香。附子。苦楝。延胡。全蝎。獨活。鹽湯下。胃氣湯。肥氣丸。除吳。若氣丸。白朮。砂仁。黃芩。澤瀉。肉桂。加柴胡。我遂。皂角。昆布。甘草。白虎湯。石膏。知母。生。甘草。梗。東湯見上。塔門。

小胃丹見上
 瘡門
 抵當湯水
 蛭三十個猪
 脂熬黑。去
 虫三十個去
 頭足翅。挑
 仁二十個去
 皮共研。大
 黃四兩酒浸
 附代抵當丸
 大黃四兩。
 生地。歸尾。
 桃仁。穿山
 甲。元明粉。
 各一兩。蜜
 桂三錢。蜜
 九。
 神佑丸見上
 瘡門
 阿魏丸見指
 南
 阿魏。山查
 青皮。山
 稜。蓬朮。
 麥芽。厚朴。
 萊菔子。

川椒芝麻薑黃。

肉積。礪砂。阿魏。山查。硝石。或阿魏丸。○粉積。萊菔子。○萊積。丁香。肉桂。麝。
 麴積。萊菔子。薑酒煎。○狗肉積。杏仁。山查。○癖積。稜茂。巴霜。大黃。○魚鱉。
 積。紫蘇。薑汁。木香。○卵積。陳皮。豆豉。薑汁。○笋蕨。硬物積。荸薺。砂仁。三棱。
 莪茂。○蟲積。雄黃。錫灰。蕪荑。石榴根。榧子。實。
 諸積。石灰。一物能消。

補遺

戴復庵五積並用大七氣湯加減。頗是。見七氣湯。
 肝積。煎湯煎熟待冷。外用鐵器燒紅。將藥淋之。乘熱服。

肺積。加桑皮。半夏。杏仁。

心積。加石菖蒲。半夏。○脾積。兼下紅圓子。

腎積。倍桂。加茴香。川棟肉。

一症。若積若聚。心腹間遊走。攻刺者。以全蝎四個。劈破。煎湯。下蘇合香丸。

肥氣丸。

見上第
 四頁。

柴連。朴。草。椒。昆。茂。

烏皂。乾薑。參。茯苓。巴。除。茯苓。皂。角。巴。豆。外。
 為細末。再研。茯苓。皂。角。為。

半夏。陳皮。甘草。胡。黃連。連翹。水法丸。又。方未錄。大七氣湯見。百問書。治婦人喜怒。驚恐相搏而。寒痛。青皮。養葉。香附。蓬莪朮。陳皮。桔梗。官桂。益。智各一兩五。錢。炙甘草。五錢。為末。每服五錢水。二盞薑三片。漿一枚煎服。陰陽攻積丸。

細末。和入。方旋旋下。巴。右末。煉蜜丸。桐子大。初服二丸。一日加一丸。霜。秋冬減。黃連。加厚朴。

二日加二丸。漸至大便微溏。再從二丸加服。周而復始。減大半勿服。

息黃丸。見上第。即前丸。去甘柴昆茂皂。加紫苑桂枝桔梗青陳白寇天冬。

服法以下。俱同前。

伏梁丸。見上第。即前方去柴甘昆茂皂。加黃芩肉桂丹參紅豆菖蒲。

痞氣丸。見上第。即前方去柴甘昆茂皂。加吳萸芩茵白朮砂仁澤瀉。

奔豚丸。見上第。即前方去柴甘昆茂皂。加丁香肉桂澤菖棟蝎。

延胡附子獨活。

陰陽攻積丸。李士材新定。即肥氣丸去柴甘椒昆茂。加吳萸官桂橘半菖。

延楨榔枳實琥桔沉香。

▲聚

脉。六聚結沉。痼則浮結。又有癥瘕。其脉多弦。弦急癥疾。弦細癥堅。沈重中散。

食成癖瘕。左轉沉重。氣癥胸前。若是肉癥。右轉橫瘕。積聚癥瘕。緊則痛纏。虛。

弱者死。實強可痊。結微積微。結甚積甚。伏結積聚。沉結痼疾。如若不應。死期。

三因散聚湯

沉香降氣湯

烏藥。木香。香附。

砂仁。甘草。等分。為

末。每服二錢。空

心鹽湯下。大七氣湯見

積門。廣木潰堅湯

控涎丹見痞門。

三花神佑丸見痞門。

導痰湯見卷一中風。

五飲湯。

可知。

治法

脉沈結以行氣。

理肺也。

開痰活血為主。

三因散聚湯。

三因散聚附杏桂。

栝

榔橘半吳萸配。

茯苓歸厚朴甘。

便秘大黃虛實對。

腹中瘕癖。上下無定。游走攻刺。沉香降氣湯。或大七氣湯。

塊

腹中塊硬。坐卧不安。

廣木潰堅湯。

廣木潰堅升草寇。

柴萸蓬茂葛根當。

紅花益智芩連草。

麴澤青陳半朴將。

驚氣成塊者。控涎丹。加穿山甲。延胡索。燒驚甲。義茂。

飲癖左右脇間。類積聚。腹如滿。用破塊藥不效。以導痰湯五飲湯。甚者三花。

神佑丸。

小腹血塊妙方。

當歸 八錢

芒硝 三錢

桃仁 五錢

人參 一錢

水煎。

用人參助元氣以行血妙。

黃蜀葵根煎湯。治小腹有塊。

曾服瀉藥止經。因而血滯成塊。丹溪用此法妙。人參 白朮 青皮 陳皮 甘草 牛膝 葵根 煎膏。入研細桃仁玄明粉各少許。熱飲之。二服當見塊下。病重者補接之。後加減調理。或再行一度。下塊一二次。去葵根玄明粉。

瘰 皮厚也。在肌肉之間而可見者也。

似積而軟。有形高起。專是痰在皮裏膜外。用二陳湯加白芥子雞肫皮牡蠣竹瀝薑汁。或導痰神佑丸。或枳殼煮散。智殼莪朮薑厚朴。青陳桂枝。

木檳榔。

又方 白雞鵠一隻剝碎。全蝸牛 水紅花子末 黃蠟 皮硝 各一錢。

鴿子同藥。用黃蠟煎盡。然後蒸食。水紅花湯下。

癖 腸間如板壁然。先用三花神佑丸。次用二陳加白芥子紅花當歸赤芍川

芩青皮柴胡牡蠣蒼朮人參。

癥 按之應手。亦如五積之不移。

癥瘕丹溪多用木通。以小腸主血。木通通小腸氣。氣通則血自順而下也。

化痞積陰丹

牡丹皮散

臍腹疼痛惡露不行方

木香通氣散

晞露丸見濟

陰綱目

廣茂酒浸剉三稜酒浸

有形可徵驗。婦人行經。或感風寒。凉水洗手。鬱怒血凝不散。有形高起。待

經將動三四日前與吃。消大半即補。化痞積陰丹。或黃蜀葵根煎湯方。前見

瘕

假物成形。如血驚石瘕之類。

假氣血以成形。在小腹而能動。乃血分之氣病。小腸移熱于大腸。為瘕瘕。大

腸移熱于小腸。兩熱相搏。則血溢而為伏瘕。化痞積陰丹。

婦人久虛羸瘦。血塊走注。心腹疼痛。牡丹皮散。

丹皮 桂心 當歸 玄胡索

各一兩

莪茂 牛膝 赤芍

各二兩

三稜

一兩五錢 為末。每服三錢。水煎服。

一

切血氣。臍腹撮痛。及產後露惡不行。兜枕痛。

竭藥當黃肉桂

蘇木花白乾胡 蘇紅芍漆延

腸覃

乃寒氣客于腸外。生瘕肉。推之則移。按之則堅。狀如懷子。月事以時下。

遇熱則通。遇寒則凝。木香通氣散。莪茂甘枳實。薑朴木戎鹽。

兼服晞露丸

治寒傷于內。氣凝不流。結于腸外。久為瘕瘕。時作疼痛。腰不得伸。名曰腸覃。方見上。

石瘕

寒氣客于子門。其氣不瀉。惡血留止。狀如懷子。月事不以時下。和血通。

經湯 歸地 稜莪 紅木 桂

衆蘇 血竭 酒調濃 見

▲脹滿

脉 關上脉弦為脹。又遲而滑。盛而緊。大堅以濇者。皆脹也。脉虛為虛脹。脉實為實脹。浮而大者易治。細而微者難治。

死候

不食者死。身熱不休者死。寒熱如瘧者死。肢冷形脫者死。久病喘急者死。臍突胸滿者死。脉微或大者死。陽物不舉者死。利後腹脹急。青筋繞腹。爪甲青。卒腫。頭面蒼黑。嘔吐頭重。上喘下泄者。皆不治也。

五臟六腑皆有脹

按經論脹。五臟六腑。靡不有之。心脹者。煩心短氣。卧不安。肺脹者。虛滿而喘。

咳。肝脹者。脇下滿而痛。引少腹。脾脹者。善噦。四肢煩惋。悶亂體重不能勝。

衣。卧不安。腎脹者。腹滿引背。央央然。困苦腰痛。此五臟之脹也。胃脹者。

腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨于食。大便難。大腸脹者。腸鳴而痛。濯濯。濯濯腸聲。

冬。日重感于寒。則飧泄不化。泄完穀不小腸脹者。少脹。臍脹。引腰而痛。膀

各三兩。乾漆流去腥炒。烟盡。川烏。各五錢。雄砂四錢。雄黃另研。青皮。茴香鹽水炒。穿山甲。炮各三錢。輕粉另研一錢。射香五分另研。巴豆三十個。去皮切開。右除礮藥外。將巴豆炒三稜。廣茂二味。黃色去巴豆。不用共為末。入礮藥。勻生。姜汁打糊。丸。如桐子。每服二十九至三十九。薑湯或酒下。和血通經湯。見丸見濟。

陰綱目
治寒客於下
焦血氣閉塞
而成痼日以
益大狀如懷
孕名曰石瘕
附子四錢
。鬼箭羽。
紫石英各三
錢。肉桂。
玄胡索。澤
瀉。木香各
二錢。血竭
一錢五分另
研。水蛭。
檳榔二錢五
分。桃仁三
十個另研。
大黃。三稜
五錢。右為
末用酒糊丸
如桐子大每
服三十九醋
湯或溫酒下
寒者溫之留
者行之以病
在下焦故多

臃脹者。少腹滿而氣癰。臃脹氣閉不通也。小三焦脹者。氣滿于皮膚中。輕輕然而
而不堅。膽脹者。腸下痛脹。口中苦。善太息。此六腑之脹也。

諸脹證候及治法

經曰。膚脹者。寒氣客于皮膚之間。整整然不堅。腹大身盡腫。皮厚。整整然不堅。腹大身盡腫。皮厚。也。寒客皮膚。身盡腫。若因於水。則有水處腫。無水處不腫。此為可辨。然有水則皮厚而薄。無水。按其腹。胃而不起。腹色不變。此其候也。蒼或一身盡腫。或自上而下者。多屬氣。若皮薄色澤。或腫有分界。故膚脹為氣分病。鼓脹者。腹脹身皆大。大與膚脹等。色蒼黃。腹筋起。此其候也。此鼓脹亦氣分之病。與膚脹相似。惟腹有筋起為異。但膚脹病根在肺。鼓脹病根在脾。膚脹像寒氣客在下。不在內而在表。金匱用防己黃耆湯。防己茯苓湯。色蒼黃。腹筋起。明是肝木乘脾。脾聚濕熱。久室而清氣不升。濁氣不降。上經云。濁氣在。互相積聚。牢不可破。或由脾陰受傷。脾不運化。故陽自升。陰自降。而成天地不交之否。清濁相混。遂道壅塞。濕鬱為熱。熱又生濕。濕熱相生。遂成脹滿。則旦食不能暮食也。中滿分消丸主之。

分消丸治熱脹。分消湯治寒脹。宜詳而用之。按分消丸乃六君四苓瀉心平胃去蒼朮加。