

常用中草药

CHANGYONG ZHONGCAOYAO

[图谱及配方]
TUPU JI PEIFANG

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海



贵州科技出版社

常用中草药

4

主编：陈国治、王学军
副主编：王学军、王学军



常用中草药图谱及配方

4

主 编 杨卫平 夏同珩

副主编 李朝斗 陈谦海

编辑委员 (按姓氏笔画顺序排列)

尹武燕	云雪林	刘 冬	刘 明
李 琼	李文科	李朝斗	沈 明
冷 丽	吴筱枫	陈 芳	陈谦海
何前松	张庆乾	张华海	杨卫平
杨成华	杨传东	周 静	周惟粲
苟光前	姜东辉	夏同珩	梅 颖
黄 敏	董发发	潘晓瑛	

贵州科技出版社

贵 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药图谱及配方. 4/杨卫平, 夏同珩主编.
—贵阳: 贵州科技出版社, 2012. 9
ISBN 978 - 7 - 5532 - 0035 - 4

I. ①常… II. ①杨… ②夏… III. ①中草药—图谱
②中草药—验方 IV. ①R282.7 - 64②R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 219514 号

出版发行	贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路 289 号(邮政编码:550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	贵阳德堡快速印务有限公司
版 次	2012 年 9 月第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次
字 数	466 千字
印 张	10.25
印 数	1 ~ 3000 册
开 本	890mm × 1240mm 1/32
书 号	ISBN 978 - 7 - 5532 - 0035 - 4
定 价	44.00 元

前 言

当前，环境问题已成为影响人类生存、经济发展和社会进步的一大问题，世界各国民众普遍关注，各国政府也高度重视，积极投入人力、物力，努力开展科学研究和对被破坏的生态及环境进行治理。与人类生老病死关系最为密切的医药卫生事业，也是环境问题的一个重要方面，一样颇受世人关注。生产各种用于防病、治病的化学药品，需要耗费大量的人力、物力、财力，也能对环境造成一定的影响。全世界工业化、现代化的高度发展，使人们生活在钢筋混凝土的高楼大厦缝隙之中，遭受汽车尾气、工业废气及各种噪声的刺激，再加上工作紧张，难免身心疲惫，渴求返璞归真，回到农耕田园生活之中；与此同时，也对防病治病提出了新的要求，希望能更多地使用天然药物，以避免或减少化学药物在防病、治病中的毒副作用对身体的伤害。这个要求，并不过分，同时也是最现实、能实现的要求。中医中药延续了几千年，在从事诊病治病的医疗实践中，历代医药人员努力工作，积累了丰富的诊病用药经验，使中国医药成了世界医药宝库的一个重要组成部分。中医中药防病治病的宝贵经验，可供世界各国借鉴和参考，这就为人们使用天然药物来防病治病打下了基础。为了充分发挥中草药这一天然药物毒副作用小、易取易得和在防病治病中的优势，本书作者在野外拍摄了近10万张有关中草药的照片，并从中挑选出近1800种常用中草药的照片，为其撰写相关文字，编著成了《常用中草药图谱及配方》一书，分六册出版。

全书编排顺序是：植物药按植物分科科名的汉语拼音字母顺序排列，对每一科中的种类，基本上按拉丁学名的字母顺序排列；动物药、矿物药则排列在植物药之后。每个药按来源及药用部位（含拉丁名）、本草论述、形态特征（含生境及分布）、性味功效、常用配方（一般3~5首）、主要化学成分、现代研究等条目列项叙述；每个药配有1~2张具有鉴别特

征的在生长实地拍摄的彩色照片。本书具有条理清晰、层次分明、内容新颖、文字简练、图文并茂、通俗易懂的特点。可供执业医师、中医药专业医学生参考学习，也可供广大中医药爱好者使用。

本书在编写过程中，参阅了国内较多的相关书籍及刊物，不能一一作谢，在此，特向相关参考书或文章的作者表示诚挚的谢意。

本书主编之一杨卫平和编辑委员云雪林、陈芳、刘明、周静、刘冬、梅颖、吴筱枫、冷丽、何前松系贵阳中医学院教师。

由于编著者的学识水平及见识有限，书中难免有疏漏和谬误之处，敬请广大读者批评指正，以备再版时订正，对此特表衷心感谢。

编 者

目 录

川乌·····	(1)	天葵子(千年耗子屎、紫背天葵)	(30)
关白附(白附子)·····	(2)	唐松草(马尾黄连)·····	(31)
草乌·····	(3)	八月瓜·····	(32)
藤乌头(大菟)·····	(4)	木通·····	(33)
活血莲(墨七)·····	(5)	猫儿屎(都哥杆)·····	(34)
高乌头(麻布七)·····	(6)	大血藤(红藤、五花血藤)·····	(35)
九节菖蒲·····	(7)	七叶莲·····	(36)
草玉梅(见风青)·····	(8)	连翘·····	(37)
野棉花(打碗花)·····	(9)	金钟花·····	(38)
水黄连(水八角)·····	(10)	秦皮·····	(39)
升麻·····	(11)	探春花(小柳拐)·····	(40)
三叶升麻(升麻)·····	(12)	素馨花(数日清)·····	(41)
女萎木通(女萎)·····	(13)	清香藤(破骨风)·····	(42)
威灵仙·····	(14)	青藤仔·····	(43)
铁线莲(拦路虎)·····	(15)	迎春花(金腰带、清明花)·····	(44)
山木通·····	(16)	迎春花叶·····	(45)
川木通(小木通)·····	(17)	茉莉花·····	(46)
金丝木通(野木通、金毛铁线莲)·····	(18)	茉莉根·····	(47)
黄连·····	(19)	苦茶叶(苦丁茶)·····	(48)
峨眉野连·····	(21)	女贞子(女贞)·····	(49)
飞燕草·····	(22)	女贞叶(冬青叶)·····	(50)
水乌头·····	(23)	小女贞(水白蜡)·····	(51)
倒提壶·····	(24)	小蜡树(水冬青)·····	(52)
白头翁·····	(25)	油橄榄(齐墩果)·····	(53)
回回蒜(黄花草、茴茴蒜)·····	(26)	鬼柳树(尖叶木犀榄、吉利树、旱	
毛茛·····	(27)	柳)·····	(54)
石龙芮·····	(28)	桂花·····	(55)
扬子毛茛(鸭脚板草)·····	(29)		

桂花根·····	(56)	冷水花 (水麻叶) ·····	(89)
紫丁香·····	(57)	珠芽艾麻 (禾麻草) ·····	(90)
暴马丁香 (暴马子) ·····	(58)	老虎麻·····	(91)
木贼·····	(59)	阳桃 (羊桃、杨桃) ·····	(92)
问荆·····	(60)	山酢浆草 (三叶铜钱草) ·····	(93)
海花草 (泥炭藓) ·····	(61)	酢浆草 (酸浆草、三叶酸、酸咪咪) ·····	(94)
一支箭·····	(62)	铜锤草 (红花酢浆草、山酸浆草) ·····	(95)
萍 (田字草、青萍) ·····	(63)	地锦槭 (红枫叶) ·····	(96)
赤葛 (金刚散) ·····	(64)	鸡爪槭 ·····	(97)
白藜·····	(65)	都咸子 (腰果) ·····	(98)
蛇葡萄·····	(66)	南酸枣 ·····	(99)
蛇葡萄根·····	(67)	黄栌·····	(100)
乌藜莓 (母猪藤) ·····	(68)	杧果 (芒果) ·····	(101)
独角乌柏 (白粉藤) ·····	(69)	黄连木 (黄楝树) ·····	(102)
吊岩风 (三角风) ·····	(70)	盐肤木 (盐肤子) ·····	(103)
三爪金龙 (三爪风) ·····	(71)	五倍子·····	(104)
爬树龙 (爬山虎) ·····	(72)	红肤杨·····	(105)
三叶岩爬藤 (蛇附子) ·····	(73)	青肤杨根·····	(106)
五爪金龙 (五爪藤、五爪龙) ···	(74)	山漆树 (小漆树) ·····	(107)
红五加 (大血藤) ·····	(75)	干漆·····	(108)
刺葡萄根·····	(76)	生漆·····	(109)
葛藟·····	(77)	紫薇 (痒痒树) ·····	(110)
葛藟根·····	(78)	千屈菜 (对叶莲) ·····	(111)
秋葡萄·····	(79)	圆叶节节菜 (水豆瓣) ·····	(112)
葡萄·····	(80)	水团花 (水杨梅) ·····	(113)
天师栗 (娑罗子) ·····	(81)	水杨梅·····	(114)
大水麻 (水禾麻) ·····	(82)	咖啡·····	(115)
苕麻 (苕麻根) ·····	(83)	虎刺·····	(116)
水麻 (水麻柳、水苏麻) ·····	(84)	猪殃殃 (八仙草、六叶葎) ·····	(117)
半边山 (楼梯草、赤车使者) ···	(85)	四叶葎 (四叶草) ·····	(118)
红禾麻·····	(86)	梔子 (黄梔子) ·····	(119)
大蝎子草 (大钱麻、红活麻) ···	(87)		
糯米藤·····	(88)		

- 梔子花(山梔花).....(120)
 梔子根.....(121)
 穿心草(耳草).....(122)
 黄毛耳草.....(123)
 白花蛇舌草(蛇舌草).....(124)
 一炷香(一柱香、牙疳药).....(125)
 龙船花.....(126)
 巴戟天.....(127)
 玉叶金花(白蝴蝶、山甘草).....(128)
 蛇根草(血经药).....(129)
 地贵草.....(130)
 鸡矢藤(鸡屎藤).....(131)
 毛鸡矢藤(白鸡屎藤).....(132)
 茜草(锯锯藤、小血藤).....(133)
 茜草藤.....(134)
 小红参(滇紫参).....(135)
 六月雪.....(136)
 白马骨.....(137)
 钩藤.....(138)
 仙鹤草(蛇疙瘩、龙牙草).....(139)
 桃.....(140)
 桃仁.....(141)
 乌梅.....(142)
 绿萼梅(白梅花).....(143)
 苦杏仁(杏仁).....(144)
 郁李仁.....(145)
 樱桃.....(146)
 野樱桃(山樱桃).....(147)
 榧楂(光皮木瓜).....(148)
 木瓜(皱皮木瓜).....(149)
 地红子(矮红子).....(150)
 野山楂(南山楂).....(151)
 山楂.....(152)
 蛇莓(三匹风).....(153)
 枇杷花(琵琶花).....(154)
 枇杷花.....(155)
 草莓.....(156)
 白草莓(白地莓).....(157)
 水杨梅(头晕药).....(158)
 头晕药(南布正).....(159)
 棣棠花(金弹子、清明花、金棣棠)
(160)
 花红.....(161)
 苹果.....(162)
 石楠叶(石南).....(163)
 委陵菜(萎陵菜).....(164)
 翻白草(反白草).....(165)
 地蜂子.....(166)
 五匹风(蛇含).....(167)
 青刺尖(梅花刺).....(168)
 李.....(169)
 火棘(红籽、救军粮).....(170)
 梨.....(171)
 月季(月季花).....(172)
 蔷薇(七姊妹、小金樱).....(173)
 和尚头.....(174)
 金樱子.....(175)
 营实(蔷薇花).....(176)
 刺梨.....(177)
 玫瑰.....(178)
 红毛刺(腺毛莓、红牛毛刺).....(179)
 覆盆子.....(180)
 悬钩子(山莓、树莓).....(181)
 三月泡.....(182)
 插田泡(倒生根).....(183)
 山楂叶悬钩子(树莓).....(184)

椭圆叶悬钩子(黄泡根、刺黄泡)	龙珠	(218)
..... (185)	灵寿茨	(219)
倒触伞(栽秧泡、黄泡)	清风藤(青风藤)	(220)
..... (186)	小花清风藤(小花清藤)	(221)
牛尾泡(黄泡子)	铁牛钻石(石钻子)	(222)
..... (187)	老鼠吹箫(风藤草)	(223)
白叶莓	岩蜈蚣	(224)
..... (188)	秋海棠(一口血)	(225)
大乌泡	红孩儿	(226)
..... (189)	红白二九	(227)
茅莓	一点血	(228)
..... (190)	山海棠	(229)
西南栲子(大红子)	红八角莲(猫爪莲、水八角)	(230)
..... (191)	紫荆脰(小叶六道木, 对叶花)	(231)
空筒泡(多腺悬钩子)	六道木(通花梗)	(232)
..... (192)	空心木(鬼吹哨)	(233)
川莓	山银花	(234)
..... (193)	苦糖果(大金银花)	(235)
地榆	金银花(忍冬花)	(236)
..... (194)	忍冬藤(右旋藤、二花藤)	(237)
麻叶绣球	木金银(金银忍冬)	(238)
..... (196)	陆英(臭草、接骨木)	(239)
绣线菊根(土黄连)	接骨木(臭草柴)	(240)
..... (197)	水红木叶(吊白叶)	(241)
峨眉蔷薇	荚蒾	(242)
..... (198)	珍珠荚蒾(山五味子)	(243)
三分三	南方荚蒾	(244)
..... (199)	珊瑚树(早禾树)	(245)
辣椒(辣茄、海椒)	蝴蝶戏珍珠	(246)
..... (200)	烟管荚蒾(羊屎条、黑汗条)	(247)
洋金花(曼陀罗)	肉豆蔻	(248)
..... (201)	沉香(沉香木、沉水香)	(249)
天仙子(莨菪子)	芫花	(250)
..... (202)		
枸杞		
..... (203)		
地骨皮		
..... (204)		
枸杞叶(狗地芽)		
..... (205)		
番茄(西红柿)		
..... (206)		
假酸浆(凉粉子)		
..... (207)		
烟		
..... (208)		
锦灯笼(天泡果、酸浆)		
..... (209)		
千年不烂心(苦茄、白毛藤)		
..... (210)		
刺天茄(天茄子、金纽扣)		
..... (211)		
白英(白毛藤, 毛秀才)		
..... (212)		
茄子		
..... (213)		
龙葵		
..... (214)		
蜀羊泉(青杞)		
..... (215)		
马铃薯(洋芋、地蛋)		
..... (216)		
野烟叶		
..... (217)		

瑞香花(野梦花)·····	(251)	柴胡·····	(280)
梦花·····	(252)	大马蹄草(崩大碗)·····	(281)
狼毒·····	(253)	竹叶柴胡·····	(282)
堇花·····	(254)	明党参·····	(283)
了歌王·····	(255)	蛇床子·····	(284)
骨碎补·····	(256)	芫荽(胡荽、香菜)·····	(285)
伏石蕨(抱石莲)·····	(257)	鸭儿芹(鸭脚当归)·····	(286)
抱石莲·····	(258)	野胡萝卜(南鹤虱)·····	(287)
瓦韦·····	(259)	胡萝卜·····	(288)
盾蕨·····	(260)	茴香(小茴香)·····	(289)
金星草·····	(261)	北沙参·····	(290)
鹅掌金星·····	(262)	牛尾独活·····	(291)
水龙骨·····	(263)	白云花根·····	(292)
石韦·····	(264)	大铜钱菜(中华天胡荽)·····	(293)
书带蕨·····	(265)	天胡荽(满天星、地星宿)·····	(294)
肾蕨(天鹅抱蛋)·····	(266)	川芎·····	(295)
海花菜(海藻)·····	(267)	藁本·····	(296)
海白菜(石莼)·····	(268)	羌活·····	(297)
白折耳(水折耳)·····	(269)	水芹(水芹菜)·····	(298)
折耳根(蕺菜、鱼腥草)·····	(270)	前胡(姨妈菜)·····	(299)
三白草·····	(271)	紫花前胡·····	(300)
三尖杉(土香榧、粗榧)·····	(272)	骚羊古(杏叶防风)·····	(301)
蒴藋子·····	(273)	防风·····	(302)
独活·····	(274)	云防风·····	(303)
白芷·····	(275)	十萼茄·····	(304)
大叶川芎·····	(276)	中文名笔画索引·····	(305)
当归·····	(277)	拉丁学名索引·····	(311)
芹菜(旱芹)·····	(278)		

川 乌

【来源及药用部位】毛茛科植物乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 的块根。

【本草论述】《本经》：“主中风，恶风，洗洗汗出，除寒湿痹。咳逆上气，破积聚寒热。”

【形态特征】多年生草本。茎直立，下部光滑无毛，上部散生少数贴伏柔毛。叶互生，具叶柄；叶片卵圆形，掌状3深裂，两侧裂片再2裂，边缘具粗齿或缺刻。总状花序顶生，花序轴与小花梗上密生柔毛；花蓝紫色，萼片5，上萼片高盔状，高2~2.6cm，侧萼片长1.5~2cm；花瓣2，有长爪；雄蕊多数；心皮3~5。蓇葖果3~5。花期6~7月，果熟期7~8月。

生于山地草坡或灌丛中，栽种为主。分布于四川、陕西、贵州、云南、湖北等地。

【性味功效】辛，热；有大毒。祛风除湿，温经、散寒止痛。

【常用配方】1.治跌打损伤、无名肿毒 川乌头适量，捣碎外敷患处。2.治乌鸦筋 川乌头用柴灰炮制，每次3~6g，久煎后服。3.治痈疽肿痛 川乌（炒）、黄柏（炒）各30g，研末，唾液调涂之，留头，干则以米泔润之。

【主要化学成分】含乌头碱，次乌头碱，中乌头碱，塔拉胺，消旋去甲乌药碱，异塔拉定和新乌宁碱等。

【现代研究】药理研究显示有抗炎，镇痛，降血糖，扩张血管，中枢神经系统麻痹，抗癌，消炎和肾上腺皮质兴奋等作用。人口服乌头碱的致死量约为2~5mg。现代临床用于治疗肩关节周围炎，腰腿痛；也用于手术麻醉和治疗癌症疼痛等。



关白附（白附子）

【来源及药用部位】毛茛科植物黄花乌头 *Aconitum comarum* (Lévl.) Raipaics. 的块根。

【本草论述】《名医别录》：“主心痛，血痹，面上百病，行药势。”

【形态特征】高50~120cm。块根通常倒卵形或纺锤形，常两个连生。茎直立。叶互生，具柄；叶片近五角形，掌状3全裂达基部，全裂片再一至二回羽状深裂成线形或线状披针形小裂片，先端锐尖。总状花序单一或分枝；花萼淡黄色；雄蕊多数；心皮3，子房被紧贴的白色短毛。蓇葖果3，被毛。花期8~9月，果熟期9~10月。

生于荒山坡的灌木丛或高草丛中。分布于东北和华北地区。

【性味功效】辛、甘，热；有毒。祛风痰，逐寒湿，定惊痫。

【常用配方】**1.治癫痫** 皂角60g，关白附15g，半夏、天南星、乌梢蛇、全蝎各90g，蜈蚣半条，僵蚕45g，姜汁糊丸绿豆大，每服3丸，米汤送下。**2.治中风半身不遂** 关白附、白僵蚕、全蝎（去毒）各等份，研末，每次3g，热酒调服。**3.治痰厥头痛** 关白附、半夏、天南星各等份，研末，生姜汁蒸，为丸绿豆大，每次15g，饭后生姜汁送下。

【主要化学成分】含次乌头碱，关附甲素，关附乙素，翠雀花碱，胡萝卜苷，油酸，亚油酸和棕榈酸等。

【现代研究】药理研究显示有钙通道阻滞，减慢心率，显著抗炎等作用。现代临床用于治疗癫痫，脑血栓和不明原因头痛等。



草 乌

【来源及药用部位】毛茛科野生植物北乌头*Aconitum kusnezoffii* Reichb的块根。

【本草论述】《本经》：“主中风，恶风，洗洗出汗，除寒湿痹。”

【形态特征】多年生草本，高70~150cm。块根纺锤形或倒卵形，常2~5个连生，外皮黑褐色。茎直立，光滑。叶互生，有柄；叶片近革质，卵圆形，深裂，两侧裂片再裂，各裂片边缘具粗锯齿或缺刻。总状花序或紧缩为圆锥花序；花紫蓝色，上萼片盔形，侧瓣近圆形；花瓣2，雄蕊多数，子房5个。蓇葖果长圆形。


生于灌木丛、山坡及林缘。分布于贵州以及东北、内蒙古、河北、山西等地。

【性味功效】辛、温；有大毒。祛风除湿，散寒止痛。

【常用配方】1.用于局部麻醉 草乌20g，杜衡根10g，生姜10g，泡酒外搽。2.治挫伤 草乌、垂盆草各适量，捣烂外敷。3.治关节冷痛 草乌、生姜、葱白各适量，捣烂外包。4.治一切痈肿毒 草乌、贝母、天花粉、南星、芙蓉叶等份，为末，醋调涂四周，中留头出毒，如干用醋润之。（《景岳全书》）

【主要化学成分】含乌头碱，次乌头碱，中乌头碱，附子碱，去甲猪毛碱，尼奥林和多量淀粉等。

【现代研究】药理研究显示有镇痛，强心等作用。现代临床用于治疗骨折，风湿病关节冷痛，无名肿毒和痈肿疮疖等。



藤乌头（大菀）

【来源及药用部位】毛茛科植物藤乌 *Aconitum hemsleyanum* Pritz. 的根。

【本草论述】《浙江天目山药植志》：“镇痉，镇静，降低血压，发汗，利尿。”

【形态特征】多年生缠绕草本。块根长圆锥形，长可达6cm。蔓茎于向阳的一侧呈紫色，光滑，有分枝。叶互生，宽圆卵形，叶片掌状深裂，中央裂片最大；裂片边缘疏生钝齿；叶基部楔形或浅心形，两面光滑无毛。花序含2~12小花，萼片5，蓝紫色，花瓣状，上萼片盔形，雄蕊多数。蓇葖果长圆筒形。

生于山坡树丛或叶缘路边阴湿处。分布于贵州、云南、四川、湖北、湖南、陕西、河南、江苏和浙江等地。

【性味功效】辛，温；有大毒。发汗，镇痉止痛，解毒消疮。

【常用配方】1.治无名种毒 藤乌适量，以米汤在粗碗上磨成糊状，外敷患处；已溃烂破口者要留头。2.治跌打损伤 藤乌头1.5g，水煎，冲酒服；或将根与豆腐煮制后晒干，酒炒研细粉，每次吞服0.6g。3.治瘰疬 藤乌头适量，研末水调敷。

【主要化学成分】块根含滇乌头碱，乌头碱和乙酰乌头碱等。

【现代研究】现代临床用于治疗无名肿毒，跌打损伤肿痛和皮肤真菌性感染等。



活血莲（墨七）

【来源及药用部位】毛茛科植物花葶乌头 *Aconitum scaposum* Franch. 或聚叶花葶乌头 *Aconitum scaposum* Franch. var. *vaginatum* (Pritz.) Rapaics 的根。

【本草论述】《贵州民间药物》：“活血调经，止痛。”

【形态特征】**花葶乌头**：多年生草本，高35~67cm。根近圆柱形。茎直立，稍密被反曲的淡黄色短毛。叶互生，基生叶3~4，有长柄；叶片肾状五角形，基部心形，3裂，深超过中部，边缘有粗齿，侧裂片斜扇形；茎生叶小，2~4；叶柄鞘状。总状花序有花15~40；花梗被淡黄色长毛；小苞片生花梗基部；花两性，两侧对称；萼片5，花瓣状，蓝紫色；花瓣2，拳卷；雄蕊多数；心皮3。蓇葖果。种子多数，倒卵形。花期8~9月，果熟期9~10月。

生于海拔1 200~2 000m山地沟谷或阴湿林中。分布于陕西、江西、河南、湖北、四川和贵州等地。

【性味功效】苦、辛，温；有毒。活血调经，散瘀止痛。

【常用配方】**1.治跌打损伤** 活血莲、见血飞、赤芍各15g，水酒各半煎服。**2.治月经不调** 活血莲、赶血王各9g，泡酒服。**3.治风湿痹痛** 活血莲3g，老鹤草10g，伸筋草20g，泡酒服。**4.治骨折伤痛** 活血莲15g，泡酒内服外搽。

【主要化学成分】根含花葶乌头宁，花葶乌头碱和N-去乙酰乌头碱等。

【现代研究】现代临床用于治疗风湿病关节肿痛，跌打损伤，骨折，月经不调和肺结核等。



高乌头（麻布七）

【来源及药用部位】毛茛科植物高乌头 *Aconitum sinomontanum* Nikai 的根。

【本草论述】《陕西中草药》：“活血散瘀，消肿止痛，祛风湿。治跌打损伤，骨折，风湿腰腿痛，劳伤，疮疖，瘰癧。”

【形态特征】多年生草本。根圆柱形。茎直立，微具棱。叶互生，基生叶1，茎生叶4~6；具长柄，无毛，叶片肾形或圆形，基部深心形，3深裂几达基部。总状花序顶生，下部具分枝，花梗基部具1苞片，中部具2小苞片；花紫色；萼片5，淡紫色；花瓣2；雄蕊多数。蓇葖果，无毛。花期6~9月，果熟期7~10月。

生于山坡草地或林中。分布于河北、山西、陕西、甘肃、湖北、湖南、四川和贵州等地。

【性味功效】苦、辛，温；有毒。祛风除湿，理气止痛，活血消肿。

【常用配方】1.治跌打损伤 高乌头15g，泡酒，早晚服。

2.治心悸 高乌头3g，木香1.5g，甜酒蒸服。3.治胃气痛 高乌头6g，水煎服。4.治瘰癧，疮疖 高乌头、金线吊葫芦各适量，捣烂敷患处。

【主要化学成分】根含牛扁酸单甲酯，刺乌头碱及毛茛叶乌头碱等。

【现代研究】药理研究显示有抗炎，解热和局部麻醉等作用。现代临床用于治疗风湿病关节肿痛，跌打损伤，骨折，风湿病腰腿痛，劳伤，疮疖和瘰癧等。

