

傷寒方解



中華民國貳拾壹年玖月出版

(祝氏醫學叢書四集)

叁元

著作者

山陰祝味菊

參校者

羅敬安 祝銘和 徐仲才 徐伯遠 王儀均

發行者

祝味菊

印刷者

美星印刷所

總發行所

上海法租界愷爾路振平里二十三號

祝味菊醫士診所



南京中医药大学图书馆版权所有

味菊著

傷寒方解

于亮



凡例

一 本書於方之次第。及所引條文。悉遵趙開美翻刻傷寒宋本。

一 各方主藥。間有本諸臨牀經驗。而獨標創解者。如桂枝湯之應以芍藥爲主藥。卽其一例也。讀者宜注意及之。

一 一方之下。凡適用本方之條文。皆詳爲列舉。藉資參證而便類別。

一 本書重在整個的方。不在單純藥物。苟此方而合於此證。則不問其病之原因如何。皆一例治之。覆杯有效。蓋仲景大法。全在審視病理與自然療能之趨勢是否相合而已。明者辨之。

一 傷寒論原有一百一十三方。今本書僅錄一百另五方者。因與傷寒六經無關之霍亂、陰陽易、差後勞復諸方除外故耳。

一 方中湯名。如青龍、白虎、真武等。則於玄學染色太深。他若陷胸、

瀉心、承氣、抵當等。雖有意義。無關宏旨。故均不與解釋。

一 本書對於方中藥物之詮釋。皆依據本經及近世藥理學而說明之。其他類乎神祕者。概不徵引。

一 本書與拙著傷寒新義具有連帶關係。故宜對照參閱。相互發明。

目錄

一	桂枝湯方	一
二	桂枝加葛根湯方	三
三	桂枝加附子湯方	四
四	桂枝去芍藥湯方	五
五	桂枝去芍藥加附子湯方	五
六	桂枝麻黃各半湯方	六
七	桂枝二麻黃一湯方	七
八	白虎加人參湯方	八
九	桂枝二越婢一湯方	九
一〇	桂枝去桂加茯苓白朮湯方	一〇

一一	甘草乾薑湯方	一一
一二	芍藥甘草湯方	一一
一三	調胃承氣湯方	一二
一四	四逆湯方	一三
一五	葛根湯方	一四
一六	葛根加半夏湯方	一五
一七	葛根黃芩黃連湯方	一六
一八	麻黃湯方	一七
一九	大青龍湯方	一八
二〇	小青龍湯方	一九
二一	桂枝加厚樸杏子湯方	二〇
二二	乾薑附子湯方	二一

二三	桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯方	一二二
二四	麻黃杏仁甘草石膏湯方	一二一
二五	桂枝甘草湯方	一二三
二六	茯苓桂枝甘草大棗湯方	一二四
二七	厚朴生薑半夏甘草人參湯方	一二五
二八	茯苓桂枝白朮甘草湯方	一二五
二九	芍藥甘草附子湯方	一二六
三〇	茯苓四逆湯方	一二六
三一	五苓散方	一二七
三二	茯苓甘草湯方	一二八
三三	梔子豉湯方	一二九
三四	梔子甘草豉湯方	一二九

三五 梔子生薑豉湯方……………三〇

三六 梔子厚樸湯方……………三一

三七 梔子乾薑湯方……………三一

三八 小柴胡湯方……………三二

三九 小建中湯方……………三四

四〇 大柴胡湯方……………三五

四一 柴胡加芒消湯方……………三六

四二 桃核承氣湯方……………三七

四三 柴胡加龍骨牡蠣湯方……………三八

四四 桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯方……………三九

四五 桂枝加桂湯方……………四〇

四六 桂枝甘草龍骨牡蠣湯方……………四〇

四七	抵當湯方	四一
四八	抵當丸方	四二
四九	大陷胸丸方	四二
五〇	大陷胸湯方	四三
五一	小陷胸湯方	四五
五二	文蛤散方	四五
五三	白散方	四六
五四	柴胡桂枝湯方	四七
五五	柴胡桂枝乾薑湯方	四八
五六	半夏瀉心湯方	四九
五七	十棗湯方	五〇
五八	大黃黃連瀉心湯方	五一

五九 附子瀉心湯方.....五二

六〇 生薑瀉心湯方.....五二

六一 甘草瀉心湯方.....五三

六二 赤石脂禹餘糧湯方.....五四

六三 旋覆代赭石湯方.....五五

六四 桂枝人參湯方.....五五

六五 瓜蒂散方.....五六

六六 黃芩湯方.....五七

六七 黃芩加半夏生薑湯方.....五八

六八 黃連湯方.....五八

六九 桂枝附子湯方.....五九

七〇 去桂加白朮湯方.....六〇

七一	甘草附子湯方	六一
七二	白虎湯方	六二
七三	炙甘草湯方	六二
七四	大承氣湯方	六三
七五	小承氣湯方	六四
七六	猪苓湯方	六五
七七	蜜煎方	六六
七八	茵陳蒿湯方	六七
七九	吳茱萸湯方	六八
八〇	麻子仁丸方	六八
八一	梔子蘘皮湯方	六九
八二	麻黃連軹赤小豆湯方	七〇

八三 桂枝加芍藥湯方.....七〇

八四 桂枝加大黃湯方.....七一

八五 麻黃附子細辛湯方.....七二

八六 麻黃附子甘草湯方.....七二

八七 黃連阿膠湯方.....七三

八八 附子湯方.....七三

八九 桃花湯方.....七四

九〇 豬膚湯方.....七五

九一 甘草湯方.....七五

九二 桔梗湯方.....七六

九三 苦酒湯方.....七六

九四 半夏散及湯方.....七七

九五	白通湯方·····	七七
九六	白通加豬膽汁湯方·····	七八
九七	真武湯方·····	七九
九八	通脈四逆湯方·····	八〇
九九	四逆散方·····	八一
一〇〇	烏梅丸方·····	八二
一〇一	當歸四逆湯方·····	八三
一〇二	當歸四逆加吳茱萸生薑湯方·····	八五
一〇三	麻黃升麻湯方·····	八五
一〇四	乾薑黃芩黃連人參湯方·····	八六
一〇五	白頭翁湯方·····	八七

傷寒方解

祝味菊著

胞弟敬銘受業

曾濟和
羅濟安
徐伯遠

徐仲才
王儀均

參校

桂枝湯方

桂

枝三兩
去皮

芍

藥三兩

甘

草二兩
炙

生

薑三兩
切

大

棗十二
枚擘

右五味。㕮咀三味。以水七升。微火煮。取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已須臾。歔熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。偏身絜絜。微似有汗者。益佳。不可令如水流漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一

劑盡。病證尤在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷黏滑。肉麵五辛。酒酪臭惡等物。

解本方乃傷寒祖方之首選。爲調和營衛之主劑。其組合應以芍藥爲主藥。桂枝爲重要副藥。蓋適用本法之標準。在皮膚蒸發機能亢進而自汗出者。故用芍藥以調節其亢進之機轉。而桂枝則不過補助心臟之作用而已。故麻黃湯中亦用之。其非主藥可知矣。他如甘草之和中助液。生薑煖胃。大棗培中。皆所以補償其自汗之消耗也。

太陽病上一二條、一三條。皆爲桂枝湯所主之證。太陽病中四二條、四四條、四五條、五三條、五四條、九三條、九七條。陽明病二四六條。太陰病二八九條。厥陰病三八五條。皆宜桂枝湯之證。太陽病一五條。爲可與桂枝湯之證。

煮服法中應注意者有三點。一。用微火煮者。恐傷藥力也。二。歡熱稀

粥者。使胃中水穀之氣充分。而增加其抵抗也。三。徧身微似有汗不可令如水流漓者。恐大汗傷液而反牽掣其調節之機轉也。

桂枝加葛根湯方

葛

根 四兩

麻

黃 三兩
去節

芍

藥 二兩

生

薑 三兩
切

甘

草 二兩
炙

大

棗 十二
枚擘

桂

枝 二兩
去皮

右七味。以水一斗。先煮麻黃葛根。減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須歎粥。餘如桂枝法將息及禁忌。

解本方係桂枝湯加入葛根麻黃二味。惟他本皆無麻黃。是也。蓋其適用標準。較桂枝湯證。僅多一項背筋肉麻痺之證象。其他如汗出、惡風、營衛不調等。皆與桂枝證無異。以其汗出。故無用麻黃之必要。加葛根者。