



中華民國二十六年四月初版

醫學綱目 (全四冊)

實價國幣三元

(外埠酌加運費匯費)



編纂者 樓全善

發行者 陸高誼

出版者 上海大連海路
世界書局

發行所 上海及各省 世界書局

本書負責校對者何衡孫



醫學綱目卷之三十一 傷寒部

陽明病 胃實不大便 自汗 不得臥 潮熱 譫語 狂

亂 循衣摸牀 渴 嘔 乾嘔

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便。胃中燥。煩實。大便難是也。陽明之爲病。胃家實也。問曰。緣何得陽明病。答曰。太陽病發汗若下。若利小便者。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實。大便難者。此名陽明病也。傷寒脈浮而緩。手足自溫者。是爲繫在太陽。太陽者身當發黃。若小便利不能發黃。至七八日大便鞭者。爲陽明病也。陽脈實因發其汗。汗出多者。亦爲太過。太過爲陽絕於裏。亡津液。大便因鞭也。陽明病若能食爲中風。不能食爲中寒。陽明病但頭眩不惡寒。故能食而欬。其人必咽痛。若不欬者。咽不痛也。陽明病不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故攻其熱必噦也。陽明病脈遲食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀疸。下之腹滿如故。所以然者。脈遲故也。陽明病欲解時。從申至戌止。傷寒嘔多。雖有陽明症。不可攻也。陽明病面合赤色。不可攻之。攻之必發色黃。小便利也。

陽明裏證
實胃家

中風
中寒

忌攻

胃實
有表
解者先

脇痛
脈浮
和弦宜

口苦
脈浮
和弦宜

胃實
有表
解者先

陽明病心下鞭滿者不可攻之。攻之利遂不止者死。利止者愈。

傷寒不大便六七日。頭痛有熱者。與承氣湯。其小便清者。知不在裏。仍在表也。須當發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。陽明病。脈浮無汗。

而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。陽明病。脇下鞭滿。大便不利而嘔。舌

上白胎者。可與小柴胡湯。若上焦得通。津液得下。胃氣因和。身

然汗出而解。陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹滿。脇下及心痛。久按

之氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時

噦。耳前後腫。刺之小瘡。外不解。病過十日。脈續浮者。與小柴胡湯。脈

但浮無餘症者。與麻黃湯。若不小便。腹滿加噦者不治。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮而緊。若下之。則腹滿。

小便難也。許學士云宜小柴胡湯陽明腹滿。脈浮緊。口苦咽乾而喘。若發熱汗

出。不惡寒反惡熱。身重者。忌發汗。忌加燒針。忌下也。論見自汗陽明病。

脈浮而緊者。必潮熱發作有時。但浮者必盜汗出。

右胃家實不大便。雖三尺之童。亦知可下也。殊不知仲景之法。雖

有胃實症。若表未解。及有半表者。亦先用桂枝柴胡以解外。然後

視虛實消息之也。

陽明病自汗出。若發汗。小便自利者。此為津液內竭。雖硬不可攻之。當須自欲大便時。宜用蜜煎導而通之。若土瓜根及入猪膽汁皆可。

攻者忌
便硬者
導之

便硬
無所
苦者
俟之

胃實
表解
有證
者隨
證攻

導之 蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦候可丸以手捏作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之又猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀道中如飯時頃大便自去

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散陽明病本自汗出醫更重發汗病已瘥尙微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

陽明病潮熱不大便六七日恐有燥糞欲知之法少與小承氣湯轉矢氣者有燥屎可攻若不轉矢氣者無燥糞不可攻

方論見
潮熱

陽明病

汗出大便鞭而譫語者宜小承氣湯

方見
譫語

不大便腹滿者宜下之

若但饒臍痛者則爲燥屎宜承氣湯

方見
譫語

若心下至小腹滿痛者則爲

結胸宜陷胸湯

方見
腹滿

陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯

陽明病發熱汗出。此爲越熱。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。汗劑頸而還。小便不利。渴飲水漿者。此爲瘧熱在裏。身必發黃。茵陳湯主之。小便不利。大便乍難乍易。有微熱。喘冒不臥者。宜大承氣湯。論見不陽明症。其人喜忘者。必有畜血。所以然者。本有久瘧血。故令喜忘。得臥尿雖鞭。大便反易。其色必黑。宜抵當湯下之。方見畜血脈數不解。消穀易飢。六七日不大便者。有瘧血。宜抵當湯。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此爲實也。急下之。宜大承氣湯。跌陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便難。其脾爲約。麻仁丸主之。

麻仁丸

丹溪云氣實而表藥也

麻仁升一

芍藥

厚朴

去皮薑製

枳實

各四兩

杏仁

大黃

煨各八兩

右爲末。蜜和丸。如桐子大。米飲下二三十九丸。未知。益之。每日三服。

陽明口燥。但欲漱水不欲嚥者。此必衄。

括人云輕則犀角湯重則抵當湯

許學士有一士

人家病二人。皆旬日矣。一則身熱無汗。大便不通。小便如澀。神昏而

睡。診其脈長大而實。予用承氣下之而愈。一則陽明自汗。大便不通。

小便利。津液少。口乾燥。其脈亦大而虛。作蜜煎三易之。下燥糞得溏

利而解。其家曰。皆陽明不通。何以治之異。予曰。二症雖相似。然自汗

不漱水者。宜下。脈實者。宜下。脈虛者。宜下。

胃實
反無
汗者
虛邪

陽結

陰結

胃實

欲寐

陰者少

針灸

陰症

陽明
外證
身熱

小便利者。不可蕩滌五臟。爲無津液也。然則傷寒大症相似。兩症稍有不同。宜仔細斟酌。正如格局看命。雖年月日時皆同。而貴賤窮通不相侔者。於一時之中有淺深。故知不可不謹。

陽明病發多反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此久虛故也。陽明病。

反無汗。而小便利。三日嘔而欬。手足厥者。必頭痛。若不欬嘔。手足不厥者。頭不痛。註云小便利者寒邪內攻。肢厥頭痛寒邪外攻也。陽明胃實。脈浮無汗而喘。宜麻黃

湯。論見胃實有表條。陽明病無汗。小便利。心中懊懣者。身必發黃。宜茵陳蒿湯。

脈浮而數。能食。不大便者。此爲實。名曰陽結也。期十七日當劇。脈沉而遲。不能食。身體重。大便鞭。名曰陰結也。期十四日當劇。

少陰病。但欲寐。腹脹不大便者。承氣湯主之。論見但欲寐。

胃實續法

〔集〕傷寒大便不通。期門。一云章門。照海。

〔海〕已寒丸。治陰症。服四逆數日不大便。躁渴者。方見躁條。

自汗

〔成〕自汗者。謂不因發散而自然汗出也。

問曰。陽明外症云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒。反惡熱也。問曰。病有得之一日不發熱而惡寒。何也。答曰。雖得之一日。惡寒將自罷。卽自

自汗
不惡寒

下證

急下
證

汗出而惡熱也。問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中土。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。傷寒轉屬陽明者。其人漉然微汗出也。

〔本〕太陽初得病時。發其汗。先出不徹。因轉屬陽明也。汗出身熱。

不惡寒。便鞭譫語者。宜承氣湯。論見
譫語

陽明病發熱汗多者。急下之。宜大承氣湯。

〔許〕有人患傷寒。目痛鼻乾不得臥。大便不通。尺寸脈俱大。已數日。一夕汗出。予謂速以大柴胡湯下之。醫駭曰。陽明自汗。津液已涸。法當用蜜煎。何須苦用下藥。予謂曰。子雖知蜜煎爲穩當。還用大柴胡湯。此仲景不傳之妙。公安能知之。予力爭竟投大柴胡湯二帖。愈。仲景論陽明之病。多汗者急下之。人多謂已是自汗。若又下之。豈不表裏俱虛。又如論少陰云。少陰病一二日。口乾燥者急下之。人多謂病發於陰。得之日淺。但見乾燥。若更下之。豈不陰氣愈甚。舉此二端。則其可疑者不可勝數。此仲景之書。世人罕能讀也。予謂仲景稱急下之者。亦猶急當救表急當救裏之說。凡稱急者有三變。謂纔覺汗未至。津液乾燥。便速下之。則爲精捷。免致用蜜煎也。若胸中識得了。自無可疑。若未能了。誤用之。反不若蜜煎之爲穩也。

陽明脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。

症

小便不利 欲食 解者 不欲 食者 癰瘕 似陽 明二 症 表裏 汗出 身熱 惡寒 屬表 寒屬 裏 汗出 不渴 汗出 心痞 有二 症

若發汗。則心憤憤反譫語。若加燒針。必怵惕躁不得眠。若下。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊懣。舌上胎者。梔子豉湯主之。若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加入參湯主之。若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。註云脈浮發熱口苦者邪在表脈緊自汗腹滿不惡寒者邪在裏此表裏俱有邪宜和解

陽明欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。蹇然汗出而解。此水不勝穀氣與汗共并。脈緊則愈。

陽明病若中寒不能食。小便不利。手足蹇然汗出。此欲作癰瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷。水穀不別故也。

太陽病發熱汗出。不惡寒者。為柔痊。論見 太陽病吐後汗出。不惡

寒。發熱。關上脈細數。曰小逆。論見發熱

汗出。身熱不惡寒。裏症。前條陽明病是也。汗出。身熱惡風寒者。宜

桂枝湯。論見發熱 兼項強痛者。桂枝加葛根湯。論見項強 兼骨節煩疼。不得

屈伸。小便不利者。甘草附子湯。論見風濕身熱條 若發汗後遂漏不止。惡風

者。桂枝附子湯。論見後條 若夏月中暑。自汗。身熱惡寒。脈微弱。口渴足

冷者。白虎加入參湯主之。方論見中暑

傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。汗出心下

痞滿有二症。其痞按之濡軟不痛而惡寒者。宜附子瀉心湯。其痞按

之鞭。引脇痛。而身體不惡寒者。宜十棗湯。方論見痞條

汗後
微汗不

太陽病發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。

桂枝附子湯

附子製一

桂枝去皮二兩

生薑一兩

甘草炙一兩

大棗六枚

右咬咀。每服五錢。水煎溫服。

〔許〕有一人得太陽症。因發汗。汗不止。惡風。小便澹。足攣而不伸。予診其脈浮而大。浮爲風。大爲虛。予曰。在仲景方中有兩症。大同而小異。一則小便難。一則小便數。用藥少差。卽有千里之失。仲景第七症云。太陽發汗。遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯。第十六症云。傷寒脈浮。自汗出。小便數。心煩。微惡寒。腳攣急。反以桂枝湯攻表。此誤也。得之便數。咽中乾。煩躁吐逆。一則漏風。小便難。一則自汗。小便數。或惡風。或惡寒。病各不同也。予用第七症桂枝加附子湯。三啜而汗止。佐以甘草芍藥湯。足便得伸。

二陽併病。太陽病。發汗不徹。因轉屬陽明。續自微汗出。不惡寒。其人面赤。躁煩短氣。不知痛處。但坐更發汗則愈。

論見
面赤

發汗已。身灼熱者。名風溫。風溫爲病。脈浮汗出。身重多眠。宜葳蕤湯。

風溫
症

論見
風溫

胃乾

動氣

汗出而喘

汗出下利

汗出吐利

診忌

陰陽

發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。少少與之。論見不得眠

動氣在左。發汗則頭眩汗不止。筋惕肉瞤。此為逆。難治。治法見後續條

汗下後汗出而喘者。麻黃杏仁甘草石膏湯。下後利不止。脈促。喘

而汗出者。葛根黃芩黃連湯。論俱見喘

汗出下利。熱不去。厥逆惡寒者。四逆湯。

下利清穀者。通脈四逆湯。論俱見下利 汗出下利有微熱者。其脈數自愈。

脈緊未愈。論見下利 六七日後發熱而利。其人汗出不止者死。論見下利

脈緊反汗出。而咽痛吐利者。少陰病亡陽。吐利汗出。手足厥冷。脈

微欲絕者。四逆湯。吐利止。汗出而厥。脈微欲絕者。通脈四逆加猪

膽汁湯。方論並見吐利

脈陽微而汗出者。為自和也。汗出多者為太過。陽明汗多而渴者。

不可與猪苓湯。脈浮自汗。若小便數。腳攣急者。不可與桂枝湯。

自汗續法

〔海〕太陽自汗桂枝湯。陽明自汗白虎湯。少陰自汗四逆湯。

陽明症。身熱。目痛。鼻乾。不得臥。不惡寒而自汗。或惡熱。而尺寸俱浮

者。白虎湯主之。傷寒尺寸脈俱長。自汗大出。身表如冰石。脈傳至

于裏細而小。及瘧疾但寒不熱。其人動作如故。此陽明傳入少陰。戊

合癸。即夫傳婦也。白虎加桂枝主之。然脈雖細小。當以遲疾別之。此

症脈疾而非遲。故用此法。白虎加桂枝湯方見瘧如中暑自汗微惡寒者亦宜服之

〔活〕傷寒應發汗。而動氣在左。不可發汗。發汗則頭眩汗出。筋惕肉瞤。此爲逆。難治。先服防風白朮牡蠣散。次服建中湯。

防風白朮牡蠣散。治發汗多。頭眩汗出。筋惕肉瞤。

防風

牡蠣炒成粉

白朮各等分

右爲細末。每服二錢。以酒調下。米飲亦得。日二三服。汗止後服小建中湯。

〔成〕或汗出髮潤。與其出如油。或大如貫珠着身。出而不流。皆爲不治之症。

〔集〕傷寒汗多不止。內庭篇 合谷篇 復溜篇

二陽併病。潮熱譫語。而手足漿漿汗出者。陽明病短氣腹滿。而手足

纖然汗出者。俱宜大承氣湯。方論見潮熱 陽明病不能食。小便不利。手足

纖然汗出者。胃冷欲作痼瘕。必大便秘。初鞭後溏。論見自汗

不得臥

身熱。目疼。鼻乾。不得臥。尺寸脈俱長者。陽明受病也。病人小便不利。

大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。宜大承氣湯。

汗後大汗出。煩躁不得眠。欲飲水者。少少與之。愈。論見渴 汗下後不

得眠。若反覆顛倒。心中懊懣者。梔子豉湯。方論見煩 若但晝不得眠。夜

診

針灸

手足
寒熱

陽明
裏

安靜。不嘔。不渴。無表症。脈沉微。無大熱者。宜乾薑附子湯。論見煩躁
少陰病欲寐。二三日後。煩心不得臥者。黃連阿膠湯主之。論見煩躁
黃連阿膠湯

黃連

阿膠各一兩

黃芩五錢

芍藥一兩

雞子黃一箇

右咬咀。水二盞。煎八分。去渣。納膠消盡。又納雞子黃攪勻。溫服。日

三。

少陰病。下利欲寐。六七日後。咳而嘔渴。心煩不得眠者。宜豬苓湯。論見

少陰病。但欲寐。脈沉細不煩。五六日變自利。煩躁不寐者死。論見不得

發熱下利。厥逆煩躁。不得臥者死。論見下利

不得臥續法

〔活〕傷寒吐下後。心煩之氣。日夜不得眠者。酸棗仁湯主之。酸棗仁湯。

酸棗仁一升

麥門冬去心一合

甘草炙二錢半

知母半兩

茯苓

川芎

乾薑各一兩

右咬咀。每服四錢。水煎服。

傷寒大熱。乾嘔。呻吟錯語。不得眠者。黃連解毒湯主之。

黃連

黃芩

黃柏各半兩

山梔二錢

一方有阿膠錢二

右咬咀。每服五錢。水煎服。如未知。再服。進粥。以此漸瘥。傷寒瘥後。虛煩不得眠。心中懊懣者。烏梅湯主之。

梔子炒牛

烏梅去核

黃芩

甘草炙各

柴胡雨一

右咬咀。每服四錢。薑三片。豉五十粒。煎至七分。去渣。溫服。一本有竹葉七片。

潮熱

表裏

〔成〕潮熱者。若潮水之潮。其來不失時也。一日一發。指時而發者。謂之潮熱。若日三五發者。是卽發熱。非潮熱也。潮熱屬陽明。必於日晡時發者。乃爲潮熱。

陽明病。潮熱。大便微鞭。可與大承氣湯。不鞭者不與之。若不大便六七日。恐有燥糞。欲知之。可少與小承氣湯。入腹中轉矢氣者。此有燥糞。乃可攻之。若不轉矢氣者。此但初頭鞭。後必瘡。不可攻之。攻之必脹滿。不能食也。欲飲水者。與之則噦。其後發熱者。必大便復鞭而少也。以小承氣湯和之。不轉矢氣者。慎不可攻也。

陽明病。脈遲。雖汗出不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濇然汗出者。此大便已鞭也。大承氣湯主

陽明
病有
下症

便滿
脈弦
浮而
潮熱
和者
宜

之。若汗多微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄下。

陽明病。胃實譫語而潮熱者。承氣湯主之。

大承氣湯 海藏云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃泄實必痞滿燥實四症全者方可用之

大黃 酒浸一兩治不大便地道不偏

枳實 一枚治心下痞按之良久氣散痛緩此并主心下滿乃肝之氣盛也

右咬咀。水二大盞。煎枳朴至一大盞。下大黃復煎至六分。去渣入

硝。又煎一二沸。溫服。如未利。再作與服。以通為度。

小承氣湯 海藏云大黃泄實厚朴去痞必痞實全者可用

大黃 酒浸一兩 厚朴 薑製二錢 枳實 炒一

右咬咀。同上法煎。溫服。以利為度。不利再服。不大便。舌燥。心下

滿痛。而日晡小有潮熱者。宜大陷胸湯。 論見結胸

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自利。胸脇滿不去者。小柴胡湯主之。 陽明

為病胃實是也今便溏而言陽明病者謂陽明外症身熱汗出不惡寒反惡熱之病也

陽明中風。脈弦浮大。短氣。腹滿。脇下及心痛。鼻乾不得汗。嗜臥。身黃。

小便難。時時噦而潮熱者。小柴胡加茯苓主之。 傷寒十三日不解

胸脇滿而嘔。日晡時發潮熱。已而微利。此必柴胡症。下之而不得利。

今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯

以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。

柴胡兩一

黃芩

人參

甘草炙

生薑

已上各五錢

半夏

湯浸三箇

大棗

三枚

芒硝

兩一

每服五錢。水一盞半。煎至八分。去渣。納芒硝。更微沸溫服。

陽明病。脈浮緊者。必潮熱發作有時。

論見胃實有表條

潮熱續法

熱

〔活〕多月陽明潮熱。脈浮而緊者。發作有時。但脈澁者。必盜汗。黃芩湯主之。

方見下利

譫語

陽明
宜下
症

陽明爲病。胃家實是也。胃實則譫語。故譫語宜入陽明門。陽明病。譫語。發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一盞。腹中轉矢氣者。更服一盞。若不轉矢氣。勿更與之。明日不大便。脈反微澁者。裏虛也。爲難治。不可更與承氣湯。陽明病。譫語。有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚。若能食者。但輒亦宜大承氣湯下之。二陽併病。太陽病罷。但發熱。手足絳。汗出。大便難而譫語者。下之則愈。宜大承氣湯。陽明病。其人多汗。以津液出。胃中燥。大便必輒。輒則譫語。小承氣湯主之。若一服譫語止。勿更服。汗出譫語者。必有燥糞在胃中。此爲風也。須下之。必過經乃可下。下

證

實則
譫語
鄭聲

汗後
譫語

汗多
亡陽
忌下

火後
譫語

之若早。語言必亂。以表虛裏實。故下之則愈。宜大承氣湯。夫實則譫語。虛則鄭聲。譫語者謂亂語無次第數數更端也。鄭聲者謂鄭重煩煩也。只將一句舊言重疊頻言之。終日殷勤不換他聲也。蓋神有餘則能機變而亂語數數更端神不足則無機變而只守一聲也。

傷寒四五日。

脈沉而喘滿。沉爲在裏。而反發其汗。津液

成無已謂鄭聲爲鄭衛之聲。非是。前辨已明。

越出。大便爲難。表虛裏實。久則譫語。少陽病發汗後及小便數。腳攣急。誤與桂枝攻表後。若胃不和譫語者。少與調胃承氣湯。

方論見厥

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁

而面垢。譫語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足逆冷。若自汗出者。白虎湯主之。論見身重

汗發多。亡陽譫語者。不可下。與柴胡桂枝

湯。和其榮衛。以通津液。後自愈。發汗多。又重發汗者。亡其陽。譫語脈

短者死。脈自和者不死。諸逆發汗。病微者瘥。劇者言亂。目眩者死。

形作傷寒。其脈不弦緊而弱。弱者必渴。脈瀼者必譫語。弱者發熱。脈

浮。解之當汗出愈。

太陽病。火劫汗後。身黃。小便難。身體枯燥。頭汗腹滿。微喘。或不大便。

久則譫語。論見頭汗太陽病。二日反躁。乃熨其背。而大汗出。火熱入胃。

胃中水竭。躁煩。必發譫語。十餘日振慄自下利者。此爲欲解也。故其

汗從腰已下。不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失溲。足下惡風。大便鞭。小

便當數。而反不數。及多。大便已。頭卓然而痛。其人足心必熱。穀氣下

流故也。少陽病欬。欬而下利。譫語。小便難者。被火氣劫汗故也。吐

流故也。少陽病欬。欬而下利。譫語。小便難者。被火氣劫汗故也。吐