

醫藥顧問

民衆實驗



上海中央書店
印書行



南京中医药大学图书馆版权所有

民衆醫藥顧問細目

第二冊

外科門

【一】疔瘡 疔瘡總說

卅種疔瘡	二
疔毒通治	一一
額骨疔瘡	一三
鼻內疔瘡	一四
唇疔口疔	一五
耳內黑疔	一五
牙疔疼痛	一六
腋下疔瘡	一七
蛇頭疔毒	一八
手臂疔毒	一八
螺疔通治	一九

【二】癰疽 癰疽總說

紅絲疔毒	一九
羊毛疔毒	二〇
黃色水疔	二〇
刀鏹疔毒	二〇
面上疔毒	二〇
魚臍疔毒	二〇
魚睛疔毒	二一
疔瘡出血	二一
疔瘡走黃	二一
疔瘡不破	二一
疔根不出	二一
項門生癰	二四
地角下疽	二五
頸上生癰	二六
瘰癧癰毒	二八

【三】丹毒 丹毒總說

臂上生癰	二九
手腕生癰	三〇
乳房生癰	三〇
臍上生癰	三〇
腎囊生癰	三二
陰下生癰	三三
項中生疽	三三
腰間生疽	三四
附骨疽毒	三五
諸般丹毒	三七
眼丹難視	三八
面上生瘡	四一
燕窩瘡毒	四二
耳內生瘡	四三

【四】諸瘡 諸瘡總說

旋耳瘡毒	四五
口內生瘡	四六
陰器生瘡	四七
臙骨生瘡	五〇
鵝口瘡毒	五二
淫毒生瘡	五二
腳氣淫瘡	五三
諸般惡瘡	五四
頭上禿瘡	五五
髮際生瘡	五六
鼻下腫瘡	五七
鼻內生瘡	五八
漏眼睛瘡	五八
指掌癰瘡	五九
陰虱瘡癢	六〇
婦人陰瘡	六〇
坐板瘡症	六二
粟瘡作癢	六三
諸般疥癬	六四

六種癰瘡	六六
黃水瘡癢	六八
翻花瘡菌	六九
血風瘡癢	六九
浸淫瘡疥	七一
火赤瘡毒	七一
貓眼風瘡	七三
魚脊瘡毒	七三
漆瘡斑爛	七四
天庖瘡豆	七五
冬生凍瘡	七六
瘡入毒水	七六
瘡生蠅疽	七八
【五】癰瘤 癰瘤總說	
諸般癰瘤	七九
諸般瘰癧	八三
皮裏結核	八七
【六】腫瘍 腫瘍總說	
腦後發毒	八九

面上發毒	九〇
頰部疔腫	九一
項頰時毒	九二
失榮敗症	九三
耳發疼痛	九三
骨槽風毒	九四
舌下痰包	九六
蜂窩發背	九六
酒毒發背	九六
連珠發背	九八
痰注發背	九八
蠅蝨串毒	九九
腎俞發背	一〇〇
掌心結毒	一〇一
病蝦疼痛	一〇三
蛇頭疔毒	一〇四
蟻蠅蛇痛	一〇五
天蛇頭毒	一〇七
委中毒發	一〇八

鵝膝風痛	一〇九
鰲眼風溼	一一一
腓腸發痛	一二二
足生發背	一一三
諸般流注	一一四
無名腫毒	一一八
【七】潰瘍 潰瘍總說	
螻蛄癰毒	一二五
口糜不食	一二七
下唇風症	一二八
溼毒流注	一二九
田螺蛇毒	一三〇
大麻風症	一三一
【八】雜症 雜症總說	
油風禿症	一三五
白屑風症	一三六
面上雀斑	一三六
面上黑痣	一三七
面遊風症	一三八

鰲黑肝瘡	一三九
鈕扣風症	一三九
鼻內生痔	一四〇
酒皸鼻症	一四一
齒唇疼痛	一四一
眼皮翻症	一四三
目中贅肉	一四三
內發丹毒	一四五
纏腰火丹	一四五
鵝掌風症	一四七
腿游風症	一四八
腎囊風症	一四九
腎氣遊風	一四九
鱗漏黃水	一五〇
血彎風症	一五〇
鼻田螺症	一五一
牛程躑症	一五一
脚生肉刺	一五二
癰發疼痛	一五三

烏白癩症	一五五
赤日遊風	一五六
紫白癩風	一五八
癰毒小節	一五九
瘡癰宣腫	一六〇
漫淫瘡疥	一六一
皮膚白疔	一六二
血出如箭	一六二
血毒流血	一六三
癰瘍風症	一六四
枯筋箭症	一六四
諸般痔瘡	一六五
【九】小兒瘡瘍 小兒瘡瘍總說	
小兒丹毒	一七〇
小兒疔瘡	一七一
小兒時毒	一七二
小兒流注	一七三
天疱瘡毒	一七五
小兒口瘡	一七六

小兒肺癰	一七九
小兒腸癰	一八〇
小兒囊癰	一八二
小兒腹癰	一八三
頭面瘡毒	一八五
黃水瘡毒	一八七
小兒腮癰	一八九
小兒重癰	一九〇
小兒胎風	一九一
小兒臍瘡	一九一
小兒臍突	一九二
小兒痘癰	一九二
痘裏夾膿	一九三
痘瘋瘡毒	一九四
小兒癩瘡	一九五
小兒梅毒	一九五
小兒風疹	一九五
小兒軟節	一九五
小兒耳瘡	一九六

小兒眉癰……………一九六



民衆醫藥顧問

茹十眉醫士編著
門人鄭素玲恭校

外科

〔疔瘡〕

〔總說〕

疔瘡者。以其瘡形如丁蓋之狀而得名。皆生頭面四肢。發黃疱。中或紫黑。必先癢後痛。先寒後熱。凡人一二日間。惡寒發熱。四肢沉重。心悸眼花。頭疼體痛。稍異如常之症。須宜遍身尋認。如有小瘡。與常患之瘡稍異。卽是疔也。大抵起紫疱者多。起堆核者少。發於手上者多。發於別處者少。生兩足者多。有紅絲至臍。生兩手者。多有紅絲至液。生唇面口內者。多有紅絲入喉。以針刺痛。不痛無血。是其候也。經云。膏粱之變。足生大疔。大抵多由恣食厚味。卒中飲食之毒。或感四時不正之氣。或感蛇毒之毒。或感疫死牛馬豬羊之毒。或人汗入肉而食之。皆生疔瘡。各宜審而治之。若嘔逆直視。譫語如醉者。不可治矣。又有內疔一證。與外疔之證大同。但瘡形不現。過數日間。有一處腫起者。卽是內疔所發之處。但腹痛甚者。便須作內疔治之。不可緩也。緩則殺人。

一 卅種疔毒

病因 夫疔瘡者。乃火證也。迅速之病。有朝發夕死。隨發隨死。三五日不死。一月半月亦必死。此係臟腑之乖逆。性情之激變。節候之寒溫。肅清。且毒中有淺深也。若一時失治。立判存亡。

病狀 麻子疔。狀如麻子而稍黑。四邊微赤。多痒少痛。大疔發於頂門。或發於面。身熱如火。狀如湯火燒灼。瘡頭有黑靨。四邊烟燄。又如赤粟。大忌大炙燒針烙。脾疔生於唇。眉疔生於眉。髭疔生於髭中。龍泉疔生於唇上。虎鬚疔生於唇下。魚尾疔生於眼角外。顴骨疔生於顴骨上。亦名赤面疔。其狀色白。頂陷如錢孔。鼻有紫色者。大凶。耳疔生於耳中。亦名黑疔。連

腮赤腫。鼻疔生於鼻內。痛引腦門。不能運氣。鼻如大瓶黑色者。不治。頰疔生於面頰。骨尖高處。氣疔形如氣泡。感怒而生。腐疔色白如炮。三日內頂陷。狀如初炙瘡。因夏月造豆腐時。人汗滴於內食之而生。忌食豆腐。鬼疔因中陰邪之毒而生。瓜藤疔近蔓無數。石疔皮肉相連。堅硬如石。刺之不入。肉微痛。鹽膚疔火如匙面。四邊皆赤。有黑點如粟粒。水洗疔狀如錢形。或錢孔。瘡頭白裏黑。壓汁出而中硬。極癢透骨。搔則快。浮嘔疔。其狀圓曲。少許不合。長而狹如薤葉。大內黃外黑。黑處刺不痛。黃處刺則痛。三十六疔。其狀頭黑浮起。形如黑豆。四畔起大赤色。今日生一。明日二。後日三。乃至十。若滿三十六。藥所不能治。未滿

者可治俗名黑炮。忌嗔怒畜積愁恨。猪疔形圓而小。瘡口內有油。羊疔形長而白色。牛疔形圓而小。瘡內無油。炮起指不破。有寒熱。狗疔色赤而長。或帶尖。與牛疔同。驢馬疔其狀三角。頂上有黑點。根脚有赤色。或突起。水疔狀如水泡。因飲隔宿水而生。臍疔生於臍。脇疔生於脇。刀疔狀如薤葉。長寸許。肉黑如燒烙。暗疔生兩腋下而無頭。但腋下堅硬。四肢拘急。寒熱大作。陰囊腫痛。罌丸附生突兀如疔。寒熱併作。亦名暗疔。寸疔生手指骨節間。虎口疔生谷穴。魚臍疔狀如魚臍。茱萸疔中凹邊突。蛇眼疔頭黑皮浮。形如小豆。狀似蛇眼。紅絲疔一名血箭疔。一名赤疔。一名紅演疔。生於舌根下。或生頭面。或生手足骨節

間。其證最急。宜迎其經。刺出惡血。則愈。稍遲毒氣攻心。嘔噦迷悶者死。若絲近心腹者。就於絲盡處。刺出惡血。更挑破初起瘡頭。以泄其毒。芝麻疔走注不定。偏身疼痛。不能轉側。爛疔潰出膿水。大如匙面。色稍黑。有白斑。雌疔瘡頭稍黃。向裏壓。亦似灸瘡。四面炮漿。中心凹。色赤。大如錢孔。又有一枚在他處。以水嚙之。則見大忌房事。雄疔其狀頭黑。壓突起。四畔仰。炮漿起。有水出色。黃大如錢孔。忌房事。黃疔有眼在皮。發如齒齦之色。手足麻木。涎出不語者死。黑疔狀如黑炮。櫻桃疔狀如櫻桃。蛇頭疔生手指頭兩旁。狀如蛇頭。甚腥穢。紫黑色。痛引心。有潰爛脫落者。足面疔狀如粟米。痒極入骨。急隔蒜灸之。大抵如豆。如

白如金箔。如茱萸。如石榴子。或發疹搔破而青黃赤色汁出。或衣物觸著而疼痛忽生。或白而腫實。或赤而浮虛。其狀不一。初覺頂不起者。急隔蒜灸之。灸而有炮者吉。無炮者凶。服汗臍得汗則生。無汗則死。刺出紫血者危。出黑血者死。緩者一日瘡頂炮色微白。二日炮色大白。三日色微紫。四日色真紫。皆緩之候也。急者五日色微青。小緊。六日色深青。大緊。七日色黑。其形如魚臍。或如灸瘡之狀。皆急之候也。凡生疔瘡。身熱頭疼。手足溫。和飲食如常。疔之四圍赤腫。名曰護疔。可治。眼白睛凝不轉。渴欲飲水。內熱瘡盛。唇舌青。臥牀不能起。五心腫。頭暈眼花。氣粗。食不進。脈伏。譫語。惡心腹痛。冷汗出。手足冷。滑泄無度。疔

之四圍無赤腫。名曰不護場。不可治。瘡證。急者有應。如生一疔之外。別處肉上再生一小瘡。即是有應。可用鍼挑破。護場瘡四圍有赤腫。生多瘡者。謂之滿天星。飲食如常。頭痛身熱。手足溫。凶者無應。別處肉上無瘡。不護場。疔四圍無赤腫。腹痛甚者。有內疔。若毒入心腹。眼黑如見火光。煩悶嘔逆。恍惚癡眠。瞳人不動。赤脈貫睛。胸脇赤腫。瘡陷不起。發皆死候也。

療法

凡疔瘡必有紅絲路。急用針於紅絲所至之處出血。及刺疔頭四畔出血。若針之不痛。或無血者。以針燒紅。頻烙患處。以痛爲度。若下部所患。多宜隔蒜灸之。痛則灸至不痛。不痛則灸至痛。若灸之而不痛者。宜明灸之。及針

疔四畔。出去惡血。却以稜針深刺破疔頭。瘡口用海馬拔毒散傳之。或雄礬丹敷之。待疔四圍發黃。炮浮腫知痛爲佳。若疔未發。用火針四畔亂刺。如有紅絲脈盡處。亦以火針三向刺斷。隨敷藥。若疔不痛不發者。用艾火於疔瘡上灸之三壯。候瘡邊黃。炮發後。方可貼膏藥。凡疔腫皆刺中心至痛。又刺四畔。令出惡血去血。傳藥。藥氣入針孔佳。若不針透瘡內。不得力也。若起紫泡。初時切不可針破。服藥趕出。炮自破。出血水爲妙。若服藥。炮又不破。方以針挑破。無妨。若起紫炮腫痛者。以萬病解毒丸。外塗內服。若成膿不乾者。以米醋調鐵鏽塗之。自然凸出。膿水卽乾。多有患此不覺而暴死者。用燈照看遍身有小瘡。卽是

疔毒。宜灸瘡處。候甦。更服敗毒藥。並追疔奪命湯。若內疔之證。用化毒丹。置舌上含化出涎。或只用蟾酥一粒。重者二粒。置病人舌上含化。化後良久。用井水漱去毒涎爲妙。若牙關緊急。及喉內患者。並宜含蟾酥丸。或朱墨丸。良久。用井水漱去。更宜服二丸。少停服二丸。又服奪命丹。或雄黃丸。通利一行。得利爲度。又用霹靂火汗之。再用前藥調之。或初生一個。次生二個。逐漸流注者。急將初生者。用鐵筒拔毒膏點破。消蝕惡肉。卽不流注。却以油髮蛇退。土蜂房皂角刺各另燒存性。等分。白芨減半。爲末。揆之以平瘡口。此卽前所謂三十六疔者也。其魚臍疔。瘡頭深黑。破之黃水滲出。四畔浮漿。其毒尤甚。通用前法。及

服萬病解毒丸。以清心行血治法。表實者宜解表。以荊防敗毒散。追疔奪命湯。初發之時。必發熱身疼。此乃毒氣在表。故發表則毒從毛腠而出。裏實者宜攻裏。以連翹攻裏散。表證皆罷。毒氣入裏。口渴便秘。毒在內也。故攻裏則毒從臟腑而出。腫勢盛。脈浮數者。宜散之。蟾酥丸。返魂丹。毒勢盛。脈沉實者。宜下之。奪命丹。萬病解毒丸。無表裏證。服散毒消毒藥後。以復元通氣散。加麝香少許。虛弱入以五香連翹湯。合十宣散。稍虛者。只以人參敗毒散。疔毒拔出。十宣散調理。未潰者不須此藥。初發惡寒發熱。或拘急。或頭疼。或寒熱交作。或肢體重痛。或大便秘結。宜以敗毒散加防風荆芥連翹黃芩青木香金銀花天花粉。

大黃生地黃。若無惡毒。但發熱者。可服却瘡消毒散。七神散。萬全散。若表證皆罷。毒氣入裏者。可用雄黃丸。怯弱之人。不可用峻利藥攻之。宜隔蒜灸五十壯。以人參敗毒散數劑。若生道遠位僻之處。非峻利則藥力不到。若以峻利。則胃氣先傷。虛虛之禍。有所不免。不若灸之爲宜。疔瘡四畔紅赤。漸散開闊。走動不止。此名疔瘡走黃。宜以通聖消毒散。通利兩三行。次去大黃朴硝。調理而愈。或解毒消毒散。亦可用之。有效。此宜作瘡氣治之。無誤。

【海馬拔毒散】

海馬

二個

穿山甲

黃土炒去土

硃砂

水銀

錢各一

麝香

片腦

各少許

雄黃三分

右末。針破瘡口。點藥入內。一日一點。大有效。

【雄礬丹】 雄黃 白礬 各等分

右爲細末。酒調敷患處。

【萬病解毒丸】 麝香二錢 硃砂五錢 山

豆根 雄黃 續隨子 取仁 紫河車 獨

腳連 各一兩 紅牙大戟 一兩 山茨菰二兩

五倍子三兩

右末。秫米糊和勻。杵搗一千餘下。印作錠子。

隨意大小。每服一錠。井水磨化。冬月用薄荷

湯磨服。日可進二三服。

【追疔奪命湯】 羌活 獨活 青皮 多用

防風 多用 黃連 赤芍藥 細辛 甘草

節 蟬蛻 僵蠶 獨腳連 即雞爪黃連各等分 加

河車 澤蘭 金銀花

右咬咀。每服五錢。先將一服。加澤蘭葉金銀

花各一兩。生薑十片。同藥搗爛。好酒鑊之熱服。不喫酒者。水煎爲妙。然後用酒水各一盞。半生薑十片。煎至熱服。汗出爲度。病退減後。再加大黃二錢。煎至熱服。再以利一兩次。去餘毒爲妙。此方以藥味觀之。甚若不切。然效殊神速。萬無一失。如有別證。再出。宜隨證加減治之。若心煩嘔吐。加甘草節一錢。豆粉酸漿水下。嘔逆惡心。加乳香豆粉。甘草湯下有膿。加何首烏白芷。欲利。加青木香大黃牽牛梔子。在脚加木瓜各等分。

【化毒丹】 硃砂 雄黃 各一錢 蟬蛻十枚

硼砂生 輕粉 各五分 麝香一分 片腦半

分

右爲末。取蟾酥爲丸。如棗豆大。每用一丸。放

舌上含化取涎。化後以井水漱淨。無此丹。用單蟾酥代之亦可。

【蟾酥丸】

蟾酥二錢 酒化 銅綠 輕粉 枯礬

寒水石 煨 膽礬 乳香 沒藥 麝香

各一 硃砂三錢 雄黃三錢 疔牛二十個

右藥各爲細疔。稱準。先將蝸牛研爛。同蟾酥和研調黏。方入各藥。共搗極勻。

【硃墨丸】

硃砂 京墨各等分

右末。以蟾酥汁爲丸。如梧桐子大。每服二九。

以葱白煎湯吞下。日服一二次。

【奪命丹】

巴豆去殼 大黃各一錢 鬱金

雄黃 乳香各五分 硃砂 黃丹各三分 輕

粉二分 麝香少許 蟾酥不拘多少

右爲末。麵糊爲丸。如菉豆大。隨虛實服之。茶

清送下。五七丸。至九丸止。以利爲度。如無此丸。以雄黃丸代之。

【雄黃丸】

巴豆十四粒 麝香少許 金蠟

牙皂 雄黃 大黃 鬱金各一錢

右末。米糊丸。如菉紅大。硃砂爲衣。每服五七丸。茶清送下。以利其度。

【霹靂火】

治內疔之證。發汗之妙方也。凡疔

瘡始覺。不曾服出汗之藥。過數日間。外證皆罷。或在胸腹。或在脇肋。赤癰腫起。此乃毒氣入裏。內疔之所發也。宜用此法出汗。毒氣方能出也。法先置水桶一個。鐵銚一個。令病人側臥於桶上。四圍以衣衾蓋護。勿令泄氣。却以鵝卵石火燒極紅。放銚內。以銚安桶內。以醋投於銚內。淬之。重蒸出汗。未透。再加火力。

再淬之。須令腫處汗透。不必遍身出汗也。

【鐵桶膏】

膽礬 銅綠 麝香 三分 白芨

五錢 輕粉 二錢 鬱金 二錢 五倍子 兩

微炒 明礬 四錢

右八味。共爲極細末。用陳米醋一椀。杓內。慢火熬至一小杯。候起金色黃泡爲度。待溫用藥末一錢。攪入醋內。燉溫。用新筆塗於瘡根周圍。以棉紙覆蓋藥上。瘡根自生絢紋。漸收漸緊。其毒不致散大矣。

【荊防敗毒散】

荊芥 防風 羌活 獨活

前胡 柴胡 桔梗 川芎 枳殼 蘇炒

茯苓

錢各一 人參 甘草 各五分

右薑三片。水二鍾。煎八分。食遠服。寒甚。加葱三枝。

【連翹攻裏散】

連翹 白芷 生地黃 赤

芍藥 各一兩

大黃 去皮 黃梔 去頂 薄荷

葉 各七錢

朴硝 二兩 黃芩 去心 甘草 一兩

半兩

右爲麤末。每服一兩。水一碗。燈心竹葉煎七分。喘加人參少許。大病只三四服。愈。如服後心煩作嘔。用百二散止之。

【返魂丹】

硃砂 膽礬 各一兩 血蝸 銅綠

蝸牛 生用 雄黃 枯白礬 各一兩 輕粉

沒藥 蟾酥 各半 麝香 少許

右將蝸牛蟾酥研爛。餘藥爲細末。同研和丸。如雞頭大。每服一丸。令病人先嚼葱白三寸。吐在手心。將葱丸裹在葱白內。用熱酒一盞吞下。如重車行五里許。有汗出。卽瘥。如不能

嚼葱研爛裹下亦效。

【復元通氣散】 青皮 陳皮四兩 括蕒仁

二兩 穿山甲二兩 金銀花一兩 連翹

一兩 甘草二兩半生半炙

右七味研末。每服二錢。黃酒調下。

【五香連翹湯】 沉香 木香 麝香 丁香

各一兩 乳香二兩 連翹 射干 升麻

獨活 桑寄生 甘草炙各一兩 大黃一兩半

木通二兩

右咬咀。每服五錢。水一盞半。煎七分溫服。取利。

【十宣散】 人參 當歸 黃芪各二錢 川芎

防風 厚朴 桔梗 官桂 甘草 白

芷各一錢

右爲細末。每服二錢。加至六錢止。熱酒調下。日數服。以多爲妙。不飲酒者用木香濃煎湯下。然不若酒力之勝。

【人參敗毒散】 人參 獨活 柴胡 桔梗

炒 羌活 枳殼麸炒 茯苓 川芎 前

胡 甘草各一錢

右作一劑。水二鍾。薑三片。煎一鍾時。服後內

托復煎散。

【敗毒散】 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔

梗 川芎 枳殼麸炒 茯苓各一錢 人參

甘草各五分

右薑三片。水二鍾。煎八分。食遠服。寒甚。加葱

三枝。

【規瘡鑽毒散】 百丈光卽天瓢又名土人參 苦花子

金腦香即社茶根 梗 葉俱可用 大小青 紫金藤

生藍葉 水壩根 烏苞根 嫩柏根

青玉叉 山烏玉 雞屎子 晚祥西 狸

咬柴 土木香 臭木待根

右薄荷煎服腫勢甚。加水金鳳水苦齋。手足

拘攣。加鈎藤根梭婆子根。發熱。加吉面消毛

蕨根小便不通。加木通梔子。

【七神散】 苦花子 紫金藤 金腦香 大

小青 仙人薯 土木香 百丈光即土人參

右薄荷煎去滓。上椀調雄黃末服。

【萬全散】 嫩柏根 水蘆根 狸咬柴 烏

苞根 青玉叉 生藍葉 溪楓根 穿山

蜈蚣

右薄荷煎服。及調雄黃末服。或合七神散。更

妙。

【通聖消毒散】 防風 荊芥 連翹 赤芍

藥 當歸 川芎 桔梗 黃芩 梔子

甘草 青木香 元參 牛蒡子 大黃

芒硝 紫金皮 雞屎子 詐死子 谷藤

根 芙蓉根 嫩柏根 青玉叉

右薄荷生地黃煎服。

【解毒消障散】 柴胡 黃芩 黃柏 梔子

木通 赤芍藥 當歸 防風 連翹

大黃 甘草 青木香 紫金皮 雞屎子

詐死子 青玉叉 嫩柏根 苦花子

右薄荷生地黃煎服

〔疔毒通治單方〕 ①將疔刺破。以老葱生蜜杵

貼兩時。疔出。以醋湯洗之。神效。（聖濟總錄

○糞坑底泥蟬蛻。全蠍。等分。搗作餅如錢大。香油煎滾。溫服。以渣敷瘡。四圍疔自出。
(聖濟總錢) ○疔初起如粟米大。或大小不一。如發寒熱。及麻癢嘔吐。卽於遍身留心尋認。凡鬚髮眼耳口鼻下肩兩腋手足甲縫糞門陰戶等處。更宜細看。一日須看數次。如尋得疔瘡所在。急宜刺出惡血。以見好血爲止。惟刀鑷疔忌用刀。用菜子油。眞麻油服。或用白菊花葉連根。用鎚取自然汁一茶鐘。滾酒兌服。酒煮服亦可。不如生汁爲妙。毒重者宜多服。渣敷患處。留頭不敷。蓋被睡臥出汗。其毒自散。無論生在任何處。雖欲氣絕。亦可起死回生。無新鮮者。卽用甘白菊花四兩。少則不效。(醫方摘要) ○四白芨末五分。以

水澄之。去水。攤厚紙上貼之。良效。(袖珍方)
○多年鐵鏽釘。火煨醋淬。刮下鏽末。不論遍次。煨取收之。每用少許。人乳和勻。挑破敷之。仍炒研二錢。以釐水煎滾。待冷調服。(普濟方)
○豨薟草五葉草。(卽五爪龍)
○野紅花。(卽小蘇) 大蒜等分。搗爛入熱酒一盃。絞汁服。得汗立效。(乾坤生意)
○蒼耳草梗中蟲一條。白梅肉三四分。同搗如泥。貼之立效。(經驗方)
○煙管中煙油。厚敷四圍。頭留出。少刻。疔破出水而愈。(外科精義)
○佛掌花根。同生薑蜜研汁服之外。以天筴葉貼之。(本草權度)
○核桃一個。平破取仁。嚼爛安殼內。合在瘡上。頻換甚效。(普濟方)
○胡麻燒灰。針砂