

中草药土方土法

战备专辑

1970.8.1.

毛主席語錄

領導我們事業的核心力量是
中國共產黨。

指導我們思想的理論基礎是
馬克思列寧主義。

提高警惕，保衛祖國。

要準備打仗。

毛主席語錄

中國醫學是一個偉大的寶庫，應當努力發掘，加以提高。

我們一定要有無產階級的雄心壯志，敢于走前人沒有走過的道路，敢于攀登前人沒有攀登過的高峯。

我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概，有在自力更生的基礎上光復舊物的決心，有自立于世界民族之林的能力。

編 者 的 話

遵照伟大领袖毛主席“**提高警惕，保卫祖国**”、“**要准备打仗**”的伟大教导，在全国各条战线大好形势的鼓舞下，根据省革委会指示，在工人、解放军毛泽东思想宣传队领导下，组织了八个中草药调查小分队，深入全省广大农村，大力宣传毛泽东思想，接受贫下中农再教育，进行实地调查，得到了广大工农兵的热情支持，献出了大量行之有效的中草药土方土法。

在全省中草药展览期间，我们进一步学习了来自全省各地一千多名赤脚医生的好思想、好作风、好经验、好方法，并进行了细

致的核实查对工作，其中部分方药曾在有关医疗单位反复试验，疗效肯定。现将战备部分加以整理，合编为《中草药土方土法战备专辑》，供内部学习参考。

由于我们活学活用毛主席著作不够，错误之处在所难免，请同志们批评指正。

中国科学院水生生物研究所，华中师范学院，湖北美术学院，湖北新生印刷厂等单位的工宣队、革委会高举毛泽东思想伟大红旗，突出无产阶级政治，发扬了共产主义大协作精神，大力支援，主动派人参加本书的编绘和高速优质的印刷工作，谨致谢意。

编 者

1970.8.1

毛主席語錄

放手发动群众，
一切經過試驗。

目 录

外伤止血·····	(1)
烧伤 烫伤·····	(29)
打伤 跌伤 压伤·····	(51)
常见骨折小夹板固定·····	(71)
针刺麻醉·····	(109)
接骨·····	(127)
断指再植·····	(135)
拔弹片·····	(145)
预防毒蛇咬伤中毒·····	(153)
毒蛇咬伤·····	(159)
冻伤·····	(171)
常用中草药	

外 伤 止 血

人民群众有无限的创造力。在史无前例的无产阶级文化大革命中，广大工农兵群众响应毛主席“**提高警惕，保卫祖国**”、“**要准备打仗**”的伟大号召，怀着对帝修反的刻骨仇恨，在战备工作中锤炼无限忠于毛主席的红心，从实战出发，从难从严要求，发扬“**一不怕苦，二不怕死**”的彻底革命精神，经过反复实验，发掘和总结出了很多止血的中草药，为战备作出了重大贡献。

外伤出血，包括毛细血管、静脉和动脉出血三种。毛细血管出血，为少量的血液渗出。静脉出血，为缓缓流出的暗红色血液。动脉出血，为喷出鲜红色血液，出血量较多。

以上三种不同的外伤出血，可根据当时

当地的具体情况立即选用下方：

方 药 1. 木兰叉根皮〔图²⁰₁₀₄〕(麻油炙)一两
白头翁〔图 189〕一两
野菊花〔图 166〕二两
马鞭草〔图 24〕一两
退血草〔图 109〕二两
生蒲黄〔图 48〕五钱
刘寄奴〔图 41〕二两
过江龙〔图¹⁷⁴₁₇₇〕一两
苧麻叶〔图 123〕一两
马 勃〔图 23〕五钱

(此方名“十味止血粉”)

用 法 将上药晒干或烤干，共研极细末，敷伤口。

本省阳新县白沙公社卫生所用此方治疗外伤出血三例，效果显著。

动物试验：70年6月11日中午一时，将狗的股静脉，作平行切口约0.3公分长，血流不止。当时用此粉撒在敷料上轻压伤口，约一分钟止血。二次试验同。后经武汉医学院第一附属医院作狗股动脉止血试验，一分钟止血。

方 药 2. 天麻白芨〔图 91〕

用 法 洗净，焙干或晒干，研极细末，敷伤口。

本省咸宁地区革命委员会紧跟伟大领袖毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略部署。在某军医院解放军同志的带动下，组织一个“咸宁地区毛泽东思想卫生工作队”，顶风冒雪，爬山涉水，深入基层，广泛宣传毛泽东

思想，充分发动群众，发掘了很多对战备止血有效的中草药。解放军某同志为了使战士少流血，不顾个人安危，将自己的大隐静脉切开，用天麻白芨粉作止血试验，获得了二十秒钟止血的良好效果，为战备作出了贡献。

动物试验：将狗大隐静脉切开作止血试验，二十五秒钟止血；狗股动脉切开作止血试验，两分钟内止血。后经武汉医学院第一附属医院作狗股动脉切开试验，两分钟内止血。

方 药 3. 生半夏〔图 57〕100克（打碎）

明 胶10克

制 法 用水 400 毫升，将生半夏浸泡八小时，滤出浸液。再加水 300 毫

升，浸泡十二小时，过滤去渣。
将两次浸液混合，浓煎过滤。将过滤的药液用小火煎至50毫升左右，再加明胶10克拌匀，用小火烘干，研极细末，备用。

用 法 敷伤口。

方 药 4. 白芨末〔图 70〕10克 明 胶 4 克
五倍子〔图 151〕1克 甲 醛10滴

制 法 将白芨末、五倍子末加水80毫升煮沸，再加入明胶煮化搅匀，离火候冷，加入甲醛10滴。此时可见熬液成块，用小火烘干，研极细末，备用。

用 法 敷伤口。

上二方来自本省恩施地区医院。前方称恩施止血粉(1号)，后方称恩施止血粉(2号)，用

于外伤止血，效果良好。前方该医院作动物试验，将狗肝叶切除，三分钟止血；脾部分切除，五分钟止血。两方均经武汉医学院第一附属医院作狗股动脉止血试验，均在两分钟内止血。

方药 5. 广丹五钱 明矾五钱 冰片三分
(此方名红伤散)

用法 上三味，共研极细末，敷伤口。

本省保康县用此方治外伤出血近百例，用药后均在一至二分钟内止血。经武汉医学院第一附属医院作动物试验，切开狗股动脉，两分钟止血。

方药 6. 旱莲草〔图 109〕(全草)

用法 洗净，晒干，研极细末敷伤口。

也可用鲜草洗净，捣烂敷伤口。

（此方名止血粉）

本省嘉鱼县用此方治外伤出血一百例，止血率100%。经武汉医学院第一附属医院作动物试验，切开狗股动脉，两分钟内止血。

病 例 朱××，男，22岁，因砍柴不慎，把左手拇指砍去半边，经西药治疗仍流血不止。后改用上药末敷上包扎，立即止血，一次痊愈。

方 药 7. 半截烂（血里见）〔图 59〕二钱
见血飞皮〔图 149〕二钱
仙鹤草〔图 76〕二钱
白三七〔图 $\frac{10}{95}$ 〕三钱
蒲 黄〔图 48〕二钱
金毛狗脊二钱

陈石灰二钱

生龙骨二钱

血藤皮三钱

用法 将上药烘干，共研极细末，敷伤口。

本省利川县用此方治外伤出血，效果良好。经武汉医学院第一附属医院作动物试验，切开狗股动脉，两分钟止血。

方药 8. 血余炭

用法 将头发烧存性，研极细末，敷伤口。

本省襄樊市中医院用此方治多种外伤出血，均在一至二分钟内止血。经武汉医学院第一附属医院作动物试验，切开狗股动脉，两分钟止血。

方药 9. 土子（又名无名异）

用法 将上药研极细末，敷伤口。

本省襄樊市中医院用此方治外伤出血，效果良好。并经该院及武汉医学院第一附属医院先后作动物试验，切开狗股动脉，均在两分钟止血。

方药 10. 马勃〔图 23〕

用法 将上药研极细末，敷伤口。

本省襄樊市中医院用此方治外伤出血，效果良好。并经该院及武汉医学院第一附属医院先后作动物试验，切开狗股动脉，两分钟止血。

方药 11. 老虎台衣〔图 183〕

用法 晒干，研极细末，敷伤口。

本省秭归县用此方治外伤出血，效果良好。动物试验，将家兔腹主动脉切开，十一秒钟止血；将肝叶部分切除，二十二至二十六秒钟止血（轻度加压）。经武汉医学院第一附属医院作动物试验，切开狗股动脉，两分钟内止血。

方 药12. 来血皮(三百棒皮)〔图 26〕一两
刺加皮〔图 134〕五钱
麦子七〔图 31〕三钱
热天加北风还阳三钱
青丝还阳〔图 55〕三钱
冷天加冷水七〔图 102〕五钱
硃砂莲〔图 11〕五钱
(此方名四季止血粉)