

徐 峰 万广霞 王成茹 张春艳 主编

全国护士执业资格考试 指导**同步练习**题集

临床护理学 (下册)

QUANGUO HUSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI
ZHIDAO TONGBU LIANXI TIJI
LINCHUANG HULIXUE

中国医药科技出版社

全国护士执业资格考试指导同步练习题集

临床护理学 (下册)

徐 峰 万广霞 王成茹 张春艳 主编

中国医药科技出版社

内 容 简 介

《全国护士执业资格考试指导同步练习题集》是以全国护士执业资格考试的新大纲为指导,以《全国护士执业资格考试指导》为基础,结合编者多年来考试辅导的成功经验组织编写而成。本丛书分为《基础护理学》、《临床护理学(上册)》和《临床护理学(下册)》。本书为《临床护理学(下册)》,遵循科学、严谨、客观、规范的题目要求,涵盖考试大纲知识点,对应考虑大纲,临床情景,着重考察考生的护理专业知识和临床操作能力。题型全面,题量丰富,帮助考生随学随测,强化记忆,提升应试能力,及时有效地反馈复习成果。

图书在版编目(CIP)数据

临床护理学.下册/徐峰等主编. —北京:中国医药科技出版社,2012.11

(全国护士执业资格考试指导同步练习集)

ISBN 978-7-5067-5713-3

I. ①临… II. ①徐… III. ①护理学-护士-资格考试-习题集 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 255887 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092mm¹/₁₆

印张 15¹/₂

字数 457 千字

版次 2012 年 11 月第 1 版

印次 2012 年 11 月第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-5713-3

定价 39.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 审	孙晓丹	霍范伟	刘 峰	时春婷
	原立昌			
主 编	徐 峰	万广霞	王成茹	张春艳
副主编	邢冬冬	王 戈	齐秀英	李秀芹
	赵丽娟	李 馥	邸晓珩	那雪娇
参 编	田洪霞	张丽新	王 洋	孙 燕
	李 悦	李红玉	孙海燕	付丽志
	王红琴	王 晶	李 健	马立海
	李继红	山青林	吴艳玲	黄丽波
	李玥琦			

前 言

本丛书是全国护士执业资格考试指导同步练习题集，分为《基础护理学》、《临床护理学（上册）》和《临床护理学（下册）》，以全国护士执业资格考试的最新大纲为指导，以《全国护士执业资格考试指导》为基础，结合编者多年来考试辅导的成功经验组织编写。本丛书比照《全国护士执业资格考试指导》的内容排序，遵循科学、严谨、客观、规范的题目要求，涵盖考试大纲知识点，对应考点大纲，临床情景，着重考察考生的护理专业知识和临床操作能力。题型全面，题量丰富，帮助考生随学随测，强化记忆，提升应试能力，及时有效地反馈复习成果。避免了一般教材章节学后与实际考试题型脱节的情况。为考生顺利通过护士执业资格考试助一臂之力。

受编者水平所限，本书难免在内容上有所疏漏，在文字上有欠妥之处，恳请广大读者不吝赐教和指正，以促进本书日臻完善。

编者
2012 年 9 月

目 录

第九章 精神障碍护理学	(1)
第一节 精神障碍症状学	(1)
第二节 精神分裂症病人的护理	(7)
第三节 抑郁症病人的护理	(11)
第四节 焦虑症病人的护理	(15)
第五节 强迫症病人的护理	(18)
第六节 癔症病人的护理	(19)
第七节 睡眠障碍病人的护理	(22)
第八节 阿尔茨海默病病人的护理	(23)
第十章 损伤、中毒病人的护理	(28)
第一节 创伤病人的护理	(28)
第二节 烧伤病人的护理	(31)
第三节 毒蛇咬伤病人的护理	(35)
第四节 腹部损伤病人的护理	(36)
第五节 一氧化碳中毒病人的护理	(42)
第六节 有机磷中毒病人的护理	(44)
第七节 镇静催眠药中毒病人的护理	(46)
第八节 酒精中毒病人的护理	(47)
第九节 中暑病人的护理	(48)
第十节 淹溺病人的护理	(50)
第十一节 细菌食物中毒病人的护理	(51)
第十二节 小儿气管异物的护理	(52)
第十三节 破伤风病人的护理	(52)
第十四节 肋骨骨折病人的护理	(57)
第十五节 常见四肢骨折病人的护理	(58)
第十六节 骨盆骨折病人的护理	(64)
第十七节 颅骨骨折病人的护理	(65)
第十一章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理	(69)
第一节 颈肩痛和腰腿痛病人的护理	(69)
第二节 骨和关节化脓性感染病人的护理	(71)
第三节 脊柱及脊髓损伤病人的护理	(73)
第四节 关节脱位病人的护理	(75)
第五节 风湿热病人的护理	(77)
第六节 类风湿性关节炎病人的护理	(79)
第七节 系统性红斑狼疮病人的护理	(82)
第八节 骨质疏松症病人的护理	(85)

第十二章 肿瘤病人的护理	(87)	第十二节 葡萄胎及侵蚀性葡萄胎病人的护理	(107)
第一节 食管癌病人的护理	(87)	第十三节 白血病病人的护理	(110)
第二节 胃癌病人的护理	(89)	第十四节 骨肉瘤病人的护理	(112)
第三节 原发性肝癌病人的护理	(92)	第十五节 颅内肿瘤病人的护理	(114)
第四节 胰腺癌病人的护理	(94)	第十六节 乳腺癌病人的护理	(114)
第五节 大肠癌病人的护理	(95)	第十七节 子宫内腺癌病人的护理	(117)
第六节 肾癌病人的护理	(99)	第十八节 原发性支气管肺癌病人的护理	(118)
第七节 膀胱癌病人的护理	(100)		
第八节 宫颈癌病人的护理	(101)		
第九节 子宫肌瘤病人的护理	(103)		
第十节 卵巢癌病人的护理	(105)		
第十一节 绒毛膜癌病人的护理	(106)		
第十三章 血液、造血器官及免疫疾病病人的护理	(122)		
第一节 血液及造血系统的解剖生理	(122)	第五节 血友病病人的护理	(129)
第二节 缺铁性贫血病人的护理	(123)	第六节 特发性血小板减少性紫癜病人的护理	(129)
第三节 营养性巨幼细胞贫血病人的护理	(126)	第七节 弥散性血管内凝血病人的护理	(131)
第四节 再生障碍性贫血病人的护理			
第十四章 内分泌代谢疾病病人护理	(134)		
第一节 内分泌系统的解剖生理	(134)	第六节 糖尿病病人的护理	(141)
第二节 单纯性甲状腺肿病人的护理	(135)	第七节 痛风病人护理	(147)
第三节 甲状腺功能亢进症病人的护理	(135)	第八节 营养不良病人的护理	(148)
第四节 甲状腺功能减退症病人的护理	(139)	第九节 小儿维生素 D 缺乏性佝偻病的护理	(150)
第五节 库欣综合征病人的护理		第十节 小儿维生素 D 缺乏性手足搐搦症的护理	(152)
第十五章 神经系统疾病病人的护理	(155)		
第一节 神经系统解剖生理	(155)	第二节 颅脑损伤病人的护理	(157)
第二节 颅内压增高与脑疝病人的		第三节 头皮损伤病人的护理	(159)

第四节	脑损伤病人的护理	(161)	第九节	癫痫病人的护理	(175)
第五节	脑血管疾病病人的护理	(164)	第十节	化脓性脑膜炎病人的护理	(178)
第六节	三叉神经痛病人的护理	(170)	第十一节	病毒性脑膜炎病人的护理	(180)
第七节	急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病病人的护理	(172)	第十二节	小儿惊厥的护理	(181)
第八节	帕金森病病人的护理	(174)			
第十六章	生命发展保健	(184)			
第一节	计划生育	(184)	第五节	青春期保健	(196)
第二节	孕期保健	(186)	第六节	妇女保健	(197)
第三节	生长发育	(188)	第七节	老年保健	(197)
第四节	小儿保健	(191)			
第十七章	中医基础知识	(201)			
第一节	中医学的基本概念	(201)	第五节	中医治病八法	(206)
第二节	中医基础理论	(201)	第六节	养生与治则	(207)
第三节	中医的四诊	(204)	第七节	中药	(207)
第四节	中医辨证方法	(205)			
第十八章	法规与护理管理	(209)			
第一节	与护士执业注册相关的法律法规	(209)	第四节	临床护理工作组织结构	(220)
第二节	与护士临床工作相关的法律法规	(212)	第五节	医院常用的护理质量标准	(221)
第三节	医院护理管理的组织原则	(219)	第六节	医院护理质量缺陷及管理	(224)
第十九章	护理伦理	(227)			
第二十章	人际沟通	(236)			
第一节	概述	(236)	第四节	护理工作中的非语言沟通	(239)
第二节	护理工作中的人际关系	(236)	第五节	护理工作中的礼仪要求	(239)
第三节	护理工作中的语言沟通	(238)			

12. 最常见的幻觉是
A. 幻听 B. 幻视
C. 幻嗅 D. 幻味
E. 幻触
13. 对病人行为影响最严重的症状是
A. 评论性幻听 B. 命令性幻听
C. 议论性幻听 D. 被害妄想
E. 疑病妄想
14. 病人将墙上的灯的影子看成是一个怪兽, 此症状是
A. 错觉 B. 幻觉
C. 虚构 D. 强迫性怀疑
E. 妄想
15. 言语性幻听最常见于
A. 精神分裂症 B. 抑郁症
C. 躁狂症 D. 神经症
E. 偏执性精神病
16. 思维内容障碍中最常见, 最重要的症状是
A. 幻觉 B. 错觉
C. 妄想 D. 思维奔逸
E. 象征性思维
17. 夸大观念和夸大妄想多见于
A. 脑器质性精神障碍
B. 躯体疾病所致精神障碍
C. 偏执性人格障碍
D. 躁狂症
E. 精神分裂症偏执型
18. 妄想的定义是
A. 思维联想障碍
B. 联想形式障碍
C. 大量涌现的不自主观念
D. 不能被说服的病态信念
E. 无法摆脱的重复出现的观念
19. 思维连想过程障碍不包括
A. 思维奔逸 B. 思维破裂
C. 象征性思维 D. 思维贫乏
E. 思维迟缓
20. 病人认为环境中与他无关的事物都与他有关系
A. 钟情妄想 B. 关系妄想
C. 疑病妄想 D. 嫉妒妄想
E. 被害妄想
21. 关于自知力描述错误的是
A. 是指病人对其本身精神状态的认识能力
B. 是指病人能否察觉或识别自己有病和精神状态是否正常、能否正确分析和判断的能力
C. 是判断疗效和精神疾病严重程度的指标
D. 是判断病人是否存在意识障碍的指标之一
E. 自知力缺乏的病人会拒绝治疗
22. 关于谵妄, 正确的叙述是
A. 不会发生冲动或自伤行为
B. 错觉和幻觉多为非恐怖性
C. 一般没有定向障碍
D. 不会产生被害妄想
E. 病人突然变得安静时病情可能加剧
23. 思维迟缓是
A. 癔症的典型症状
B. 强迫症的典型症状
C. 抑郁症的典型症状
D. 恐怖症的典型症状
E. 精神分裂症的典型症状
24. 思维障碍是
A. 癔症的典型症状
B. 强迫症的典型症状
C. 抑郁症的典型症状
D. 恐怖症的典型症状
E. 精神分裂症的特征性症状
25. 属于情感生活减退的症状是
A. 焦虑 B. 情感淡漠
C. 情感倒错 D. 情感低落
E. 情感脆弱
26. “蜡样屈曲”这一症状最常见于
A. 抑郁症 B. 精神分裂症
C. 癔症 D. 脑器质性精神障碍
E. 强迫症
27. “空气枕头”属于
A. 模仿动作 B. 蜡样屈曲
C. 违拗 D. 作态
E. 意志增强
28. 精神病特有的表现是
A. 幻觉 B. 生活自理能力缺乏
C. 病程长 D. 自知力缺乏
E. 妄想

29. 肢体感觉障碍的病人不宜

- A. 使用热水袋
- B. 睡于软床上
- C. 经常翻身
- D. 用乙醇按摩
- E. 用温水擦浴

30. 关于妄想, 说法正确的是

- A. 在意识障碍时出现的杂乱思维
- B. 在智力缺损时出现的离奇想法
- C. 在意识清晰情况下的病理性歪曲信念
- D. 是可被说服的不现实的想法
- E. 在意识中占主导地位的错误观念

31. 关于思维迟缓描述错误的是

- A. 与情感低落、一直减退伴随出现, 常见于抑郁症
- B. 思维迟缓是一种抑制性思维联想障碍
- C. 以思维活动显著缓慢, 联想困难, 思考问题吃力, 反应迟钝为特点
- D. 言语简单, 语速慢, 语音低沉
- E. 病人思维内容空虚, 概念和词汇贫乏

32. 思维形式障碍不包括

- A. 思维散漫
- B. 病理性陈述
- C. 持续语言
- D. 思维中断
- E. 思维化声

A2 型题

33. 病人, 女性, 34 岁, 某日声称自己是王老太太(病人母亲), 并说: “你说我是谁, 我 73 了, 头发也白了”。2 天后病人又称自己是刘某, 否认是王老太太。该病人的症状最可能是

- A. 人格解体
- B. 人格转换
- C. 双重人格
- D. 多重人格
- E. 交替人

34. 某病人近 2 年来总感觉肚子里有虫爬, 很不舒服, 但说不出具体部位, 此症状为

- A. 内感性不适
- B. 错觉
- C. 幻触
- D. 感知综合障碍
- E. 综合障碍

35. 病人男 34 岁, 主诉总能听到同事在屋里议论自己, 可走进屋里却没有人, 此病人的精神症状属于

- A. 感觉过敏
- B. 错觉
- C. 物理影响性妄想
- D. 幻听
- E. 夸大妄想

36. 病人, 女性, 25 岁因大叶性肺炎接受输液治

疗, 在输液时将输液管看成是蛇, 此症状为

- A. 幻觉
- B. 错觉
- C. 虚构
- D. 错构
- E. 感知综合障碍

37. 病人, 女性, 18 岁, 某日照镜子感觉自己眼睛一大一小, 大的如鸡蛋, 小的如绿豆, 此症状属于

- A. 错觉
- B. 视幻觉
- C. 运动性幻觉
- D. 心因性幻觉
- E. 感知综合障碍

38. 病人听到脑子里有声音骂自己, 称为

- A. 思维鸣响
- B. 内心被揭露感
- C. 假性幻听
- D. 机能性幻听
- E. 真性幻听

39. 病人, 男性, 40 岁, 患精神分裂症, 经常趴在自家阳台, 俯耳侧听, 自言自语, 此症状属于

- A. 幻听
- B. 幻视
- C. 注意力增强
- D. 被害妄想
- E. 意志活动减退

40. 某运动员, 近来易激惹, 情绪不稳, 曾两次殴打对手被罚。且他常闻到一股臭鸡蛋味, 感觉“在梦里一样”, 而且常破口大骂, 此现象称为

- A. 错觉
- B. 想像
- C. 错构
- D. 嗅幻觉
- E. 幻视

41. 病人男 20 岁, 近两月来总感觉到身体上有蚂蚁在爬, 有时感觉有人针刺他的全身, 此症状属于

- A. 幻触
- B. 错觉
- C. 感觉过敏
- D. 感觉倒错
- E. 内脏幻觉

42. 病人男, 有精神疾病, 看到地上的一条绳索, 惊恐地叫到“蛇、蛇、有蛇”此症状属于

- A. 错觉
- B. 幻觉
- C. 幻视
- D. 妄想
- E. 感觉障碍

43. 病人男, 20 岁, 近一月来常感到胃肠内有虫在爬行, 非常难受, 该症状属于

- A. 妄想
- B. 错觉
- C. 内感不适
- D. 内脏幻觉

- E. 感觉倒错
44. 病人女性, 35 岁, 每日在床头倚窗, 静坐侧耳, 有时面露微笑, 有时双手捂耳, 面露惊色, 或以被蒙头, 此症状属于
- A. 幻听 B. 幻视
C. 狂躁 D. 被害妄想
E. 错觉
45. 病人女性, 80 岁, 无明显诱因出现精神失常, 表现能凭空听到已故的亲人呼唤他, 叫他也随他们去, 称自己走到哪里那些已故的亲人都跟着他, 此症状为
- A. 歪曲的感觉 B. 歪曲的知觉
C. 虚幻的感觉 D. 虚幻的知觉
E. 精神分裂症
46. 病人男性, 某日突然发觉自己的手变大了, 汗毛像野兽一样浓密, 镜子里自己的脸比黑熊还难看, 仔细一看, 这些情况都恢复到原来的状态, 此症状属于
- A. 错觉 B. 视幻觉
C. 心因性幻觉 D. 感知综合障碍
E. 精神分裂症
47. 一精神分裂症病人对护士说: “我脑子里经常会出现一个人, 样子看着像一个白胡子老头, 还挺吓人的, 我不想看见他, 但总是挥之不去”。这是一种
- A. 幻想 B. 错觉
C. 视物变形症 D. 幻视
E. 妄想
48. 病人女性 32 岁, 受“琴声”困扰 1 年, 每当听到鼓掌声, 耳边就响起同一曲琴声, 掌声停止, 琴声亦止, 该症状最可能是
- A. 错觉 B. 功能性幻听
C. 思维被洞悉 D. 强迫性怀疑
E. 联想障碍
49. 病人女性, 27 岁, 1 年多来为“唱歌的敲门声”困扰, 一听到有人敲门的声响, 就同时听到有人在唱歌, 而敲门声停, 同时歌声也停了, 该病人最可能的症状是
- A. 错觉 B. 功能性幻听
C. 被害妄想 D. 内脏性幻觉
E. 联想障碍
50. 病人男 25 岁, 自述脑子空空的, 整天什么事也不想, 常沉默少语, 交谈时词汇量特别少, 如问“在这陪你的是谁啊”, 答“妈”, 问“你今年多大、属什么的”, 答“不知道”, 该症状是
- A. 思维迟缓 B. 思维贫乏
C. 思维中断 D. 思维松弛
E. 思维散漫
51. 与一病人交谈, 其对问题的叙述不够中肯, 内容散漫, 缺乏一定的逻辑关系, 以致使人感到交谈困难, 对其言语的主题及用意也不易理解, 此症状为
- A. 思维迟缓 B. 思维松弛
C. 思维贫乏 D. 思维中断
E. 象征性思维
52. 病人诉自己的血液凝固了, 身体干枯了, 变成僵尸了。该症状属于
- A. 思维联想障碍 B. 思维逻辑障碍
C. 内脏幻觉 D. 妄想
E. 人格解体
53. 病人女性, 28 岁, 经常谈论自己的美貌, 坚信自己是世界上最美的女性, 无人能比, 该病人的症状最可能是
- A. 影响性妄想 B. 判断性妄想
C. 钟情妄想 D. 形象性妄想
E. 嫉妒妄想
54. 病人, 男性, 25 岁, 1 年来坚持不用自来水的水龙头, 认为会磨损里面的胶皮垫, 所以日常生活中不洗衣服脸、不洗手、所以个人卫生很差。该病人的症状最可能是
- A. 强迫性思维 B. 原发性妄想
C. 继发性妄想 D. 思维连贯性障碍
E. 思维逻辑障碍
55. 一精神分裂症病人说: “你上课, 水流哗哗的响, 人民都兴高采烈, 我的眼镜不好看……”。这种症状属于
- A. 思维不连贯 B. 思维破裂
C. 语词新作 D. 思维松散
E. 逻辑倒错性思维
56. 一病人认为其内心所想的事情, 未经语言文字表达就被别人知道了, 这是
- A. 思维被夺 B. 思维鸣响
C. 思维被广播 D. 思维被控制体验
E. 内心被揭露感
57. 某精神分裂症病人坚信电视播出的“评论美

- 伊战争”是含沙射影地批评他，这种症状是
- 被洞悉感
 - 关系妄想
 - 罪恶妄想
 - 被害妄想
 - 物理影响妄想
58. 一位女性精神分裂症病人，睡觉时拆掉病房暖气片的木架，抱着暖气片睡觉，并且以红毛线将自己与暖气片系起来。病情好转后，病人的解释是：“红色代表共产党，暖气是指工人阶级。拆掉木架子，是指知识分子不应该摆架子。抱暖气片睡觉指工人阶级和知识分子团结起来。”这种症状是
- 逻辑倒错性思维
 - 特殊意义妄想
 - 语词新作
 - 思维散漫
 - 象征性思维
59. 病人男性，59岁，口中常常喃喃自语“我该死，我该死”，每晚席地而卧，上盖一破单被。此病人的症状属于
- 被害妄想
 - 嫉妒妄想
 - 罪恶妄想
 - 夸大妄想
 - 物理影响妄想
60. 病人为了得到“硬骨头精神”，将整块排骨吞食，此为
- 真性幻想
 - 语词新作
 - 夸大妄想
 - 病理性象征性思维
 - 物理影响妄想
61. 病人女性，26岁，述脑子反应快，特别灵活，好像机器加了“润滑油”，思维敏捷，概念一个接一个地不断涌现出来，说话的主题极易随环境而改变（随境转移）。可能患有
- 躁狂症
 - 疑病症
 - 神经衰弱
 - 精神分裂症
 - 抑郁症
62. 某病人对大夫说自己“脑子变聪明了”“脑子想问题像抹了油一样”，此症状很可能是
- 夸大妄想
 - 思维奔逸
 - 思维破裂
 - 超价观念
 - 情感高涨
63. 一病人想上街购物，但未向别人讲，即听到外界——“上街去购物”的言语声，这是
- 思维被夺
 - 思维鸣响
 - 思维被广播
 - 思维被控制体验
 - 思维被洞悉感
64. 病人把衣服泡在大水缸中，并解释说我要洗刷自己的耻辱，这一症状是
- 被害妄想
 - 离奇行为
 - 强迫洗涤
 - 病理性象征性思维
 - 关系妄想
65. 病人女性，45岁，近来总认为自己全身不舒服，患了不治之症，全国四处求医，惶惶不可终日，此症状属于
- 夸大妄想
 - 疑病妄想
 - 被害妄想
 - 嫉妒妄想
 - 焦虑症
66. 病人女性，36岁，夫妻关系和睦，近来怀疑自己丈夫与人有不轨行为，反复检查丈夫的手机，衣服口袋，并派人对丈夫进行跟踪，此病人症状属于
- 关系妄想
 - 夸大妄想
 - 嫉妒妄想
 - 被害妄想
 - 物理影响妄想
67. 病人女性，34岁，未婚，每晚都关注某电视台一著名男性主持人，并告诉家人，此男主持人每晚主持节目时都对地含情脉脉，其错误想法虽经很多人纠正，仍深信不疑，此病人的症状属于
- 关系妄想
 - 夸大妄想
 - 嫉妒妄想
 - 被害妄想
 - 钟情妄想
68. 病人女30岁，表现为口若悬河、滔滔不绝，一个话题未完又转入另一个话题，此病人的精神症状属于
- 感觉过敏
 - 思维奔逸
 - 妄想
 - 思维散漫
 - 语词新作
69. 一个病人想去买东西，走在街上，突然发现人很拥挤，认为这预示着自己要大难临头，确切的说这种症状是
- 关系妄想
 - 被害妄想
 - 象征性思维
 - 原发性妄想
 - 特殊意义妄想
70. 病人男性，36岁，一日起床后，悄悄外出关门，即从窗缝中窥视尚在睡中妻子，良久不动，别人问其所为，其回答正在监视老婆是否与人有不轨行为，此病人的症状属于
- 嫉妒妄想
 - 关系妄想

- C. 夸大妄想 D. 被害妄想
E. 钟情妄想
71. 病人男性, 40岁, 发病后认为同事倒土豆是要他滚蛋, 别人谈摇头电风扇是说他立场不稳, 此病人的症状属于
A. 关系妄想 B. 影响妄想
C. 强迫妄想 D. 言语性幻听
E. 被害妄想
72. 病人女 46岁, 表现为非常欢快, 讲话时兴高采烈, 自觉无比舒畅和幸福, 对他人的有很大感染力, 此病人的精神症状属于
A. 情感高涨 B. 欣快
C. 情感暴发 D. 感觉过敏
E. 思维散漫
73. 病人内心体验缺乏, 对切身有关的各种事情表现无动于衷, 面部表情呆滞, 这种症状称为
A. 思维中断 B. 情绪低落
C. 情感淡漠 D. 意志减退
E. 情感高涨
74. 病人女性, 22岁, 近5个月来对家人亲友冷淡, 对工作没有兴趣, 对个人生活也不关心, 对家里和周围的事情表现无所谓, 这些表现是
A. 情绪不稳 B. 情感淡漠
C. 情感倒错 D. 情绪低落
E. 情感高涨
75. 某女与同事吵架之后, 突然倒地, 全身挺直, 双手乱动, 几分钟后, 号啕大哭, 捶胸顿足, 10分钟后安静下来。其症状属
A. 情感暴发 B. 精神病态
C. 情感倒错 D. 情感不协调
E. 情感高涨
76. 青年病人, 近1年来对家人亲友冷淡, 对个人生活不关心, 对家里和周围发生的任何事情都表现出无所谓, 这些表现属于
A. 情绪不稳 B. 情感淡漠
C. 情感低落 D. 情感倒错
E. 情感破裂
77. 病人常因小事大发脾气、激动、吵闹、喊叫、扯头发, 以上表现属于下述哪个症状
A. 情绪不稳 B. 易激惹
C. 情感暴发 D. 情感脆弱
- E. 情感高涨
78. 一位散发性脑炎病人在病房内呵呵地笑着, 护士问其笑什么, 避而不答, 给人感觉呆滞、愚蠢, 请问这种症状是
A. 情感爆发 B. 矛盾情感
C. 欣快 D. 情感高涨
E. 情感淡漠
79. 某女和同事吵架之后, 突然倒地, 全身挺直, 双手乱动, 几分钟后, 嚎啕大哭, 捶胸顿足, 10分钟后安静下来。其症状包括
A. 假性痴呆 B. 情感爆发
C. 精神病态 D. 情感倒错
E. 情感不协调
80. 病人女性, 22岁, 近5个月来对家人亲友冷淡, 对工作没有兴趣, 对个人生活也不关心, 对家里和周围的事情表现无所谓。这些表现是
A. 情绪不稳 B. 情绪低落
C. 情感淡漠 D. 情感脆弱
E. 情感倒错
81. 病人女性, 42岁, 近一周突然兴奋, 躁动不安, 伤人毁物, 在药物治疗时易引起病人摔伤的因素是
A. 坠床 B. 不合作
C. 躁动不安 D. 药物不良反应
E. 有无躯体感染
82. 病人女性, 60岁, 近一周来夜间出现行为紊乱, 伴幻听、幻视, 表情紧张, 恐惧, 白天卧床, 自发言语较少, 对夜间行为难以回忆, 生活自理差, 头颅CT示: 顶枕叶片状梗死灶, 考虑目前病人处于
A. 谵妄状态 B. 痴呆状态
C. 抑郁状态 D. 木僵状态
E. 昏迷状态

A3/A4 型题

(83~85 题共用题干)

病人, 男性, 23岁, 性格内向, 近两周来表现健谈, 说话滔滔不绝, 自觉脑子快, 好像机器加了“润滑油”, 无法安静下来正常学习, 由同学和老师送入医院治疗。

83. 该病人表现的症状是

- A. 思维迟钝 B. 思维奔逸
C. 思维贫乏 D. 思维散漫

E. 思维破裂

84. 上述症状属于

- A. 思维形式障碍 B. 思维逻辑障碍
C. 异己体验 D. 语言障碍
E. 思维内容障碍

85. 该症状多见于

- A. 癫痫 B. 精神分裂症
C. 抑郁状态 D. 躁狂症
E. 焦虑症

(86~87 题共用题干)

病人女性, 23 岁, 因有一男青年开玩笑时对她说了句 “I love you”, 而男青年坚信只是开玩笑, 病人却仍然坚信男青年爱上她。

86. 该病人的症状是

- A. 嫉妒妄想 B. 钟情妄想
C. 夸大妄想 D. 关系妄想
E. 强迫观念

87. 此症状是

- A. 知觉障碍 B. 感觉障碍
C. 思维内容障碍 D. 思维逻辑障碍
E. 思维形式障碍

(88~89 题共用题干)

病人男性, 19 岁, 突然动作显著缓慢, 整天卧床, 不起来吃饭, 也不上厕所, 叫他推他均无反应, 表情呆板, 问

88. 该病人的症状是

- A. 违拗症 B. 缄默状态
C. 木僵状态 D. 意志减退
E. 意志增强

89. 护理该病人时最应注意的是

- A. 保证病人安全 B. 保证足够的入量
C. 做好基础护理 D. 关心体贴病人
E. 做好专科护理

(90~92 题共用题干)

病人女性, 35 岁, 3 天来不吃, 只喝水, 说有人一直告诉她饭里有毒, 要求家人陪同去派出所报案。

90. 该病人的症状是

- A. 感觉障碍 B. 知觉障碍
C. 思维奔逸 D. 被控制感
E. 被动体验

91. 从题干信息还能得知病人可能存在

- A. 情感淡漠 B. 思维贫乏
C. 无故发笑 D. 自知力缺乏
E. 感觉障碍

92. 病人入院后护士最基础的评估是

- A. 有无冲动行为
B. 基本生理需要是否满足
C. 精神症状严重程度
D. 有无躯体感染
E. 有自杀的危险

第二节 精神分裂症病人的护理

A1 型题

1. 不属于精神分裂症阳性症状的是

- A. 幻听 B. 被害妄想
C. 被动体验 D. 思维贫乏
E. 思维破裂

2. 在精神分裂症的病因学研究中, 目前认为最重要的因素是

- A. 遗传因素 B. 环境因素
C. 生化因素 D. 精神因素
E. 生物因素

3. 精神分裂症的幻听中更有诊断价值的是

- A. 机械性幻听 B. 评论性幻听
C. 功能性幻听 D. 言语性幻听
E. 非言语性幻听

4. 精神分裂症最常见的情感障碍是

- A. 焦虑 B. 欣快
C. 情感淡漠 D. 情感高涨
E. 情感低落

5. 精神分裂症发病机制的多巴胺假说中关系到一切基本活动的是

- A. 黑质纹状体系统 B. 中脑-皮质系统
C. 前额叶及边缘系统 D. 中脑-边缘系统
E. 结节-漏斗系统
6. 紧张综合征主要见于
A. 癔症 B. 躁狂症
C. 神经衰弱 D. 精神分裂症青春型
E. 精神分裂症紧张型
7. 精神分裂症最重要的致病因素是
A. 脑发育异常 B. 遗传因素
C. 环境因素 D. 生化因素
E. 心理社会因素
8. 精神分裂症的特征性症状不包括
A. 幻听 B. 情感淡漠
C. 被害妄想 D. 联想障碍
E. 感觉障碍
9. 精神分裂症最主要的症状是
A. 情感淡漠 B. 紧张性木僵
C. 幻听 D. 意志活动增多
E. 思维联想障碍
10. 精神分裂症的幻听中更有诊断价值的是
A. 机械性幻听 B. 功能性幻听
C. 言语性幻听 D. 评论性幻听
E. 要素性幻听
11. 精神分裂症最常见的感知觉障碍是
A. 焦虑 B. 欣快
C. 幻觉 D. 情感高涨
E. 情绪不稳
12. 下列哪项不属于精神分裂症阴性症状
A. 情感淡漠 B. 思维贫乏
C. 意志减退 D. 被动体验
E. 兴趣减退
13. 精神分裂症病人最常见的阳性症状不包括
A. 幻觉 B. 妄想
C. 无快感体验 D. 思维贫乏
E. 被动体验
14. 不属于精神分裂症阴性症状的是
A. 情感淡漠 B. 思维贫乏
C. 意志减退 D. 社交缺乏
E. 象征性思维
15. 精神分裂症的临床症状一般没有
A. 意识障碍 B. 情感障碍
C. 感知障碍 D. 思维障碍
E. 行为障碍
16. 对精神分裂症的诊断最有价值的感知觉障碍是
A. 幻想性错觉 B. 假性幻视
C. 自窥症 D. 言语性幻听
E. 内感性不适
17. 精神分裂症遗传因素研究不包括
A. 家系调查 B. 双生子研究
C. 寄养子研究 D. 遗传途径的研究
E. 精神发育模型研究
18. 言语性幻听最常见于
A. 精神分裂症 B. 抑郁症
C. 狂躁症 D. 神经症
E. 偏执性精神病
19. 精神分裂症最多见的幻觉是
A. 视幻觉 B. 听幻觉
C. 触幻觉 D. 嗅幻觉
E. 本体幻觉
20. 对诊断精神分裂症有重要价值的思维障碍是
A. 关系妄想 B. 被害妄想
C. 原发性妄想 D. 象征性思维
E. 特殊意义妄想
21. 精神分裂症最有效的维持治疗是
A. 较长时间住院
B. 坚持服药
C. 坚持服药并参加工作
D. 渐减药并参加工作
E. 心理治疗
22. 不宜采用电休克治疗的精神分裂症是
A. 紧张型 B. 青春型
C. 偏执型 D. 单纯型
E. 伴严重自杀
- A2型题
23. 病人女性, 40岁, 其家属叙述该病人近2年来逐渐少语少动, 不与人交往, 孤僻离群, 对亲友冷淡, 不讲究个人卫生, 有时发呆, 此病人最可能的诊断是
A. 青春型精神分裂 B. 品行障碍
C. 单纯型精神分裂 D. 偏执型人格障碍
E. 妄想阵发
24. 病人男26岁, 精神疾病史2年, 常常认为周围环境中的无关事物都和自己有关, 此症

状属于

- A. 痴呆
- B. 夸大妄想
- C. 影响妄想
- D. 关系妄想
- E. 强制性思维

25. 病人女性, 40岁, 其家属叙述该病人近2年来逐渐少语少动, 不与人交往, 孤僻离群, 对亲友冷淡, 不讲究个人卫生, 有时发呆, 此病人最可能的诊断是

- A. 青春型精神分裂
- B. 品行障碍
- C. 单纯型精神分裂
- D. 偏执型人格障碍
- E. 妄想阵发

26. 躁狂症病人急性期发作时, 话多、意念飞跃, 护士恰当的反应是

- A. 加大音量
- B. 严肃、不苟言笑
- C. 简明扼要告诉病人自己的看法
- D. 鼓励他将话说完
- E. 斥责、批评病人

27. 某精神分裂病人, 每天把炉灰渣反复冲洗, 称“在提炼能治病的药”, 此症状属于

- A. 意向倒错
- B. 意志增强
- C. 情感倒错
- D. 刻板动作
- E. 关系妄想

28. 某精神分裂症病人认为有某种特殊的仪器在控制自己, 这属于

- A. 物理影响妄想
- B. 内心被揭露感
- C. 精神自动症
- D. 语词新作
- E. 关系妄想

29. 某精神分裂症病人回答问题时, 句句说不到点子上, 但句句似乎又沾点边, 令听者抓不到要点, 这属于

- A. 思维破裂
- B. 思维散漫
- C. 思维贫乏
- D. 思维奔逸
- E. 思维失调

30. 病人, 男性, 18岁, 近一年来对家人亲友变得冷淡, 不去上学, 不洗澡, 不主动更换衣服, 对与自己有关的各种事物表现的无动于衷, 最可能的诊断是

- A. 人格障碍
- B. 精神分裂症
- C. 抑郁症
- D. 恐怖症
- E. 创伤后应激障碍

31. 病人男性, 30岁, 患有精神分裂症, 罪恶妄想坚信自己有罪拒绝进食, 护士有效的护理

方法是

- A. 喂食
- B. 鼻饲
- C. 集体进食
- D. 单独进食
- E. 饭菜混合一起

32. 病人, 男生, 32岁, 三年前曾住院诊断为精神分裂症, 经治疗痊愈。近半年停药, 一个月前病情复发, 在家冲动毁物, 打骂父母。今有家属陪同来门诊。就诊时大喊大叫要杀人, 拒绝治疗, 该病人适用于下列哪项

- A. 自愿住院
- B. 医疗保护住院
- C. 强制住院
- D. 拘留住院
- E. 社区看护下治疗

33. 王某, 女, 45岁, 病人入院前三个月来表现为: 怀疑单位同事在她水杯里下毒药, 认为一些同事和领导串通起来算计自己, 而且步步紧逼, 担心家里被装了窃听器, 为此紧张、害怕, 无法继续工作和正常生活。入院后, 病人拒食拒水, 每日独自在床头倚窗, 静坐侧耳, 有时面露微笑伴自语, 有时双手捂耳, 面露惊恐, 或以被蒙头, 有事有冲动伤人行为。关于该病药物治疗的原则, 描述正确的是

- A. 高剂量起始, 短程, 足量
- B. 症状表现丰富时方可用药
- C. 多种同类药连用效果好
- D. 药物的使用无需个体化
- E. 一般急性期治疗2个月, 巩固期治疗4~6个月

34. 病人, 31岁, 首次发作精神分裂症, 经药物治疗后症状缓解, 自知力部分恢复, 家属询问继续服药时间是

- A. 医生指导下长期治疗
- B. 医生指导下不少于1年
- C. 医生指导下不少于2年
- D. 医生指导下不少于3年
- E. 医生指导下不少于5年

35. 针对精神分裂症病人的安全护理措施, 下列哪项是错误的

- A. 每1小时巡视一次, 确保病人安全
- B. 时时评估, 及时干预, 防止意外发生
- C. 对自杀、自伤、伤人、兴奋冲动的病人应安置在重点病室, 由专人24小时看护
- D. 对于极度兴奋的病人, 可按医嘱进行保护性约束

E. 对不合作的病人应适当控制病人的活动范围,防止病人外走

36. 病人男 17 岁,双胞胎弟弟两周前去世,他总觉得别人都想害他,要致他于死地,不想进食已超过一周,同时他听到弟弟呼唤他去做伴,下列各项护理诊断中,应优先处理的是

- A. 营养失调:低于机体需要量
- B. 健康维护能力改变
- C. 自我照顾能力缺失
- D. 思维过程改变
- E. 潜在的自伤行为

37. 护理有被害妄想症状的病人时,下列措施不妥当的是

- A. 护士在进行任何护理措施前先给予简单解释
- B. 悄悄要走进病人的床边
- C. 避免在病人听不到的地方说悄悄话
- D. 避免肢体碰触
- E. 倾听病人的诉说,不予评论,但正面告诉病人自己没有这种体验

A3/A4 型题

(38~41 题共用题干)

病人男性,23 岁,觉得大街上人们都在注意他的行动,对他有敌意,房子里有人安装了摄像头,监视他的行动,有时自言自语,自笑;不吃家人做的饭,害怕饭里有毒,要自己亲自做饭;对家人和同学漠不关心,父亲病重住院,病人无动于衷。

38. 该病人可能患有

- A. 癔症
- B. 抑郁症
- C. 焦虑症
- D. 精神分裂症
- E. 强迫症

39. 该病人情感属于

- A. 欣快
- B. 情感淡漠
- C. 情感高涨
- D. 情感低落
- E. 情感暴发

40. 该病人思维属于

- A. 关系妄想
- B. 夸大妄想
- C. 被害妄想
- D. 物理妄想
- E. 钟情妄想

41. 该病人主要护理问题为

- A. 社交障碍
- B. 预感性悲哀

- C. 思维过程改变
- D. 生活自理能力下降
- E. 安全的需要

(42~44 题共用题干)

某病人,18 岁,2 个月前急性起病,意识清晰,说话让人难以理解,行为幼稚怪异,本能意向亢进,有片段的耳闻亲友声音的幻觉,觉得被人跟踪。

42. 此病人最可能的诊断

- A. 青春型精神分裂
- B. 偏执型精神分裂
- C. 单纯型精神分裂
- D. 病毒性脑炎
- E. 分裂样精神病

43. 此期最好的治疗方法是

- A. 心理治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 电休克治疗
- D. 工娱治疗
- E. 心理和社会康复

44. 当该病人兴奋,有幻觉、妄想,但肝功能正常时,在下列药物中应选用的是

- A. 氟哌啶醇
- B. 氯丙嗪
- C. 舒必利
- D. 利培酮
- E. 奋乃静

(45~46 题共用题干)

护士发现,病人在独处时总是听到耳边有人说话:“你快去死、不许吃饭”。

45. 此时病人最易出现的危险行为是

- A. 冲动行为
- B. 大声喊叫
- C. 护理不合作
- D. 不动、静静要听
- E. 自伤、自杀行为

46. 护士应采取的有效措施是

- A. 观察
- B. 报告医生
- C. 将病人约束
- D. 有专人护理
- E. 任其自由活动

(47~48 题共用题干)

王某,女,45 岁,病人入院前三个月来表现为:怀疑单位同事在她水杯里下毒药,认为一些同事和领导串通起来算计自己,而且步步紧逼,担心家里被装了窃听器,为此紧张、害怕,无法继续工作和正常生活。入院后,病人拒食拒水,每日独自在床头倚窗,静坐侧耳,有时面露微笑伴自语,有时双手捂耳,面露惊恐,或以被蒙头,有事有冲动伤人行为。

47. 该病人最可能的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 抑郁症
- C. 癔症
- D. 焦虑症