

XINBIAN
FUCHANKE
YIZHU
SHOUCE

新编 妇产科 医嘱手册

李爱斌 | 主编

· 简明
· 易查
· 便携

- 检查、用药一本通
- 临床妇产科医师掌中宝



北京科学出版社

新编妇产科医嘱手册

李爱斌 主编

 北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编妇产科医嘱手册/李爱斌主编. ——北京：北京科学技术出版社，2014.5
ISBN 978-7-5304-5539-5

I. ①新… II. ①李… III. ①妇产科 - 医嘱 - 手册
IV. ①R710.5 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 028869 号

新编妇产科医嘱手册

主 编：李爱斌

责任编辑：张晓雪

责任校对：黄立辉

责任印制：李 茗

封面设计：李婷婷

出版人：曾庆宇

出版发行：北京科学技术出版社

社 址：北京西直门南大街 16 号

邮政编码：100035

电话传真：0086-10-66161951 (总编室)

0086-10-66113227 (发行部)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱：bjkjpress@163.com

网 址：www.bkjdw.cn

经 销：新华书店

印 刷：三河国新印装有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/40

字 数：246 千

印 张：11.75

版 次：2014 年 5 月第 1 版

印 次：2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 5539 - 5/R · 1741

定 价： 28.00 元

京科版图书，版权所有，侵权必究。

京科版图书，印装差错，负责退换。

编者名单

主 编 李爱斌 蒋艳萍

副主编 吴娟子 王雅琴 彭 芳

编 者 (以姓氏笔画为序)

王雅琴 牛 婷 朱雪娇 孙 青

李玉兰 李爱斌 吴娟子 沈 兰

张 文 陈 力 赵玉宇 涂红梅

奚文裕 曹景云 彭 芳 蒋艳萍

前　言

医嘱是临床医师日常医疗实践中重要的工作之一，是根据不同病种、病情做出的治疗决定或为明确诊断拟定的处理方案。正确、及时的医嘱是保证和提高医疗质量的基础，也是当前保障医疗安全、避免医疗纠纷的重要环节。在临床实践中，因病情的复杂性及多样性，以及年龄、性别、居住生活环境的不同，甚至生物、心理及社会等诸多因素的影响，诊疗工作存在一定困难，临床工作急需系统规范的工作蓝本。

医嘱包括对患者的护理，饮食要求，检测内容，治疗的药物及其剂量、用法，必需的特殊医疗措施，必需的检查项目，以及术前准备及术后处理等。

本书内容主要为妇产科住院医嘱，对一些不必住院治疗的疾病，以门诊医嘱的形式列出。妇产科临床医嘱与妇产科用药和护理密切相关，故本书也分别给予介绍。本书的编写形式为以某一疾病为基础，内容包括对该病的简要介绍、诊断要点、治疗要点、必需的医嘱、注意事项及对该病的思考链接，使得医师对该病有准确

的掌握，从而迅速而无误地做出判断，是对临床工作具有提纲挈领作用的一本好书。

妇科医嘱是对女性生殖系统出现的病理改变，包括炎症、肿瘤、内分泌失调等做出的治疗处理；产科医嘱包括针对妇女在妊娠、分娩、产褥过程中出现的生理、病理改变的处理方案。妇科、产科均有手术医嘱和非手术医嘱，手术医嘱分为术前医嘱和术后医嘱。手术医嘱中的术前医嘱根据临床习惯和一般医嘱融为一体，术后医嘱则单列为术后长期医嘱和术后临床医嘱。

根据疾病谱的变化，本书包含了更多的妇产科病种，突出常见病和多发病。书中既介绍基本诊疗措施，又适当反映该学科领域新进展，并借鉴国际上的临床治疗指南。每个病种按不同类型、病期、缓急、严重程度列出诊疗程序，提出诊疗思路。在医嘱中写“或”者，即指择用其中一种；列出同类药多种的，也只是供开医嘱时选用。

为了与临床工作相适应，本书开具医嘱时采用了临幊上常用的缩写，具体内容如下页表所示。

本书列出药物参考用法或诊疗措施，主要是为实习医师和住院医师提供参考，希望能够成为他们即查即用的口袋书。读者在选用药物时，还应认真阅读药品说明书或其他权威著作，核对适应证、禁忌证、用法、剂量

英文缩写	中文全称	英文缩写	中文全称
qd	每日1次	qn	每晚
bid	每日2次	im	肌肉注射
tid	每日3次	ih	皮下注射
qid	每日4次	iv	静脉注射
q3d	每3天1次	iv gtt	静脉滴注
qod	隔日1次	po	口服
q6h	每6小时1次	prn	必要时
q8h	每8小时1次	st	立即执行1次

和注意事项，避免不良反应。在使用本书时必须注意各地医疗单位的实际情况，因地制宜，有的放矢，首选当地可用的检查项目及治疗药物，适当增加先进的检查措施及新疗法，尽量做到开出的医嘱完整、合理、实用。

由于编者的水平有限，本书内容可能存在某些不足和疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

李爱斌

目 录

上篇 妇 科

第一章 生殖道炎症	3
滴虫性阴道炎	3
念珠菌性阴道炎	5
细菌性阴道病	7
萎缩性阴道炎	10
宫颈炎	12
急性盆腔炎	16
慢性盆腔炎	20
生殖器结核	22
第二章 女性性传播疾病	25
淋病	25
尖锐湿疣	29
梅毒	31

生殖道沙眼衣原体感染	35
支原体感染	37
人类免疫缺陷病毒感染	39
第三章 外阴及阴道肿瘤	44
外阴肿瘤	44
阴道肿瘤	54
第四章 子宫颈肿瘤	57
第五章 子宫体肿瘤	69
子宫肌瘤	69
子宫内膜癌	73
子宫肉瘤	78
第六章 输卵管肿瘤	82
第七章 卵巢肿瘤	86
卵巢良性肿瘤	86
卵巢恶性肿瘤	89
第八章 妊娠滋养细胞疾病	95
葡萄胎	95
妊娠滋养细胞肿瘤	98
第九章 妇科肿瘤化疗方案	105
卵巢上皮性癌	105
卵巢生殖细胞恶性肿瘤	110

恶性滋养细胞肿瘤	113
第十章 子宫内膜异位症	117
轻度子宫内膜异位症	119
重度子宫内膜异位症	123
第十一章 生殖内分泌疾病	126
功能失调性子宫出血	126
闭经	131
多囊卵巢综合征	137
高泌乳素血症	140
经前期综合征	142
绝经综合征	144
第十二章 女性生殖器官发育异常及损伤	147
处女膜闭锁	147
阴道横隔及阴道纵隔	149
先天性无阴道	151
中隔子宫	154
外阴及阴道损伤	155
第十三章 女性盆底功能障碍性疾病	158
盆腔器官脱垂	158
压力性尿失禁	172
生殖道瘘	174

第十四章 不孕症	185
第十五章 计划生育	189
输卵管绝育术	189
人工流产和钳刮术	192
中孕引产	194
中期妊娠水囊引产术	198
中期妊娠剖宫取胎术	200
第十六章 内镜技术	203
腹腔镜术	203
宫腔镜术	206

下篇 产 科

第十七章 正常分娩和正常产褥	213
正常分娩	213
正常产褥	215
第十八章 产力异常	218
子宫收缩乏力	218
子宫收缩过强	221
第十九章 异常产褥	223
产褥感染	223

晚期产后出血	227
产褥期抑郁症	230
产褥中暑	232
第二十章 妊娠时限异常	236
流产	236
早产	245
过期妊娠	248
第二十一章 妊娠期特有疾病	254
妊娠期高血压疾病	254
HELLP 综合征	262
妊娠期肝内胆汁淤积症	265
妊娠剧吐	269
第二十二章 妊娠期血型不合溶血病	272
第二十三章 妊娠晚期出血	277
胎盘早剥	277
前置胎盘	279
第二十四章 胎儿发育异常及羊水异常	283
胎儿生长受限	283
死胎	286
羊水过多	288
羊水过少	292

第二十五章 胎儿窘迫及胎膜早破	295
胎儿窘迫	295
胎膜早破	298
第二十六章 妊娠合并内科疾病	302
心脏病	302
病毒性肝炎	306
糖尿病	312
妊娠合并贫血	317
甲状腺功能亢进	327
第二十七章 妊娠合并外科疾病	332
妊娠合并急性阑尾炎	332
妊娠合并急性胆囊炎、胆石症	334
妊娠合并急性胰腺炎	337
第二十八章 分娩期并发症	341
羊水栓塞	341
子宫破裂	348
产后出血	351
第二十九章 产科手术	357
人工破膜术	357
会阴切开缝合术	359
宫颈裂伤修补术	361

胎头吸引术	362
产钳术	364
剖宫产术	366
第三十章 新生儿疾病	370
新生儿窒息	370
早产儿	375
低体重儿	376
巨大儿	377
新生儿颅内出血	378
新生儿吸入性肺炎	382

附录

附录一 妇产科特殊用药	389
附录二 妇科疾病护理	421
附录三 产科及计划生育护理	433

第一章 生殖道炎症

滴虫性阴道炎

滴虫性阴道炎是较为常见的阴道炎之一，由阴道毛滴虫引起。可经性交直接传播，或经公共浴池、坐式便器、污染的器械等间接传播。

● 诊断要点

1. 阴道分泌物增多，呈黄绿色或稀薄脓性，泡沫状且有臭味。
2. 外阴瘙痒，可伴有灼热、疼痛、性交痛。
3. 妇科检查可见阴道黏膜充血，严重者可见有散在的出血点，后穹隆有多量分泌物。
4. 阴道分泌物中可找到阴道毛滴虫。

【治疗要点】

1. 一般治疗 保持外阴的清洁,注意个人卫生。内裤及洗涤用品应煮沸5~10分钟。
2. 药物治疗 主要是针对滴虫用药。可分为局部用药和口服用药。

【门诊医嘱】

1. 口服用药 甲硝唑2g,st;
或替硝唑2g,st;
或甲硝唑400mg,bid,7d。
2. 局部用药 0.5%醋酸或1%乳酸溶液冲洗阴道,
qd,10d。
甲硝唑栓200mg,qn,10d。

【注意事项】

- ◆ 性行为是滴虫性阴道炎的主要传播途径,性伴侣应该同时治疗,并且在治疗期间禁止性交。
- ◆ 服药后偶见不良反应,如恶心、呕吐等胃肠道反应,或皮疹、头痛、白细胞减少等症状。若出现上述症状,立即停药。妊娠早期及哺乳期不宜口服用药,建议局部用药。