

公餘全集

毓靈琛藏

醫學實在易卷之三

聞長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參

孫男

心與微菴

全枝字

心蘭芝亭

裏症

傷寒病陽明經大渴大熱法用白虎湯為表中之裏症及其傳裏證語胸腹滿不大為裏中之裏症宜三承氣湯用詳於傷寒門不贅列河間先生用二承氣湯代上三方

傷裏裏症詩

表中之裏是陽明熱渴汗多白虎湯行胃實肺潮膨譫語裏中之

裏枳實黃芩三承氣湯隨其見症而用之

心痛心為君主之官受邪而痛手足寒至節名胸膈痛肺氣不調胃脘痛

胃氣不和兩脇痛肝脾大腹痛脾小腹痛昔人每症皆分別九種曰

飲曰食曰風曰冷曰熱曰蟲曰怪曰注曰去來浮者心虛而動痛也

注者邪氣着而痛也去來者作止不常亦邪氣也但注陰而去來為

陽其實是小家伎倆不必泥也宜以上中下兩旁部位分之自心

胸至胃脘為上部宜宣其陽氣陽氣虛宜黃芪氣實宜枳實氣結宜

貝母瓜蒌皮氣逆宜半夏薤白氣滯宜檀香砂仁之類自胃脘至膈

為中部宜調其陰陽仲景理中丸以人參甘寒多液自草味酸於氣

補陰以白朮乾薑補陽爲萬古準繩卽如通脈回逆湯急於四陽若有腹痛必加苦寒之藥以養陰黃連湯重於清火因有腹痛不離辛熱之薑桂以開陽此理甚微非熟於內經者不可與語也自臍下至陰器爲下部宜破其陰氣金匱名爲寒疝今人以寒疝腫大爲疝金匱則以腹中痛劇爲疝所主皆附子烏頭蜀椒大熱之性扶陽以破陰若前痛徹後後痛徹前陰陽無分界限宜加赤石脂一二兩以堵截之而生薑當歸羊肉湯藉羊肉之濁氣引入陰分以破陰充其神妙也脇肋一帶爲側部宜利其樞轉肝膽之氣其行在側小柴胡湯爲少陽之正藥當歸四逆湯爲厥陰之正藥或再加鮮橘葉四十片則得矣以上諸症脈細而遲寒也以薑桂附子吳茱萸之類爲主脈大而數熱也以金

鈴子黃連沙參芍藥之類爲主痛而利者虛也以附子理中湯之類
爲主痛而閉者實也以小承氣湯之類爲主亦有寒實而痛者宜大
黃附子湯以溫通之若吐蟲則用附子理中湯去甘草加當歸川椒
黃連烏梅若食積則先以平胃散加麥芽山楂以消導之否則以承
氣湯下之若因怒氣而痛則以七氣湯加貝母撫芎香附以解之入
人共知不必贅也又仁齋直指治脾痛攻刺百藥罔效用和劑拙刀
散如神此方醫家秘不輕傳嘉慶十八年長州徐炳南梓尤氏金匱
翼載之心腹爲陰故列於裏症

經舉痛論曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲滯而不行
客於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛厥病篇曰眞

心痛手足青至節

心痛甚旦發夕死夕發旦死。按經文極繁。此不

過摘其要語

心腹諸痛詩

痛分四面定醫方

下主於陰上屬陽。介在陰陽中。部位樞行在側

轉斯康

痰飲症乃水氣上泛

得陽煎熬則稠而爲痰。得陰凝聚則稀而爲飲

此症以脾腎爲主以

水歸於腎而受制於脾也。痰宜二陳湯。隨寒熱

虛實加減。怪病老痰

宜滾痰丸飲。宜桂苓甘朮湯。眞武湯。二症愈後

以桂附八味丸收功

經義六元正紀大論曰

少陰司天四之氣。民病飲發。又曰太陰所至爲

積飲痞隔又曰土鬱之發爲飲發注下至眞要大論曰諸病水液澄散清冷皆屬於寒按內經言飲而不言痰有之自仲景始

痰飲詩

痰病卻緣水泛成

滾痰丸峻烈三陳

湯和

桂苓甘朮

湯

同眞武

一化

太陽水府之氣一鎮少陰水藏之氣

五飲源流一派清

附錄

痰飲之病源皆水也

經云三焦者決瀆之官水道出焉設三焦失職

因之聚成痰飲

變證多端古人論痰有四痰飲懸飲溢飲支飲詳於

金匱要略余著有淺

註宜細辨之然又有聚而不散者名留飲僻處

脇下者名癖飲流移

不定者名流飲沉伏於內者名伏飲又因酒而

成癖者名酒癖。因寒所傷者名治痰。因熱所傷者名熱痰。總由於三焦失職。氣道否滯所致。是以氣行卽水行。氣滯卽水滯。唯能宣通三焦之氣。則爲治其本。而清其源矣。金匱曰。當以溫藥和之。此六字爲金鍼之度也。所以然者。人之氣血得溫則宣流及結而成病。尤在涇新立七法。授時醫之捷徑。余閱江蘇顧西疇徐炳南之治案。多本於此。今姑錄之以見奇。相賞疑與析神交在三千里外云。

一曰攻逐

古云治痰先補脾。脾復健之常。而痰自化。然停積既甚。譬如溝渠壅滯。久則倒流逆上。污濁臭穢。無所不有。若不決而去之。而欲澄治已壅之水。而使之清。無是理也。故須攻逐之劑。

神仙墜痰丸 控涎丹 礞石滾痰丸 十棗湯

二曰消導

凡病痰飲未盛或雖盛而未至堅頑者不可攻之但宜消導而已消者損而盡之導者引而去之也。

青礞石丸 竹瀝丸 半夏丸

三曰和

始因虛而生痰繼因痰而成實補之則痰益固攻之則正不支惟寓攻於補庶正復而痰不滋或寓補於攻斯痰去而正無損是在辨其虛實多寡而施之。

六君子湯

按此湯條宜香

宜人補方此砂六君子湯

四日補

夫痰即水也。其本在腎。痰即液也。其本在脾。在腎者氣虛水泛在脾者土虛不化。攻之則彌盛。補之則潛消。非明者不能知也。

濟生腎氣丸

桂苓甘朮湯

六君子湯

余新
增之

五日溫

凡痰飲停凝。心隔上下。或痞或嘔。或利。久而不去。或雖去而復生者。法當溫之。蓋痰本於脾。溫則能健之。痰生於溼。溫則能行之。

沉香茯苓丸

本事神朮丸

六日清

或因熱而生痰。或因痰而生熱。交結不解。相助爲虐。昔人故言痰因

火而逆上者治火爲先也其證咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重或欬吐稠粘面目赤熱。

二陳湯加黃芩連翹山梔桔梗薄荷

七日潤

肺虛陰涸枯燥曰至氣不化而成火津以結而成痰是不可以辛散不可以燥奪清之則氣自化潤之則痰自消

王節齋化痰丸

痢疾伏邪之爲病也夏月受非時之小寒或貪涼而多食瓜果胃性喜寒初不覺其病久則鬱而爲熱從小腸以傳大腸大腸喜熱又不覺其爲病至於秋後或因燥氣或感涼氣或因飲食失節引動伏邪

以散暴瀉旋而裏急後重膿血赤白小腹疼痛甚則爲噤口不食之
危症當却寒氣在胃熱氣在腸寒熱久伏而忽發之病用芍藥湯瀉
大腸之伏熱令邪氣一行正氣自能上顧脾胃如若未效卽用理
中湯以溫胃中之伏寒加大黃以泄大腸之伏熱一方而兩挽其要
紅者可加地榆白者可加木香紅白兼見者並加之倘久而不瘥可
用理中湯原方以補之或用真人養臟湯以瀉之或間用香連丸以
堅之此定法亦活法也如初起而發熱不休方書皆云死證其實非
經絡不和卽外感風寒所致唯審其發熱而仍惡寒者用當歸四逆
湯發熱胸脇滿而嘔吐者用小柴胡湯和其經絡而下利自懸倉廩
湯更面面周到足補古人所未及痢爲腸胃之病故列於裏症。

義經

太陰陽明論曰。食飲不節。起居不時者。陰受之。陰受之則入五臟。入五臟則填滿閉塞。下爲飧泄。久爲腸澼。論疾診尺篇曰。春傷於風。夏生飧泄。腸澼。陰陽別論曰。陰陽虛。腸澼死。氣厥論曰。腎移熱於脾。傳爲虛腸澼。死。按內經新謂腸澼。卽今之下痢。方書又名滯下。是也。本經惟評虛實論。謂腸澼。便血。身熱。則死。寒則生。大奇論。謂腎脈小搏沉。爲腸澼。下血。血溫。身熱者死。又云。心肝澼。其脈小沉澱。爲腸澼。其身熱者死。熱見七日者死。論疾診尺篇。又謂飧泄。脈小。手足寒者難已。脈小。手足溫者易已。數句互異。而不知熱與溫有別。熱者壯熱。溫者溫和也。且痢與瀉。二證同而不同。

痢疾詩

痢分寒熱各相爭。張氏

勞心在近時人著張氏醫參

伏邪論最精腸熱腸喜熱

而伏爲病根

胃寒

胃喜寒曰受寒而伏爲病根

標

標本寒本

異暑過

炎暑已退寒氣欲動

秋至秋新

初至餘熱猶燃

序時更理中湯

薑克貪涼病加味

前湯加大

黃芩鬱火清初患

尚輕休語此止從芍藥

湯定權衡

痢疾救逆詩三首

發熱如焚痢可愁當歸四逆湯

探源流小柴

胡湯治嘔兼寒熱倉廩

湯中再講求。

噤口垂危亦可醫大承

氣湯

神妙少人知苓連葛草

葛根黃連黃芩甘草湯相

需用奪出生關在片時真人養臟

湯

直腸需

水穀直下不停間用香連凡

止下趨仲景桃花

湯

春有腳個中誰識反三隅

陰虛下痢發熱膿血稠粘及休息痢用駐車丸。

陰虛下痢詩

千金傳下駐車丸兩半歸連重一般三兩阿膠薑一兩陰虛久痢得靈丹

阿膠三兩黃連當歸各一兩半乾薑炒一兩醋煮阿膠爲丸每服四五十丸晝夜三服米飲下三車運精氣神分治三焦以調適陰陽此因陽熱過旺陰精受傷故用黃連以駐鹿車之驟乾薑以策牛車之疲阿膠以挽羊車之陷當歸以和精氣神之散亂也張石頑此註甚超全錄之

奇恆痢。張隱菴曰病生於外感內傷人所共知而奇恆之病知之者

鮮矣。奇恆者，異於恆常也。卽以奇恆之下利而言，乃三陽並至，三陰莫當，積並則爲驚病，起疾風至如礮礪，九竅皆塞，陽氣旁溢，噤乾喉塞，痛并於陰，則上下無常，薄爲腸澼，其脈緩小遲澹，血溫身熱，死熱見七日死。蓋因陽氣偏劇，陰氣受傷，是以脈小沉澹，此症急宜大承氣湯瀉陽養陰，緩則不救。醫者不知奇恆之因，見脈氣和緩而用平易之劑，此又何異於毒藥乎？故曰：服平和之藥而愈者，原不死之病，勿藥亦可服，和平湯而後成不救者，醫之罪也。

奇恆痢病詩

奇恆痢疾最堪驚，陽並於陰勢匪輕。
喉塞噤乾君切記，

嘉慶戊午夏，泉郡王

孝廉患痢七日，忽於寅午之交，聲微啞，語半刻卽止，酉刻死。上月榕城葉廣文觀鳳之弟患同前症，來延自言伊弟痢亦不重，飲

食如常唯早晨噉乾微痛如見鬼狀半刻卽止時居酉大承急下刻余告以不必往診令其速回看看果於酉戌之交死

可回生

泄瀉之症內經所謂溼勝則濡泄是也宜以胃苓湯爲主如寒甚則下和清穀加乾薑附子吳茱萸如熱甚則下利腸垢去桂枝加黃連黃芩乾葛如食積加麥芽山查炒黑如虛甚加人參若五更後依時作瀉名脾腎瀉宜四神丸去肉荳蔻加人參白朮罌粟殼乾薑茯苓以棗湯疊丸臨臥以薑湯送下四五錢久瀉宜聖濟附子丸又金匱翼乳豈丸治滑泄不止諸藥罔效方用肉荳蔻生爲末通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐子大每五十丸空心米飲送下

經義

金匱真言曰長夏善病洞泄寒中陰陽應象大論曰清氣在下則