

攻陣

會稽 張介賓 會卿著
會稽 魯 超 謙菴訂

仲景 大承氣湯一 治陽明太陰傷寒證語五六日不大便腹滿

煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脉實者○劉河間加甘草各三

一承氣湯

大黃 四兩 厚樸 半斤 枳實 五枚 芒硝 三合

右以水一斗先煮厚樸二物取五斤去滓內大黃煮取二升

去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

仲景 小承氣湯二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脉

實六七日不大便喘滿者

即前人承氣湯減去芒硝

仲景調胃承氣湯三

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日

肺漸熱者○凡陽明病有一證右經者當解肌入腑者當攻

下

大黃

芒硝

甘草

各五錢此從近法

每服二五錢水一大盞煎七分溫服

仲景桃仁承氣湯四

治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁

十二枚去皮尖

官桂

甘草

各一錢

芒硝

三錢

大黃

半兩或一兩

此從近法

右咬咀作一服或分二服水一大盞煎七分溫服

良桃仁承氣湯五

治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾

漱水不嚥遍身黃色小便自利或血結胸中

可近或寒熱皆述其人如狂

桃仁半兩去尖

黃少

甘草二錢

肉桂一錢

右薑水煎發日五

更服

當歸承氣湯六

治

燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥或咽乾

鼻乾或便溺結闕

通宜此方

當歸

大

黃各四錢

甘草

芒硝

各二錢

右咬咀人薑煎服

仲景大柴胡湯七

表

證未除裏證又急汗下兼行用此

柴胡半斤

半

夏半升

黃芩

芍藥

各三兩

生薑五兩切

枳

實四枚

大黃二兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗

二升煮取六升去滓再煎溫服一升日三

服

陶氏六一順氣湯八

以代大小承氣大柴胡大陷胸等湯之神

藥也○此湯治傷

寒熱邪傳裏大便秘結實口燥咽乾怕執謔

語揭衣狂走班黃陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證效不盡述

大黃

枳實

黃芩

厚樸

柴胡

甘草

芍藥

芒硝

水煎服欲峻者大黃後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩虛之人或婦人產後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去芒硝下之則吉蓋惡硝性峻急故有此戒經云轉藥執緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

仲景

大陷胸湯

治大結胸手不可按

大黃四錢

芒硝三錢

甘遂末

二分此從逆數

用水一鐘半先煎大黃至一鐘內芒硝煎一二沸去渣內甘遂末和勻服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原方得大黃六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮二升分二服得快止後服

小陷胸湯十一 方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脉浮滑者

大黃湯十一 治瀉痢溼熱邪盛膿血稠黏裏急後重日夜

無度者

大黃一兩

右細剉好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分二服頓服之痢止一服如未止再服以痢爲度服芍藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外大黃湯十二 方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金大黃甘草湯 十三

治食已即吐○按此湯必下焦脹實大

便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃 四兩

甘草 一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

大黃硝石湯 十四

治黃疸腹滿小便不利而赤白汗出表

和裏實者宜用之

大黃

黃芩

硝石

各四兩

梔子

十五枚

右四味以水六升煮

取二升去滓內渣更煮取一升頓服

金梔子大黃湯 十五

治酒疸心中懊懣成熱痛

梔子

十四枚

大黃

一兩

枳實

五枚

豆豉

一升

右用水六升煮取二升分溫三服

防風通腎散

治諸風潮搐手足痠癱小兒急驚便結邪

熱暴甚肌肉蠕動一切風熱疥癩等疾

防風

川芎

當歸

芍藥

麻黃

連翹

薄荷葉

大黃

芒硝

錢各五

石膏

黃芩

桔梗

各一兩

滑石

錢各二

梔子

錢各二

右爲末每服二錢水

一大鐘生薑三片煎六七分溫服○醫

統方各五分用水二鐘煎服○痰嗽加半夏○閉結加大黃

二錢○破傷風加羌活全蝎各五分○此方有四賈同知方

無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂癘瘍機要有白芷蒺藜鼠

柏子甘草

雙解散

方在痘疹

四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散

十八

方在外科

二百九

治便癰熱毒大小便秘

局涼膈散

十九

瀉三焦六經諸火

大黃

樸硝

甘草

各一錢

連翹

一錢半

梔子

黃芩

薄荷

各五分

水一鐘半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

陳涼膈散

二十

方在痘疹

八三

解痘疹內熱良方

陶氏黃龍湯

二十一

治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而

下利統清水身熱譫語發渴此非內寒而利乃因湯藥而利

也名曰積熱利證宜急下之身無熱者宜用湯身有熱者

宜六一順氣湯醫家有不識此證者便呼為漏底傷寒卽用

熱藥止之者是猶抱薪救火也誤入多矣

大黃

芒硝

老弱者去此

枳實

厚樸

甘草

人參

當歸

水一鐘半生薑三片棗二枚煎服

良黃龍湯二二

方在婦人

八五

治妊婦感冒

風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏黃龍湯二三

方在小兒

二五

治小兒感冒

發熱或寒熱往來

和玉燭散二四

治血虛有滯或婦人經候不通腹脹作痛○

此四物湯對調胃承氣湯也

當歸

川芎

芍藥

地黃

大黃

芒硝

甘草各等分

右咬咀水前服○甚者倍用大黃

四順清涼飲子

二五

治大人小兒血脈壅實臟腑生熱面赤

煩渴睡臥不寧大便秘結

大黃

當歸

芍藥

甘草

各等分

右咬咀水煎服

我元四物湯二大

治臟結秘澀

當歸

熟地黃

川芎

白芍藥

大黃煨

桃仁各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景抵當湯二七

治傷寒熱在下焦少腹鞭滿其人發狂小便

自利者下血

乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭

條熬

蟲虫

三十個熬去翅尾

桃仁

二十個去皮

大黃

三兩酒浸

右四味為末

以水五升煮取三升○又抵當丸亦即此四味

仲景十棗湯二八

治懸飲內痛

芫花

醋

拌經宿炒微黑勿焦

大戟

長

流水煮半時晒乾

甘遂

麪

裹煨各等分

右爲細末先

以水一鐘半煮大棗十枚至八分去棗納藥朱

強人一錢弱

八五分平日服之不下更加五分決下徐以糜

粥補之

古潔

三化湯

二九

治中風外有六經之形證先以續命湯主之

內有便溺之

阻格此方主之

厚樸

薑製

大黃

枳實

羌活

各等分

右咬咀每服

一兩水煎服微利則止

選要

透膈湯

三十

治脾胃不和中脫氣滯胸膈滿悶噎寒不通

脇肋脹痛痰

涎嘔逆飲食不下

木香

白豆蔻

砂仁

枳櫛

枳殼麤炒

厚樸薑汁

半夏製

青皮

橘紅

甘草

大黃

樸硝各一錢

水一鐘半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金茵陳蒿湯三

治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘

或食即頭眩是為穀疸

茵陳九錢

大黃四錢半

山梔一錢半

右作二服每服水二鐘煎八分食遠溫服

河芍藥湯三二

下血調氣經曰洩而便膿血氣行而血止行

血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩

當歸

黃連各五錢

木香

甘草炙

檳榔各二錢

大黃三錢

官桂一錢半

黃芩五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大

黃如汗後臍毒加黃柏半兩依前服○愚按此湯乃河間之心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黃湯 三三 治濕滯脚氣

羌活 錢半

當歸 一錢

枳實 五分

大黃 酒煨 三錢

水一鐘半煎八分食前空心溫服以利為度

羌活導滯湯 三四

治風濕實滯脚氣

羌活

獨活 各半兩

防已

當歸 各三錢

枳實 超畏 二錢

大黃 酒煨 一兩

右每服五七錢水一鐘半煎至七分溫服量虛實加減微利

則已

半黃瀉心湯 三五

治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃 另研 一兩

水片 另研 一分

朱砂 另研 二錢

大黃 生 一兩

右為細末利勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

明三稜散三六

治積聚癥瘕疔癰不散堅滿痞悶食不下

三稜

白朮炒各二兩

蓬朮

當歸各五錢

木香

枳櫛各三錢

右為末每服三錢沸湯調下

三稜丸三七

治血癥血瘕食積痰滯

莪朮醋浸炒

三稜各三兩

青皮

麥牙炒

半夏各一兩

右共用好醋一鐘煮乾焙為末醋糊丸桐子大每服四十丸

淡醋湯下痰積薑湯下

二聖膏三八

貼積聚癥塊

石灰十兩

官桂半兩為末

大黃一兩綿紋為末

右將石灰細篩過炒紅用好醋熬成膏入大黃官桂末攪

勻以磁器收貯用泊紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

良方桃仁煎三九

治血瘕

桃仁

大黃炒各一兩

䗪虫牛兩炒黑

樸硝一兩

右爲末以醇醋一鍾磁器中煮三分下前三味不住手攪煎至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五
丸日午下穢物如未見耳服仍以調氣血藥補之○立齋曰
向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也
用前藥一服腹痛下瘀血血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛
者斟酌與之

川山甲散

四十

治癥痞瘕血心腹作痛

川山甲

炒焦

鱉甲

醋炙

赤芍藥

大黃

炒

乾漆

炒烟盡

桂心

各一兩

川芎

芫花

醋炒

歸尾

各半兩

麝香

一錢

右爲末每服一錢酒調下

和子禹功散 四一

瀉水之劑

黑丑 頭末 四兩

茴香 炒 一兩

或加木香 一兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨臥服

和子瀉散 四二

治一切痰飲十種水氣

甘遂 麩裹 煨 各二錢

芒硝 各二錢

郁李仁 一錢

大黃

牽牛末 各三錢

右為末滴水丸桐子大每服五十九溫水下

稀涎散 四三

吐頑痰

牙皂

炙去皮 弦一錢

藜蘆 五分

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

大異香散 四四

治積聚脹滿

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

枳殼 炒

藿香

香附

半夏麴