


百病通論

家庭醫藥常識之二

秦伯未編 方公溥校

時病通論
雜病通論

海中醫書局印行



百病通論

家庭醫藥常識第二集

秦伯未先生編

方公溥先生校

上海中醫書局印行



南京中医药大学图书馆版权所有

中華民國二十二年九月再版



編輯 校訂 發行 發行 寄印

者者

上海中華書局
蘭記書局
台灣嘉義街西市場

百病通論序

夫用藥不難。識病爲難。而家庭之間。尤不可不識病之綱要。以免臨時之徬徨無措。善哉。吾從弟季寅。獨有家庭醫藥常識之發刊也。從弟爲商界聞人。亦爲慈善界聞人。舉凡社會事業。力之所逮。莫不毅然任之。今歲被聘爲中醫書局營業部主任。鑒于病家之缺乏醫學常識。一旦疾疢染身。非乞靈于神祇。而浪投仙方。卽朝暮易醫。而雜藥亂進。胸無把握。心無主宰。因而輕病致重。重病致死。使枉死城中。平添千萬無告之魂魄。乃請海上名醫秦伯未先生編輯家庭醫藥常識一書。復請嶺南名醫方公溥先生詳加校訂。其用心之苦。用意之深。可謂至矣。他日者人持一卷。同具醫學智識。遇重病有把握。輕病能自療。造福社會。豈普通慈善家所能及耶。茲者第一集驗方類編已出版。第二集百病通

論又將付印。索言於余。余亦無醫學常識之人。且家人有病。亦在徬徨無措之中。爰爲略一翻閱。見全書分時病雜病爲二大類。每病又分原因診斷治療經驗爲四大綱。言淺而近。不涉醫家術語。叙證用藥。均能切要實施。不禁欣然色喜。歎爲家庭之無上秘笈。而私幸先覩之爲快。乃不辭而爲之序云。

民國十八年十二月十九日 鄞縣錢餘慶序於海上千頃堂書局

時病通論

第一種

▲醫界名人之評語▼

中西匯通醫社張錫純氏曰：

實用中醫學一書。會萃國醫數千年

之精華。融會一已十餘年之心得。乃

有關醫學盛衰之名著。非偶然也。

全國醫藥總會蔣文芳氏曰：

按部就班。分門別類。依課本之編製。

作忠實之指導。不特貢獻於醫界人

士。且使民衆得以咸明醫學之常識。

蘭溪中醫專校張山雷氏曰：

不侈高深。不談空理。在在以實能應

用。爲歸宿。與詭異奇僻之不近人情

者。不可同日而語。傑作也。

醫藥新聞報社吳克潛氏曰：

網羅豐富。悉以經驗有用爲歸。蓋深

有慨夫空談之徒。徒足以欺世而無

裨於實際者作也。所以續墜緒而啓

來茲者。其在斯乎。

最 近 實 用 中 醫 學 名 著

(秦伯未先生著述)

得其至精，可以爲醫行道。
得其大概，可以充滿常識。

全書十二編要目如下：

- | | | |
|-------|--------|--------|
| 一 生理學 | 二 病理學 | 三 診斷學 |
| 四 藥物學 | 五 治療學 | 六 處方學 |
| 七 內科學 | 八 婦科學 | 九 幼科學 |
| 十 外科學 | 十一 五官科 | 十二 花柳科 |

全書七百餘面。用大號鉛字精印分

甲乙兩種。茲爲普及起見。定價特別

從廉

甲種平裝四厚冊 定價二元八角七折

乙種洋裝一厚冊 加實洋四角

中醫書局謹啓

發行處上海山東路

五馬路南十二號

百病通論

家庭醫藥常識叢刊第二集

第一種 時病通論

■ 溫病——分春溫暑溫濕溫冬溫四大症

原因 (春溫) 春風萌動。時令溫煖。腠理發泄。或感時邪。或由伏氣。責在太陰肺。(暑溫) 夏爲火令。赤日當空。奔走道途。熱傷元氣。津液消燂。水不勝火。責在陽明胃少陰心。(濕溫) 暑雨炎蒸。化生濕熱。人在氣交。感而爲病。責在太陰脾陽明胃。(冬溫) 冬時溫煖。感而卽發。陽不潛藏。亦屬非時之氣。

診斷 (春溫) 脈浮而數。舌苔初起薄膩。繼轉黃色而燥。甚則轉絳而黑。微寒身熱。頭痛欬嗽。煩躁胸悶。自汗鼻衄。(暑溫) 頭痛壯熱。煩渴喘促。或

瞽悶或汗泄。肌肉如炙。脈洪數或虛。舌光絳而乾。（濕溫）舌苔厚膩。或黃或白。身痛頭重。面垢自汗。兩脛逆冷。胸滿口乾。不能飲。小便不利。（冬溫）身熱頭痛。不惡寒或微惡寒。即發熱欬嗽煩渴。或咽痛下利。

治療

（春溫）主辛涼清解。梔豉湯。銀翹散。桑菊飲等。（暑溫）十味香薷飲。六一散等。（濕溫）濕重用藥偏燥。溫重用藥偏清。四苓散。蒼朮白虎湯。三仁湯等。（冬溫）忌風藥升舉。宜陽旦湯。葳蕤湯等。

經驗

春溫最易化熱。以不使變現煩渴詁語。或逆傳心包而致神昏爲能手。暑溫則熱毒入內。元氣不支。痰鬱不宣。易使奄然悶絕。濕溫不解。蒸達肌膚。必發白痞。以勻透爲佳。若瀰漫三焦。則神明蒙混。每至神糊妄言。或成痙厥。苟非完全化熱。涼膩之品。切不可投。伯未嘗見此誤事者多矣。

傷寒病——分太陽陽明少陽太陰少陰厥陰六大症

原因 (太陽) 太陽主一身之表。凡風寒客人。必先從此入。乃受邪之第一

步也。(陽明) 陽明爲多氣多血之海。乃陽盛之經。其腑爲胃。邪傳至此。無所復傳。(少陽) 少陽居半表半裏之間。而爲陽樞。相火游行。症多熱。(太陽) 寒濕之邪。最易侵犯太陰。故邪入之。從寒化者多。從熱化者少。(少陰) 少陰標陰而本陽。凡眞陽素旺之人。外邪傳入。則挾火而動。眞陽素虛者。則挾水而動。(厥陰) 陰盡陽生之臟。邪犯之多。陰陽錯雜。寒熱不定。

診斷 (太陽) 風寒外束。必頭項強痛。惡寒發熱。惟傷風則時有微汗。而能

食。脈浮緩。傷寒則壯熱無汗。不能食。脈浮緊。若頭身疼痛。發熱惡寒。不汗出而煩躁者。則風寒兩傷。入腑有蓄水蓄血之別。少腹滿口渴。小便不利者。爲蓄水症。少腹硬滿。小便自利者。爲蓄血症。(陽明) 前額眼眶脹痛。

鼻築築而流清。發熱不惡寒。此邪中陽明之經。口燥心煩。汗出惡熱。渴欲飲冷。此熱邪漸入陽明之裏。張目不眠。聲音响亮。口臭氣粗。身輕惡熱。大便閉結。此邪實陽明之府。若胃實腹滿而拒按。大便不行。詰語舌苔乾燥。則病勢劇。(少陽)邪在少陽之經。爲頭痛在側。耳聾善嘔。不欲食。胸脇滿。往來寒熱。小便不利。在腑爲口苦咽乾。目眩自利。若更兼少腹痛不大便。則爲少陽陽明合病矣。(太陰)腹滿而吐。食不下。時腹自痛。自利不渴。手足自溫。此太陰本病也。有陽明而見裏症者。則必腹滿時減。減不足言。(少陰)挾火而動者。必見心煩不眠。肌膚燄燥。神氣衰減。小便短而咽中乾等症。挾水而動者。必見目瞑倦臥。聲低息微。少氣嬾言。身重惡寒。四肢厥逆。腹痛泄瀉等症。(厥陰)張目不眠。聲音响亮。口臭氣粗。身輕惡熱。熱深厥深。上攻爲喉痹。下攻便膿血。此屬純陽症。四肢厥冷。爪甲青

黑腹中拘急。下利清穀。嘔吐酸苦。此屬純陰症。腹中急痛。吐利厥逆。心中煩熱。頻喜冷飲。飲下卽吐。煩渴轉增。腹痛加劇。此屬陰陽錯雜症。

治療

（太陽）傷風宜桂枝湯。傷寒宜麻黃湯。風寒兩傷宜大青龍湯。蓄水宜五苓散。蓄血宜桃仁承氣湯。（陽明）宜葛根湯以解其表。白虎湯以徹其熱。三承氣湯以酌病之輕重而蕩其實。（少陽）解在經之邪。宜小柴胡湯。解在腑之邪。宜黃芩湯。解少陽陽明合病之邪。宜大柴胡湯。（太陰）以溫運爲主。宜理中湯。或加附子。（少陰）清熱宜黃連阿膠湯。溫寒宜四逆湯。（厥陰）熱者宜四逆散。寒者宜四逆湯。錯雜者寒熱互投。宜烏梅丸。

經驗 太陽病遇陽氣虛者。過發其汗。易致亡陽。若誤下則發于陽者成結胸。發于陰者成痞氣。體弱陽衰者成臟結。皆所謂壞病也。少陰病而治不如

法則陰傷火旺。舌紅焦乾。下利清水。陰津有立涸之勢。其有氣高喘促。頭汗如珠者。爲垂絕之候。厥陰病傳變錯雜。須視其厥與熱是否平均。如厥三日熱亦三日。漸至熱多厥少者。易愈。否則爲病進。總之傷寒一症。表裏寒熱虛實。無一不有。變化萬端。首須辨症精確。次須用藥貼切。庶不遷移時日。釀成棘手。此伯未十年來經驗所得。敢以忠告醫家而貢獻于病家者也。

暑病——分中暑伏暑暑厥三大症

原因

（中暑）暑爲熱邪。多由太陽而入。陽明其應。最易耗氣傷津。津氣兩竭。勢必內燔。（伏暑）先受暑氣。繼爲風寒所閉。漸之入內。伏于三焦腸胃之間。或秋或冬。久而始發。（暑厥）暑穢熏蒸。鬱遏于內。閉塞孔竅。頓失知覺。此暑厥之所由。若忽然中暑。頓時神識昏迷。名曰暑迷。似厥而實。

非厥也。

診斷 (中暑) 身熱或微惡寒。汗出而喘。煩渴多言。倦怠少氣。脈虛數。兼風

則發熱惡寒。身體疼痛。兼濕則身熱疼重。胸悶妄言多汗。(伏暑) 頭痛
皖悶。漸至唇燥齒乾。內熱煩冤。或霍亂吐瀉。或腹痛下痢。或瘧疾寒熱。(暑厥) 四肢逆冷。面垢齒燥。小便不通。神志昏冒。脈滑而數。暑迷則昏迷不省。欲睡嬾言。手足或亦厥逆。惟不若厥之勢急耳。

治療 (中暑) 宜白虎加人參湯。暑風宜黃連香薷飲。暑濕宜一物瓜蒂散

吐之。(伏暑) 宜黃連清膈丸。見霍亂用藿香正氣散。見痢下用木香交
加飲。見瘧疾用小柴胡湯加香薷黃連竹葉。(暑厥) 先牛黃丸至寶丹
等芳香利竅。神甦後用生地麥冬玄參連翹心竹葉心等清之。暑迷先用
星香湯加香薷。神甦後用香薷飲。急則治標。乃不易之法也。

經驗 中暑一症。起暴而勢急。延誤則邪陷而神昏。發汗則奪津而寒甚。數下

則劫津而淋甚。暑迷過服寒涼。必至吐利不止。煩躁多渴。外熱內寒。狀如陰盛格陽。若再誤投寒劑。其命立傾。慎之慎之。

■ 欬嗽——分風寒痰熱虛勞痰飲四大症

原因 (風寒) 風寒外襲。內入于肺。肺氣不清。上逆而欬。(痰熱) 風熱傷

肺。煎熬津液。鍛鍊成痰。火動陽升。乃爲欬嗽。多生于春夏病溫及陽旺陰虛之人。(虛勞) 水涸金枯。肺苦于燥。燥則喉癢而欬。(痰飲) 脾胃陽衰。形寒飲冷。水穀不化精微。而爲痰飲。漬之于肺。乃爲欬嗽。或受風寒。其發更甚。

診斷

(風寒) 欬吐痰濁。白稠而爽。形寒頭痛。胸悶納少。鼻流清涕。脈象浮滑。舌苔薄白或微膩。(痰熱) 欬嗽發熱。痰粘不爽。或黃膩如膿。口乾欲

飲胸悶心煩脈浮數舌苔黃（虛勞）欬嗽無痰音低息短內熱口渴形質消瘦納穀減少脈象細數或弦數舌絳或薄黃每由吐血而來其病久其病深（痰飲）欬嗽形寒咯痰甚多目眩胸悶甚則氣急或胸背之間一處作冷。

治療（風寒）宜疎風化痰杏蘇散金沸草散等（痰熱）宜清熱化痰桑菊飲清肺飲等（虛勞）初宜輕清泄熱桑菊銀翹皆可借用久不愈宜補肺阿膠湯人參清肺湯等（痰飲）宜溫化滯濁桂苓朮甘湯小青龍湯等。

經驗 久欬總以能食爲佳。而于虛勞欬嗽尤宜注意。否則土不生金。音嘶便溏。必爲不治之症。而用藥尤宜靜不宜動。苦寒敗胃非所宜。辛溫耗氣亦所禁。而有一見久欬。肆用滋膩補肺。卒至不起。尤爲習見。伯未曾苦口開。

導。無肯從者。其所謂抵死不悟。殆命也夫。

■ 瘧疾——分正瘧、痺瘧、寒瘧、瘧母四大症

原因 (正瘧) 夏暑內伏。秋涼外束。邪踞於內。陰陽相搏。一日一作者爲單日瘧。間日一作者爲間日瘧。三日一作者爲三陰瘧。(痺瘧) 由于邪氣內藏。陰氣先傷。陽氣獨發。(寒瘧) 暑月乘涼沐浴。感受寒邪。伏于太陰。不能外出。而與陽爭。(瘧母) 久瘧不愈。瘧邪挾瘀血痰濕凝結成塊。伏于脇下。

診斷 (正瘧) 寒熱往來。發有定時。頭痛胸悶。口苦納少。小溲渾黃。脈象見

弦。(痺瘧) 熱多寒少。或但熱不寒。骨節煩疼。肌肉消燦。汗出頭痛如破。煩渴而嘔。脈弦數。(寒瘧) 多寒少熱。或但寒無熱。膈背頭項疼痛。無汗。脈弦遲。(瘧母) 寒熱間作。或不作。少食。痞悶有塊。結于左脇硬痛。