

丹溪先生心法

附錄

四



丹溪先生心法

附錄

(四)

朱震亨撰
程充編訂

叢書集成初編

(補印本)

丹溪先生心法

附錄
四冊

一九三九年十二月初版

一九六〇年一月補印

朱震亨撰

程充編訂

商務印書館出版

上海市印刷六廠印刷

丹溪先生心法卷五

癰疽八十五

○癰疽只是熱勝血。六陽經。六陰經。有多氣少血者。有少氣多血者。有多氣多血者。不可一概論也。若夫要害處近虛怯薄處。前哲已曾論及。惟分經之言未聞。諸經惟少陽厥陰經生癰疽。理宜預防。以其多氣少血。肌肉難長。瘡久未合。必成死症。遽用驅毒利藥。以伐其陰分之血。禍不旋踵。陽滯於陰。脈浮洪弦數。陰滯於陽。脈沉細弱。陽滯以寒治之。陰滯以熱治之。人中年以後。不可生癰。纔有痛腫。參之脈證。但見虛弱。便與滋補氣血。可保終吉。若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥。虛虛之禍。如指諸掌。內托之法。河間治腫。焮于外。根盤不深。形證在表。其脈多浮。病在皮肉。非氣盛則必侵於內。急須內托以救其裏。宜復煎散。除溫散鬱。使胃氣和平。如或未已。再煎半料飲之。如大便秘及煩熱。少服黃連湯。如微利及煩熱已退却。與復煎散半兩。如此。使榮衛俱行。邪氣不能內傷也。然世俗多用排膿內補十宣散。若用之於此。小瘡與冬月時令。即可若潰瘍於夏月用之。其桂朴之溫散。佐以防風。白芷。吾恐雖有參芪。難爲倚杖。一婦年七十。形實性急。而好酒。腦生疽。纔五日。脈緊急且瀉。急用大黃酒煨細切。酒拌炒爲末。又酒拌人參炒入姜煎。調一錢重。又兩時再與得睡。而上半身汗。睡覺病已失。此內托之意。又一男子。年五十。形實色黑。背生紅腫。及胛骨下痛。其脈浮數而洪緊。食亦嘔。正冬月。與麻黃桂枝湯加酒黃柏。生附。瓜蒌子。

甘草節、羌活、青皮、人參、黃芩、半夏、生薑六貼而消。此正內托之法。非精要內托散乳香、萊菔等藥。想此方專爲服丹石而發疽者設。不因丹石而發。恐非必用之劑。瘡先發爲腫。氣血鬱積。蒸肉爲膿。故其痛多少。瘡之始作時也。膿潰之後。腫退肌寬。痛必漸減。而反痛者。此爲虛。宜補。亦有穢氣所觸。宜和解。風寒逼者。宜溫散。

○腸癰。大腸有痰積。死血流注。桃仁承氣湯加連翹、秦艽。近肛門破入風者。難治。防風之類。

○乳癰。乳房陽明所經。乳頭厥陰所屬。乳子之母。不知調養。怒忿所逆。鬱悶所遏。厚味所釀。以致厥陰之氣不行。故竅不得通。而汁不得出。陽明之血沸騰。故熱甚而化膿。亦有所乳之子。膈有滯痰。口氣噤熱。合乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。便須忍痛。揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成癰癤。治法。踈厥陰之滯。以青皮、清陽明之熱。細研石膏。行汗濁之血。以生甘草之節。消腫導毒。以瓜蒌子或加沒藥、青橘葉、皂角刺、金銀花。常歸。或湯或散。或加減。隨意消息。然須以少酒佐之。若加以艾火。兩三壯於腫處。其効尤捷。不可輒用針刀。必至危困。若不得於夫。不得於舅姑。憂怒鬱悶。昕夕積累。脾氣消阻。肝氣橫逆。遂成隱核。如大棋子。不痛不痒。數十年後。方爲瘡陷。名曰妳岩。以其瘡形嵌凹似岩穴也。不可治矣。若於始生之際。便能消釋病根。使心清神安。然後施之治法。亦有可安之理。

乳癰方

青皮

瓜蒌

橘葉

連翹

桃仁

皂角刺

甘草節破多加參芪

右以水煎入酒服。

乳癰妳勞焮腫

石膏煨

樺皮燒

瓜蒌子

甘草節

青皮

右以水煎服。

治乳有核

南星

貝母

甘草節

瓜蒌各一兩

連翹半兩

右以水煎入酒服。

又方

人參

黃芪

川芎

當歸

青皮

連翹

瓜蒌

白芍

甘草節

乳岩小破加柴胡、川芎。

右以水煎入酒服。

乳硬痛

沒藥一錢

甘草三錢

當歸三錢

右作一服。水煎。入酒少許。熱飲。

吹妳

金銀花

大蕎麥

紫葛藤等分

右以醋煎。洗患處立消。如無下二物。只金銀花亦可。

乳栗破 少有破必大補

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

連翹

白芍

甘草節

右以水煎服。

附骨癰

熱在血分之極。細初覺。先以青皮、甘草節。後破當養血。初腿腫。以人參、黃連、茯苓各二錢。瓜蒌子四十粒。作二貼。入竹瀝。熱飲之。

治環跳穴痛不已。防生附骨疽。

以蒼朮佐黃柏之辛。行以青皮。冬月加桂枝。夏月加條子。芩。體虛者加牛膝。以生甘草爲使。大料煎入。

姜汁帶辣。食前飲之。病深者恐尤。柏桂枝十數貼發不動。加少麻黃。二三貼又不動。恐癰將成矣。急掘地坑。以火煨紅。沃以小便。赤體坐其上。以被席圍抱下截。使熱氣重蒸。腠理開。氣血暢而愈。

鐵圍散 治癰疽腫毒。

乳香

沒藥半兩

大黃

黃柏

黃連

南星

半夏

防風

皂角刺

木鱉子

瓜蒌

甘草節

草烏

阿膠

右爲末。醋調成膏。砂石器內火熬黑色。鵝翎傳之。

圍藥 諸般癰疽。傳上消散。

乳香

沒藥

大黃

連翹

黃芩

黃連

黃柏

南星

半夏

防風

羌活

瓜蒌

阿膠

皂角刺

右研爲細末。好醋煎黑色成膏。寒者熱用。熱者寒用。

圍藥鉄井欄

貝母

南星各七錢

連翹

五倍子

經霜芙蓉葉各一兩

右碾爲細末。用水調傅四向腫處。止留中間一竅出毒氣。

隔皮取膿法

驢蹄細切一兩

蕎麥麵一兩

白鹽半兩

草烏四錢。去皮

右爲末。水調作餅子。慢火炙微黃色。出火毒。研末。醋調成膏。用白紙攤貼患處。水自毛孔而出。其腫自退。

騎馬癰

用大粉草帶節四兩。長流水一碗。以甘草淬焙水盡爲末。入皂角炭少許。作四服。湯調頓服效。

又方

甘草節、白芷、黃連。破者龍骨、枯礬、赤石脂併用。

敷疽癰方

草烏

黃連

紫荊皮

白芷

大黃

芙蓉皮

朴硝

粳米各等分

右爲末。蜜水調敷。如瘡盛。以蜜調雄黃末。圍定瘡穴。大小前後敷前藥末。

一人肛門生癰久不收口有針竅三孔勞力則有膿

黃芪

條芩

連翹

秦艽

右爲末神麴糊爲丸

取朽骨久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脰骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子

大黃

乳香

沒藥

當歸五分

瓜蒌仁三錢

代赭石一錢

右作一服煎

又方

木鱉子

大黃

瓜蒌

桃仁

草龍膽

右咬咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方白殭蚕槐花爲末酒調服一方加酒大黃

【附方】

消毒飲 治便毒初發三四日可消。

皂角刺

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草節

瓜蒌仁等分

右咬咀。水酒各半煎。食前溫服。仍頻提掣頂中髮立效。

機要內托復煎散 癰疽托裏健胃。

地骨皮

黃芩

茯苓

白芍

人參

黃芪

白朮

桂

甘草

防己

當歸各一兩

防風三兩

右咬咀。先以蒼朮一斤。水五升。煎至三升。去朮。入前十二味。再煎至三四盞。取清汁。分三四次。終日飲之。又煎蒼朮粗爲湯。去粗。依前又煎前十二味粗。分飲之。

內疎黃連湯 治瘡皮色腫硬發熱而嘔。大便閉。脈洪實者。

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

甘草各一兩

連翹二兩

大黃二兩半

右咬咀。每服一兩。入姜煎。

疔癰八十六

○疔癰。用針刀鏟破頭上。以蟾酥敷之。後用菉豆。野菊。莎末。酒調飲。醉睡。覺卽定痛。熱除。不必去疔。自愈也。治一切疔瘡。用紫梗。菊花根。莖葉皆可。研碎。取汁。滴口中飲之。○癰癰。血氣痰熱。以牡礪煨過爲末。玄參。搗膏爲丸。○桑椹。黑熟者。搗汁。熬膏。湯調服。紅者。晒干爲末。湯調服。○師云。大田螺。連肉。燒灰。存性。爲末。入麝香。少許。濕則乾敷。乾則油調敷。夏枯草。大能散結氣。而有補養血脈之功。能退寒熱。虛者儘可倚仗。若實者。以行散之藥佐之。外施艾灸。亦漸取效。

【入方】 治癰癰

海藻洗去砂土。晒干。

昆布揉去土。同上二味。先研爲末。

何首烏。木曰搗爲末。

皂角刺炒令黃色。

公蛇退樹上。或牆上是雄。用一條。平地上者是雌。

右五味爲細末。和勻一處。豬項下刀口肉燒熟。醮前藥末喫。食後倒患處眠一伏時。每核灸七壯。口中覺烟起爲度。膿盡卽安。初生起時。灸曲池。男左女右。

【附方】

寶鑑保生挺子 治疔瘡。背疽。癰癰。一切惡瘡。

金脚信

雄黃

礪砂各二錢。

麝一錢。

輕粉半大匣半大盞 巴豆四十九粒文武火炒研

右爲極細末用黃蠟五錢溶開將藥和成挺子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如銀眼大將瘡頭撥開安一餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏 治一切惡瘡

當歸

藥本各半兩

沒藥二錢

黃丹

黃蠟各二兩

乳香二錢

琥珀二錢半

膽礬

粉霜各一錢

白膠香二兩

清油二斤

木鱉子五十箇去皮

巴豆十五箇去殼

槐枝

柳枝各一百二十條

右作一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥熬至焦黑亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立效

千金托裏散 治疔瘡發背一切惡腫

官桂

人參

甘草

川芎

白芷

芍藥各一兩

木香

沒藥各三錢

乳香二錢

當歸半兩

連翹一兩二錢

黃芪一兩半

防風

桔梗

厚朴各二兩

右十五味爲細末。每服三錢。酒一大盞。煎三二沸。和粗溫服。無時。
破棺丹 治瘡腫一切風熱。

大黃二兩。半生半熟。芒硝。

甘草各一兩。

右爲末。煉蜜丸如彈子大。每服半丸。食後茶清溫酒任化下。童便半盞研化服。亦得。忌冷水。
太乙膏 治癰子瘡神效。

腦子一錢。研。

輕粉。

乳香各二錢。研。

麝香三錢。研。

沒藥四錢。研。

黃丹五兩。

右用清油一斤。先下黃丹熬。用柳枝攪。又用葱兒葱七枝。先下一枝熬焦。再下一枝。葱盡爲度。下火不住。手攪。觀冷熱得所。入腦子等藥攪勻。磁器盛之。用時旋攤。
尅効散 治癰子瘡。

官桂。

硃砂各半錢。

赤小豆。

粳米各四十九粒。

班貓四十九箇。不去翅足。

右五味。研爲末。初服一字。次服二字。次服三字。次服四字。煎商陸根湯送下。空心服。小便淋瀝爲效。如惡心嘔吐黃水。無妨。癰癰日日自消矣。

玉燭散 治癰癰和血通經。服之自消。日進一服。七八日取效。方見婦人類。

東垣升陽調經湯

治癰癤遠頸。或至頰車。此皆出足陽明胃經中來。若瘡深遠隱曲肉底。是足少陰腎經中來。乃戊脾傳於癸腎。是夫傳與妻。俱作塊子。堅硬大小不等。並皆治之。或作丸亦可。

升麻八錢

葛根

草龍膽酒製

酒芩

莪朮酒洗炒

三稜酒炒

甘草炙

黃連酒洗

連翹

桔梗已上各五錢

生黃芩四錢

歸梢

芍藥各三錢

黃柏酒炒二錢

知母酒洗炒一兩

右另秤一半作末。煉蜜爲丸。菹豆大。每服百餘丸。一半作咬咀。每服五錢。若能食。大便硬。可旋加至七八錢。水二盞。先浸半日。煎至一盞。去粗。臨臥熱服。足高去枕仰臥。噙一口。作十次嚥下。留一口在後送下。丸藥服畢。其臥如常。

金湯疳癰諸瘡八十七

金瘡 五倍子、紫蘇等分

又方 白膠香三錢、龍骨一錢

金瘡狗咬

五月五日午時。用陳石灰一斤。搗爲末。韭一斤。搗汁。和成餅。陰乾爲細末。敷之。

治陽證腫毒并金瘡

大粉草剉細用竹筒一段割去青兩頭留節上開一竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從立冬日放糞缸內待立春先一日取起豎立在有風無日陰處二十一日多最好却破竹取草爲細末用傅金瘡乾者水調

火燒

桐油二錢

水二錢

右二件以桃柳枝不住手攪成膏再入少水溶外用貓兒肚底毛細剪摻上

湯澆以淋了茅三次灰粗付患處

湯火瘡臘月豬膽塗黃柏炙乾爲末付之

膿瘡

乳香

沒藥

水銀

當歸各半兩

川芎

貝母

黃丹二錢半

真麻油五兩

右咬咀除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去粗下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨生用。

血竭

赤石脂共一兩。

頭髮如指大。

黃蠟一兩。

白膠香

香油不拘多少。

右件先以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箸貼在外三日後番過再貼仍服活血藥。

又方

用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將葉貼瘡上日換二次。

又方

以頭垢燒灰和棗肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉搽上却以前膏雨傘紙攤貼之。

又方

地骨皮一兩。

白蠟半兩。

甘草節半兩。

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去粗入黃丹一兩半緊火熬黑提起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎過以藥貼之。

杖瘡疼

黃柏生地黃紫荊皮皆要藥熱血作痛涼血去瘀血爲先須下鷄鳴散之類。生地黄黃柏爲末童便調付或加菲汁不破者以菲菜葱頭春碎炒熱貼冷則易膏藥紫荊皮乳香沒藥生地黄。