


衛生家寶產科備要

二



衛生家寶產科備要

(二)

朱端章編

叢書集成初編

(補印本)

產育寶慶集及其他一種

二 冊

一九三九年十二月初版
一九六〇年一月補印

商務印書館出版

上海市印刷六廠印刷

衛生家寶產科備要卷第四

產育保慶集方。余收產論二十一篇。議論精確。無所不究。蓋國醫博極方書所得之妙。惜乎其說而無其方。郭君稽中爲時良醫。尤長於治產。故其切脈用藥。屢取奇功。一日願以所收家方。附於諸論之末。遂編爲一集。真濟衆之異書也。古人謂爲人子而不學醫者爲不孝。則有方論而不傳於世者。其可謂之仁哉。大觀三年九月五日濮陽李師聖述。

二十一論并增入十八論。

李師聖編論。郭稽中附方。

第一論曰。熱疾胎死腹中者何。

答曰。因母患熱疾。至六七日以後。臟腑熱極。薰蒸其胎。是以致死。緣兒死身冷。不能自出。但服黑神散。煖其胎。須臾胎氣溫煖。卽自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者。是其驗。黑神散方。

●黑神散

桂去蘆皮。不見火。剉碎。

當歸洗去蘆須。切。焙。

芍藥洗。

甘草炙。

生乾地黃溫湯洗淨。剉。焙。忌冷水。

乾薑用。

炒生薑代之。各一兩。附子半兩。兩。炮去皮。

雄黑豆二兩。小者是。炒。焦去皮。

右爲末。每服一錢匕。空心溫酒調下。

●蒲黃黑神散

此方十八論云。產前產後一切疾。皆治之。

雄黑豆二兩

小者是。炒去皮。秤。

當歸

洗去蘆并須。切。焙。

芍藥

洗。剉。

甘草

炙。

乾薑

炮。

肉桂

去皮。剉。不見火。

生乾地黄

溫湯洗。剉。焙。忌冷水。

蒲黃

銀石器內微炒令赤。或以紙襯銚子內。炒紙黃爲度。

各一兩

右爲末。每服二錢。空心溫酒調下。若三十已下及生產少婦人。不用桂。乾薑入炒生薑。紅花代之。生薑。

紅花各用二兩。經洗者。並焙乾。

第二論曰。胎衣不下者何。

答曰。母生子訖。血流入衣中。衣爲血所脹。是故不得下。治之稍緩。脹滿腹中。漸次上衝。心胃疼痛。喘急者。難治。但服奪命丹。以速去衣中之血。血散脹消。胎衣自下而無所患。

●奪命丹

附子半兩

炮去皮。臍切。

牡丹皮一兩

洗。剉。

乾漆一分

搗碎。炒。煙盡。

右爲末。釀醋一升。大黃末一兩。同熬成膏。和藥如桐子大。溫酒下五七圓。不以時候。

又十論云。但服蒲黃黑神散。逐去衣中血。卽胎下。或帶斷亦同。

第三論曰。難產者何。

答曰。胎側有成形塊。呼爲兒枕。子欲生時。枕破。與敗血裹其子。故難產。但服勝金散。逐其敗血。卽自生成。若逆生。橫生。並皆主之。

●勝金散

麝香一錢。先研爲細末。

鹽鼓一兩。用舊青布裹了。燒令通紅。急以乳槌研爲末。

右爲末。取秤搥燒紅。以酒淬之。調下藥一錢匕。

又十八論云。但服蒲黃黑神散。解其敗血。卽自生也。或橫生。逆生。胎衣不下。此藥悉治。

第四論曰。產後血運者何。

答曰。產後氣血暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者。令人悶絕。不知人。口噤。神昏。氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此治之。病必難愈。但服清魂散自瘥。

●清魂散

澤蘭葉。揀淨。

人參。去蘆。

各一分。

荊芥穗一兩。嘴。

芎半兩。洗。

甘草二錢。炙。

右爲細末。每服一錢匕。熱湯溫酒各小半盞調勻。急灌之下。咽喉卽開。眼氣定。省人事。

又十八論云。但服蒲黃黑神散自瘥。

第五論曰。產後口乾痞悶者何。

答曰。產後宮胃大虛。血氣未定。食麵太早。胃不能消化。麵毒結聚於胃脘。上薰胃中。是以口乾。煩渴。心下痞悶。醫者不識。認爲胃膈壅滯。以藥下之。萬不得一。但服見睨圓自瘥。

●見睨圓

薑黃片子者。剉。

荊三稜煨。乘熱。剉。焙乾用。

萆澄茄不得用。火炒。

陳皮去白。

高良薑剉碎。

人參去蘆。切片。

蓬莪茂煨。乘熱。剉。焙乾用。

右七味等分爲末。用細切蘿蔔。慢火煮令爛。研細。將汁煮糊。圓梧桐子大。每服三十圓。蘿蔔湯下。不以時候。

又十八論云。但服蒲黃黑神散。自瘥。

第六論曰。產後乍寒乍熱者何。

答曰。陰陽不和。敗血不散。皆令乍寒乍熱。產後血氣虛損。陰陽不和。陰勝則乍寒。陽勝則乍熱。陰陽相乘。則或寒或熱。若因產勞傷臟腑。血弱不得宣越。故令血敗不散。入於肺則熱。入於脾則寒。醫人若誤作瘧疾治之。則繆矣。陰陽不和。宜增損四物湯。敗血不散。宜奪命丹。

又問二者何以別之。

答曰。時有刺痛者。敗血也。但寒熱無它證者。陰陽不和也。

●增損四物湯

當歸洗去土并蘆。須切。焙。

芍藥洗。

人參去蘆。切片。

川芎洗。

各一兩。

甘草四錢。炙。

乾薑一兩。

宜用生薑代之。

右爲末。每服二錢匕。水一盞。生薑五片。同煎六分。去滓。微熱服。不以時候。

奪命丹見第二論。

又十八論云。但服蒲黃黑神散自瘥。

第七論曰。產後四肢虛腫者何。

答曰。產後敗血乘虛停積於五臟。循經流入於四肢。留淫日深。卻還不得。腐壞如水。故令四肢面目浮腫。醫人不識。便作水氣治之。血氣與水氣不同。凡治水氣。多用導水藥。極虛之。夫產後既虛。又以藥虛之。是謂重虛。往往因致夭枉。但服調經散。血行腫消即愈。

●調經散

沒藥另研

琥珀研

各一錢

桂去露皮。不見火。剉。

芍藥赤者。洗。剉。

當歸去蘆須。切。

各一錢

細辛

去葉。剉。

麝香研

各半錢

右爲末。每服半錢匕。生薑汁。溫酒各少許。調勻服之。

又十八論云。但服蒲黃黑神散後服轉藥。瀉下惡物自瘥。轉藥是黑神圓。在第十二論後。

第八論曰。產後乍見鬼神者何。

答曰。心主身之血脈。因產傷耗血脈。心氣則虛。敗血停積。上干於心。心不受觸。遂致心中煩躁。臥起不安。乍見鬼神。言語顛倒。醫工不識。呼爲風邪。如此治之。必不得愈。但服調經散。每服加生龍腦一捻。得睡即安。方見第七論。

又十八論云。但服蒲黃黑神散。自安。

第九論曰。產後月內不語者何。

答曰。人心有七孔三毛。產後血虛氣弱。多致停積。敗血閉於心竅。神志不能明了。又心氣通於舌。心氣閉塞。則舌亦強矣。故令不語。如此。但服七珍散。即瘥。

●七珍散

人參去蘆切片

石菖蒲節密者剉

川芎洗剉焙

熟乾地黃各一兩

細辛一錢去葉

防風去苗剉

朱砂研 各半兩

右爲末。每服一錢。薄荷湯調下。不以時候。

又十八論云。但服蒲黃黑神散便安。

第十論曰。產後腹痛。又瀉痢者何。

答曰。產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲冷當風。則寒邪乘虛進襲。留於盲膜。散於腹脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水穀不化。洞泄腸鳴。或下赤白。腹脇脹。或走痛不定。急服調中湯立愈。若醫者以爲積滯取之。則禍不旋踵。謹之謹之。

●調中湯

高良薑剉油炒

當歸洗去蘆須切焙

桂去皮剉不見火

白芍藥洗剉

附子炮去皮臍

川芎洗 各一

兩。甘草半兩。炙，剉。

右爲麤末。每服三錢。用水三盞。煎至一盞。去滓熱服。

又十八論云。急服蒲黃黑神散。後服調中湯。

第十一論曰。產後遍身疼痛者何。

答曰。產後百節開張。血脈流走。遇氣弱則經絡分肉之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脈引急。故腰背不得轉側。手脚不能動搖。身熱頭痛。若醫以爲傷寒治之。則汗出而筋脈動。手足厥冷。變生他病。但服趁痛散。以嘿除之。

●趁痛散

牛膝切。酒浸一宿。控乾。慢火炒。焙。

當歸去蘆須。先切。焙。

白朮剉碎。焙乾。

黃耆蜜炙。剉。

桂去皮。不見火。剉。

獨活

去蘆。剉。川中者尤佳。

生薑切。

各半兩。

薤白洗。切。剉。

甘草炙。剉。

各一分。

右爲麤末。每服半兩。水五盞。煎至兩盞。去滓。熱服一盞。次一盞。續後再煖服。不拘時候。

又十八論云。但服蒲黃黑神散即愈。

第十二論曰。產後大便秘澀者何。

答曰。產後水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便秘澀不通也。若過五六日。腹中悶脹者。此有燥糞在臟腑。以其乾澀未能出耳。宜服麻仁圓以津潤之。若誤以爲有熱而投之以寒藥。則陽消陰長。變動百出。

性命危矣。

●麻仁圓

麻仁研碎

枳殼去穢剉。微黃。

人參去蘆切片。

大黃煨。各半兩。

右爲末。煉蜜圓。桐子大。空心溫湯下二十圓。未通加圓數。

又十八論云。產後小使出血。大便澀痛者何。

答曰。敗血流入大小腸。大小腸澀滯。致小便澀寒。大便艱難。人多不識。作五淋治之。不愈。但服蒲黃黑神

散。後服黑神圓。取下惡物即安。

●黑神圓

巴豆

去皮。以水二碗。煮盡爲度。去心膜。細研。去油。

黑附子炮去皮臍切片。

肉桂去皮。不見火。

白乾薑炮。各半兩。

右爲末。麵糊圓如蘿蔔子大。每服三圓至五圓。熱茶下。再以熱茶投之。即行。前第七論中云轉藥者。即

是此方。切不可服尋常取積藥。

第十三論曰。產後血崩者何。

答曰。產後傷耗經脈。未得平復。而勞役損動。致血暴崩下。淋瀝不止。或因鹹酸不節。傷蠱榮衛。氣衰血弱。

亦變崩中。若小腹滿痛。肝經已壞爲難治。急服固經圓以止。

●固經圓

艾葉揀淨，剉碎，炒黃。

赤石脂

補骨脂略炒，香。

木賊去根，節。

各半兩。

附子一枚，炮，去皮，臍，切片。

右爲末。陳米飲和圓桐子大。食前溫酒下二十圓。米飲亦得。如陳米飲難圓。卽入雪糕少許搜和。卽易圓也。

又十八論云。但服蒲黃黑神散及黑神圓立瘥。

第十四論曰。產後腹脹悶滿。嘔吐不定者何。

答曰。敗血散於脾胃。脾受之。不能運化精微而成腹脹。胃受之。則不得受納水穀而生吐噎。醫者不識。若以尋常治脹止吐藥療之。病與藥不相干。轉更傷動正氣。疾愈難治。但服巨勝湯必瘥。

●巨勝湯

赤芍藥洗，剉。

半夏湯洗七次，切碎。

澤蘭葉洗，噉。

人參去蘆，切片。

陳皮去白。

甘草炙，剉。各一錢。

生薑半兩。

右爲麤末。用水一椀。同煎至兩盞。去滓。微熱分三服。

又十八論云。急服蒲黃黑神散。次服黑神圓。吐出惡物卽安。

第十五論曰。產後口鼻黑氣起及鼻衄者何。

答曰。陽明者。經脈之海。起於鼻。交頤中。還出俠口。交人中。左之右。右之左。產後氣消。血散。榮衛不理。散亂入於諸經。卻還不得。故令口鼻黑起。及變鼻衄。此緣產後虛熱。變生此疾。其疾不可治。名曰胃絕肺敗。遇

有此疾。急取緋線一條。并產婦頂心髮兩條。繫兩中指上節。卽止。無藥可療。亦厭禳之一端也。

又十八論曰。產後口鼻黑氣起者何。

答曰。產後敗血入臟腑。既滿。衝於頭目。卻還不得。口乾。舌焦。鼻衄。黑氣。是產後熱變作此候。不可治也。名曰敗肺。

第十六論曰。產後喉中氣急喘者何。

答曰。榮者血也。衛者氣也。榮行脈中。衛行脈外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無所主。獨聚於肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。爲難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰於肺。亦令喘急。如此但服奪命丹。血去喘息自止。奪命丹方見第二論。

又十八論曰。產後喉中氣急喘者何。

答曰。產後敗血過於心。轉於喉中。此不可治也。

第十七論曰。產後中風若何。

答曰。產後五七日內。強力下牀。或一月之內。百日之中。傷於房室。或懷憂發怒。擾蕩冲和。或因灼艾。傷動臟腑。得病之初。眼澁。口噤。肌肉攣搐。以漸腰脊筋急。強直者。不可治。此乃人作。非偶爾中風所得也。

第十八論曰。產後心痛者何。

答曰。心者血之主。人有伏宿寒。因產大虛。寒搏於血。血凝不得消散。其氣逆上。衝擊於心之絡脈。故心痛。

但以大巖蜜湯治之。寒去則血脈溫而經絡通。心痛自止。若誤以爲有所傷療之。則虛極寒益甚矣。心絡寒甚。傳心之正經。則變爲真心痛。真心痛者。朝發夕死。夕發朝死。藥不可輕用如此。

●大巖蜜湯方

熟乾地黄洗。酒浸一宿。剉用。

當歸洗。去蘆須。切。

吳茱萸揀去枝梗。

獨活洗。蜀中者尤佳。

芍藥洗。

乾薑炮。

甘草炙。

桂去皮。剉。不見火。

小草遠志。葉。

各一兩。

細辛半兩。

去葉。勿用馬蹄香。

右爲釐末。每服半兩。用水三大盞。煎一盞。去滓。再入蜜一匙。又同煎三兩沸。微熱服。食前。

第十九論曰。產後熱悶。氣上轉爲脚氣者何。

答曰。產後血虛生熱。復因春夏取涼過多。地之蒸濕。因足履之。所以着而爲脚氣之疾。其狀熱悶掣癢。驚悸。心煩。嘔吐氣上。皆其候也。服小續命湯兩三劑。必愈。若醫者誤以逐敗血藥攻之。則血去而疾益增劇。

●小續命湯

人參去蘆。切片。

黃芩炙。如錐者。

桂去蘆皮。不見火。

麻黃節。去。

防己剉。碎。

川芎洗。剉。

芍藥洗。

甘草炙。

白朮剉。

各一兩。

附子一箇。

去皮。臍。

防風一兩半。

去苗。

生薑五兩。

洗。去皮。切。

右爲釐散。每服半兩。用水三大盞。煎至一盞。去滓。溫服。

第二十論。產後汗出多而變痙風者何。

答曰。產後血虛。肉理不密。故多汗。因遇風邪搏之。則變痙風也。痙者。口噤不開。背強而直。如發癘狀。搖頭。

馬鳴身反折須臾復發氣息如絕宜速斡口灌小續命湯稍緩卽汗出如雨手拭不及者不可治此方不特治產婦凡男女偶中此疾急以此藥灌之無不愈也或服它藥則不及矣

第二十一論曰產後所下過多虛極生風者何

答曰婦人以榮血爲主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命在須臾此但虛極生風也如此急服濟危上丹神良若以風藥治之則誤矣

●濟危上丹

乳香以竹葉盛又以竹葉覆上
熨斗略熨過卽研成末

五苓脂不夾石者研

硫黃研如粉

太陰玄精石研

陳皮去穢剉碎

桑寄生剉

阿膠剉碎同蛤粉炒炮起篩去蛤粉用

卷柏生用

各一兩

右將上四味同研勻石器內微用火炒動勿令焦炒了再研極細後入餘藥末用地黃汁打糊圓桐子大產後溫酒下二十圓當歸酒亦得

又十八論曰產後血氣逼肺上氣咳嗽多縱睡者何

答曰產後滿月血脈未通好食熱麵壅結成痰或有氣塊發時衝心心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾背膊痠疼睡夢驚狂體虛無力時有汗出心痛月候不來名曰敗癥腹痛遶臍面色微赤因此不療縱然得較三兩日又發急服黑神散立愈

凡產婦合要備急湯藥。並須預先修合題號。恐臨時倉卒難致。臨月忌勿多飲酒。即依產圖方位。擇深靜房室。八月一日即用借地法。於房內北壁薰令香潔。

論新生小兒

凡新生小兒。急以綿裹指頭。拭兒口中惡物。不爾流入腹中。後生諸疾。斷臍可長三寸。臍中若有蟲。急撥去。恐入腹內。綳了取生甘草寸餘。搥碎。水一合。煎濃汁。以綿包子。點兒口中。當吐出惡汁。盡半合無妨。又取細研朱砂末一字許。以熟蜜調置兒口中。令嘔之。去驚邪。三日湯煎虎頭骨少許。豬膽汁少許。和湯浴兒。少驚無瘡。令無惡疾。每日頻就無風明處看兒上腭。若有一點白泡如竹膜起處。速以指甲刮破。更生更去之。除灸臍帶外。則勿加火艾。恐成驚癇。若有冷熱夜啼。臍瘡不乾。變蒸諸疾。自別有方治之。今錄廬江劉寶助教經効小兒名方四道。

●注唇膏。治初生孩兒衆疾。療胎風病。

朱砂研細

坯子臙脂各一錢。

白殭蠶七箇。炒去絲

牛黃半錢。研

蝎梢半箇。

右白殭蠶蝎梢。用薄荷汁一合。重湯煮。汁盡爲度。焙乾爲細末。研入坯子朱砂等。生蜜和爲膏。逐日頻與孩兒注唇。令自吮嚙取効。

●豆蔻散。治小兒夏月滑瀉。冷痢不已。腹痛。瘦瘁。食下即噉。

肉豆蔻一箇。用餠餅麵一塊。如杏大。裹豆蔻。灰火中煨。不住攪轉。候色赤透熟。取出。剉。焙乾。

右爲細末。每服半大錢。七八歲至十歲者一錢。用溫米飲調下。日三服。一兩日間愈。

●蝎梢散。治小兒胎風。及百晬孩兒。臍風撮口。無能救療者。先用生腦子一字。填入臍心。上用艾炷灸一七壯。如不覺。灸二七壯。再添腦子大妙。候定服蝎梢散。

蝎梢四十九箇。用薄荷葉逐箇捲。以絲扎定。於砂銚中滾轉。炒令薄荷乾蘇爲度。

白殭蠶四十九箇。生薑汁浸。炒乾去觜。

右二味爲末。入生腦子抄半錢。麝香少許。研勻。用紫色雄雞肝煎湯。調下末半錢許。併三兩服愈。

●治小兒諸般驚喘疾。

烏雞卵一箇。輕粉少許。

右將雞卵於尖小一頭打小穴子。入輕粉在內。用杖子攪轉令勻。坐雞卵於飯上蒸熟訖。將與患者小兒喫。只一枚取効。

累用經効方 隆興府學諭張世臣方。

●大聖澤蘭散。治婦人血海虛冷。久無子息。及產後敗血衝心。中風口噤。子死腹中。擘開口灌藥。須臾生下。便得無恙。并治胎墮。腹中攻刺疼痛。橫生逆產。胎衣不下。血運血癖。血滯血崩。血入四肢。應血臟有患。及諸種風氣。或傷寒吐噤咳嗽。寒熱往來。遍身生瘡。頭痛惡心。經脈不調。赤白帶下。乳生惡氣。胎臟虛冷。數曾墮胎。崩中不止。因此成疾。及室女經脈不通。並宜服之。常服暖子宮。和血氣。悅顏色。退風冷。消除萬