

萬有文庫

第二集七百七種

王雲五主編

民族地理學

(下)

小牧實繁著

鄭震譯

商務印書館發行

民族地理學

(下)

小牧實繁著

鄭震譯

自然科學叢書

王雲五主編
萬有文庫
第二集七百種

民族地理學
二冊

版權所有翻印必究

中華民國二十五年三月初版

★ D 六三二

祥

原著者 小牧實繁

譯述者 鄭震

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

(本書校對者楊靜齋)

第二章 主要人種略述

本章就現今世界各地之主要人種，略述其分布地域及其人種的特徵等。

此際可採爲敘述之方法，大體有二，卽如前章所採用者。第一，人種分類，欲其全無缺點，雖不能；惟可擇其比較合理而妥當者，依此人種分類，換言之，依人種系統，人種羣之設定，亦卽依世界現存各人種之排列次序，而敘述其各種類之分布地域及其人種的特徵，此爲一法；其次，將世界分成若干大陸或依國界，敘述生存其處各人種之人種的特徵，此又一法也。今在本章，便宜上用前之方法敘述世界現存主要人種之分布地域並其人種的特徵。

此處成爲問題者卽謂採用如何分類之問題，本章亦如前章緒論所言及者，以向來之人種分類中最穩當且比較合理的哈頓氏之分類爲準。對彼學問之深博，此處無喋喋之必要，且彼並非如台拉氏之爲人種學門外漢，更無須辯解，彼所試行之人種分類，先考慮人種之地理的分布，就毛髮

性狀，鼻之闊狹，皮膚色等三類人種的標準，考慮其種種階段，設定三種之色度，人種標準，自然此外尚多，彼亦常不斷加以周密之注意；而爲便宜故，在此等標準之中，將毛髮性狀，作爲第一種的標準而採用之一點，甚顯特色。如此彼所試用世界人類主要集團之排列，可認爲現在世界人種分類中最穩健妥當且比較合理者，且又最得要領，故其嘗試發表後，立被譯成德文、法文，被稱爲現今世界最良之人種分類。此處特爲聲明。

彼將世界人種分類如次：

◎ ULOTRICHI.

ULOTRICHI ORIENTALES.

Very short, dark-skinned, meso-to low brachycephalic

Negrito (Andamanese, Semang, Aeta, tapiro).

Short or tall, dark-skinned, dolichocephalic.

Papuan, melanesian.

ULOTRICHI AFRICANI.

Very short, yellowish-skinned, mesocephalic.

Negrillo (Akka, Batwa, Bambuta, etc.)

Short, yellowish-skinned, mesocephalic.

Bushman, Hottentot.

Short or tall, dark-skinned, dolichocephalic.

Negro, Nilote, "Bantu."

◎ CYMOTRICHI.

I. DOLICHOCEPHALS.

A. Dark-skinned, of short or medium stature.

(a) Platyrrhine.

Pre-Dravidian (Sakai, Vedda. Jungle tribes of short India, Bhil, Gond,

Oraon, Kalarian); Australian.

(b) Mesorrhine or leptorrhine.

Dravidian, Hamite.

B. Intermediate shades, of variable stature, black hair, typically dolichocephalic.
Indo-Afghan. Nésiot or Indonesian, Palaeo-Amerind.

C. Tawny-white complexion, black hair, medium stature.
Eurafrian, Semite, Mediterranean.

II. MESOCEPHALS.

A. Tawny-white complexion, black hair, medium stature.
Pyrenean, Atlanto-Mediterranean.

B. Fair skin and hair, tall stature.

Nordic.

C. Light brown skin, black hair, medium stature.

Ainu.

III. BRACHYCEPHALS.

Sallow or tawny skin, colour of hair variable, medium or tall.

Eurasian: (1) Alpo-Carpathian (Cevenole, Slav); Pamiri or Iranian; (2) Illyrio-Anatolian (Illyrian or Adriatic or Dinaric; Anatolian or Armenian); Prospectatores; Beakerfolk.

◎ LEIOTRICHII.

I. DOLICHOCEPHALS.

Brownish-or reddish-yellow skin, generally tinged with red, medium stature.

Eskimo.

II. MESOCEPHALS.

Yellowish-brown skin, stature short, medium or tall.

Palaearticus or Ugrian or Palaeo-Asiatic; Sinicus; Northern Amerind.

III. BRACHYCEPHALS.

Skin yellowish-white to coppery-brown, stature short, medium or tall.

Turki; Centralis, Tungus or Mongol; Pareoan Mongoloid;

Polynesian; Neo-Amerind; Tehuelche; North-west Coast Amerind.

惟哈頓氏本人亦預先聲明，在一種著書裏實際不能避免之人種線的排列，僅能指示非常稀疏的生物學之近親關係。爲明白生物學的近親關係，平面乃至立體之排列，更屬必要。故如右所表示，並不能認爲已寫出人類或集團間之一切關係。哈頓氏自身之意見如此，爲免受人指摘計，此處不得不爲預告。

第一節 羊毛狀髮人種

自毛髮性狀之點言，毬狀毛人種 (Ulotrichi) 可認為各人種中最下級之人種，但毬狀毛人種可分為：(一) 東方毬狀毛人種 (Ulotrichi Orientales, Eastern Ulotrichi) (二) 阿非利加或西方毬狀毛人種 (Ulotrichi Africani, Western Ulotrichi) 之二大類。所謂“Ulotrichi”即為有羊毛狀 (wooly) 毛髮之意。

在東方毬狀毛人種中，身體非常短小，皮膚黑色，頭形為中頭乃至低度之廣頭，俗稱為矮民 (Pygmies)；惟在人種學上則名為尼革利陀 (Negrito)。屬此者為安達曼人 (Andamanese) 塞茫人 (Semang) 海膽人 (Aeta) 答卑羅人 (Tapiro) 等。

一、安達曼人 (Andamanese)

以安達曼羣島 (Andaman Islands) 為居住地域，其人種之特徵，毛髮甚短，色黑或煤黑，含有赤色之成分，體毛少，或無毛，皮膚色為青銅色乃至深煤黑色，身長一·四八五米，身體甚均整，手小，頭亦小，為廣頭（頭形指



圖 一 第

數八三，顏面於顴骨之部廣，唇肥厚但並不向上翻，顎骨不突出，鼻垂直，而鼻樑則凹進。（參照第一圖）

11. 塞芒人 (Semang)

以馬來半島中部地方及東部蘇門答臘地方爲分布地域，其特徵，毛髮短，色黑而含有赤色之成分，在顏面及體部之毛髮少，皮膚爲深咖啡色，身長一・五二八米，身體之構造甚堅實，頭形爲中頭（頭形指數七九），臉圓，唇通常不厚，顎骨甚少突出，鼻短而扁平，非常闊，鼻指數達九七。（參照第二圖）




圖 二 第

12. 海膽人 (Aeta)

以菲律賓諸島爲分布地域，其特徵，毛髮甚短，色爲深褐色乃至黑色，通常顏面及體部之毛甚

多，皮膚爲煤褐色，身長一·四六五米，頭形爲廣頭（頭形指數八二），唇之厚度中等，鼻扁平而非常闊，鼻指數在102以上，故可謂爲頂廣鼻（Hyperchamaerhine）。（參照第三圖）

四、答卑羅人（Tapiro）

分布於荷屬新幾內亞（New Guinea）之西部山嶽地方，惟同樣人種之痕跡存在於新幾內亞之各處，又此人種之痕跡恐亦存在於美拉尼西亞（Melanesia）之各地方。其人種之特徵，毛髮短而黑，顏面及體部均多毛，皮膚黃褐色，身長一·四四九米，筋肉極發達，動作活潑，頭形爲中頭（頭形指數七九·五），鼻正直，闊度中等（鼻指數六五·五乃至九四，平均八三），此在其他尼革利陀中亦爲常見之特徵，惟在答卑羅人，自鼻至口之上唇部，成凸形，又爲其另一



第三圖



第四圖

特徵。(參照第四圖)

其次爲東方毬狀毛人種，總括其大部分爲長身或短身，有深色之皮膚，且狹頭之一羣。屬此者爲巴布亞人及美拉尼西亞人。

五、巴布亞人 (Papuan)

現在以新幾內亞之大部分地方爲其居住地域，惟原來卻居住美拉尼西亞之各處。又以前恐

亦生存於澳大利亞，其一變種在塔

斯馬尼亞 (Tasmania)，迄今依然第

存在，即塔斯馬尼亞人 (Tasma-

nians) (參照第五圖)，可認爲此巴

布亞人之一變種。巴布亞人亦分布

於東印度羣島之東南部諸島。若問

其人種之特徵如何？毛髮黑色，有時

圖

五




塔斯馬尼亞人之女

甚長，且顏面亦多毛，皮膚爲深咖啡色或煤褐色，身長通常中等，但亦有非常高大者，頭形爲典型的狹頭而高，前額向後削，眉之近鼻部分高，顎爲突顎，鼻常高而呈突形（convex）鼻尖（tip）下向，爲闊鼻。

六、美拉尼西亞人（Melanesian）

自亞德彌拉耳帝羣島（Admiralty Islands）至新喀利多尼亞（New Caledonia）之間，以斐齊（Fiji）島羣，新幾內亞之沿海地方及新幾內亞之東及東南隣近諸島爲分布地域。

第 六 圖 (A)



斐濟羣島之美拉尼西亞人

第 六 圖 (B)



新幾內亞之美拉尼西亞人

美拉尼西亞人以巴布亞人爲其主要之支源，因與自東印度羣島及經由東印度羣島遷入之諸人種之混血，致成爲雜種，而與巴布亞人大不相同。

設謂何者爲其人種之特徵？毛髮通常爲毬狀，有時成爲捲毛（curly），亦有時成爲波狀（wavy）。而且通常顏面及體部之毛不多。皮膚爲深咖啡色，有時爲非常深黑色，又有時爲銅色。身材爲短身或中等，但其變動度極大。身長以一，五六至一，六米左右者爲最多。頭形一般多係狹頭，然有若干地方係闊頭者，頭形指數自六七至八五。前額普通帶圓形，眉毛普通不上彎，鼻廣，有時垂直，鼻大者仍比巴布亞人之鼻小。（參照第六圖）

東方毬狀毛人種中可包括之主要人種，大概已如上述。其次就西方毬狀毛人種之主要者略述之。

在西方毬狀毛人種或阿非利加毬狀毛人種中，身體極小，有黃色之皮膚，頭形中頭者俗稱爲「矮民」（Pygmies），惟在人種學上則名爲尼革利羅（Negrito），可屬此人種者爲阿卡（Akka），巴突亞人（Batwa），巴蒙布特（Bambuté）等。今爲便宜起見，將此等總括而敘述之。

七、尼革利羅人 (Negrito)

居住地域爲阿非利加之赤道森林地帶及剛果 (Congo) 地方。

其人種之特徵，毛髮極短，通常爲深青褐色，普

通顏面毛甚少，體部生黃色胎毛狀之毛，此體毛在脊上及四肢特長，在腋下及陰部普通生黑色之腋毛及陰毛，皮膚色爲帶赤色之黃色及帶黃色之淡褐色，惟有時亦有非常深色者。平均身長爲一・三

六至一・四二米，最普通


之平均身長爲依特利族 第

(Ituri) 之一・三七五 八

米。腰腹部短，腕長，脚短，身

體不甚勻整。在婦女方面

圖 七 第



女村之方地果剛

特布蒙或特布蒙巴

能見其“*steatopygia*”，即臀部脂肪特別發達，惟此係偶然得見者。頭形大抵爲中頭（頭形指數七七——八一），普通爲突顎，上唇深，呈突狀。唇甚肥厚，惟並不翻轉，頤狹小，鼻樑甚扁平，且鼻翼非常闊而且高，眼突出。（參照第七圖第八圖）

在此一羣中有深色皮膚，身體比較長大之變種，此恐係與 *Negro* 混血之結果。

其次在西方毬狀毛人種之中，有身體矮小，皮膚黃色，頭形中頭之一羣，布須曼人及霍屯督人屬之。

八、布須曼人 (*Bushman*)

此人種稱爲克哈 (*Khuai*) 及“*San*”，其分布地域在現在以喀拉哈里 (*Karahari*) 沙漠爲限，惟以前曾散居南阿非利加之大部分。

其人種之特徵，毛髮普通極短，捲起而成小結，在此等小結間明白顯出無髮之裸處。體毛甚少，皮膚爲黃色乃至橄欖色，身長一・五二九米。*steatopygia* 即臀部脂肪，於婦女爲尤著，手足均



圖 九 第