

傷寒明理續論
殺車槌法





論續理明寒傷

述 華 陶

叢書集成初編

(補印本)

傷寒明理續論及其他一種

一九三九年十二月初版
一九六〇年一月補印

陶 華 述

商務印書館出版

上海市印刷六廠印刷

明理續論序

昔朱肱奉議著傷寒百問。書成經進。授醫博士。其書付監刊行。道遇豫章名醫朱道方。因就質之。朱爲指駁數十條。肱罔然自失。由是書監不刊。事見續易簡。方雙鍾李知先。又爲歌括八韻二書。吾鄉先輩。例以爲活人之書。按魏志佗傳云。出書一卷。此書可以活人。則活人之名所由始。而仲景傷寒論是也。朱李二公。雖知有仲景之書。不能臻其闡奧。未足以充活人之名。正統改元。余遊京師。遇臨江劉志善先生。授書一卷。指摘百問亦數十條。攜以南歸。呈之松江趙景元先生。奉議之書。固未盡善。而劉公所駁。似爲大察。前人無議爲也。且仲景之書。流傳既久。魚魯實多。微辭奧旨之互見。殘簡斷篇之後先。朱公既未知其文。又不知其證候。然自漢魏以來。高人逸士所著。不傳于今者。何可勝數。因出示諸書。曰。郭白雲傷寒補亡。龐安常卒病論。韓祗和微旨。楊仁齋傷寒類書。王實證治。常器之楊大授。凡此數種。皆有功于仲景。而東南醫流所未見也。景元亦自編一書。曰傷寒類例。久未之成。不以示人。庚寅冬。予病足。不出戶庭數月。因觀成無己明理論。止五十證。辨究詳明。惜其未備。於是乃集所見所聞。比類附例。斟酌而損益之。遂成一書。名曰明理續論。姑以自備遺亡。非敢傳諸人也。雖朱公百問。積平生之勤。尙不免後人之紛紜言之。予實何人。乃以數月而有所成。蓋賴古人之成訓。有以啓發之。初學醫之士。或有所得焉。當有知予心者。乃記其所由於卷首云。

傷寒明理續論

明 餘杭節菴陶 華述

傷寒三陰三陽脈證論

傷寒汗下溫之法。最不可輕。據脈以驗證。問證而對脈。太陽者。陽證之表也。陽明者。陽證之裏也。少陽者。三陽三陰之間。太陰。少陰。厥陰。又居於裏。總謂之陰證也。發于外則太陽爲之首。發于內則少陰爲之先。太陽惡寒而少陰亦惡寒。但太陽之脈多浮。少陰之脈沉細。與其他證狀亦自異也。發熱惡寒。身體疼痛。或自汗。或無汗。是爲表證。可汗。不惡寒。反惡熱。口燥咽乾。壯熱。腹滿。小便如常。而大便秘結。是爲裏證。可下。厥冷囊拳。自利煩燥。而無身熱頭疼。是爲陰證。可溫。浮洪緊數。此表病之脈。沉實滑數。此裏病之脈。微細緩。若此陰病之脈。在表者。邪傳於榮衛之間。在裏者。邪入于胃腑之內。胃腑之下。少陽居焉。若傳之陰。則爲邪氣入臟矣。榮與衛俱爲表也。亦均可汗也。然有汗者爲傷風。風傷衛氣。則以桂枝助陽而汗之。輕無汗者爲傷寒。寒傷榮氣。則以麻黃湯助陽而汗之。重榮衛固爲表也。胃腑亦可以爲表也。然以腑臟而分表裏。則在腑爲之表。在臟爲之裏。胃取諸腑。可以表言。若合榮衛腑臟而分之。則表者榮衛之所行。裏者胃腑之所主。而臟則又深于裏者矣。審脈問證。辯明定經。真知其爲表邪則汗之。真知其爲裏邪則下之。真知其爲陰證則溫之。表有邪則爲陽虛。陰經受邪則爲臟病。而溫裏之藥。熱如此而汗。如彼而下。又如彼而溫。桂枝承氣。投之不差。姜附理中。發而必中。大抵治傷寒有法。投劑少差。死生立見。古人處方立

論曰可汗曰可下曰可溫曰和解曰少與曰急下與夫先溫其裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知奇者若網在綱有條不紊論至于此則知古人之立論甚嚴而汗下溫之法亦不可輕也信矣經曰傷寒六七日目中不了了無表證脈雖浮亦有可下者少陰病二三日無裏證亦有可汗者陰證四逆法常用溫而四逆散性寒豈可用哉曰醫在九流之中非圓機之士不足爲語也脈雖浮而亦可下者無表證謂六七日不大便借使大便不難其敢輕下之乎少陰病亦有發汗者少陰本無熱反發熱而表猶未解故用溫藥微取其汗也借使身不發熱其敢輕汗之乎四逆湯用姜附四逆散用枳柴一寒一熱病主四逆固不侔矣然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同四逆散用藥寒主先陽後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也若張氏之論日數多則曰日數雖多但有表證而脈浮者猶可發汗日數雖少若有裏證而脈沉實者卽須下之此日數之不可拘也至如陽極發厥陰極發燥陰證似陽陽證似陰差之毫釐繆以千里可不深思而熟慮也哉

陰陽虛實用藥寒溫辯

傷寒一書所謂陰陽虛盛則精微之義不無辯析於其間四十八難曰病之虛實出者爲虛入者爲實蓋表之眞陽旣虛故陰邪以盛出而乘陽是以脈浮于外其病在表法當汗之當其陰邪出表脈浮于外之時不可自感以爲陽脈盛也裏之眞陰旣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脈入于內其病在裏法當下之常其陽邪入裏脈實于內之時不可自惑以爲陰脈盛也是說非古人之立言也蓋使人知如此之爲陰

盛則抑陰而助陽如彼之爲陽盛則抑陽而助陰陰甚則邪出於外者發表之藥常性溫以助陽氣如桂枝湯之類是也陽盛則邪入于內者攻裏之藥常性寒以抑陽氣如承氣湯之類是也或曰陰出而乘于外是陽之不足也陽病則常有以發表而汗之何哉是大不然陰邪傳于外不汗之則邪何由而去桂枝之性溫溫之乃所以助陽陽有所助而長則陰邪之所由以消辛甘發散爲陽者此也張氏所謂承氣入胃陰盛乃亡者正恐陰盛出外而誤以承氣下之安得而不亡或者有陽入而承于內是陰之不足也陰病則當有以溫養而下之何哉是又不然陽邪入于內不下之則邪從何而出承氣之性寒寒之乃所以抑陽陽受其抑則微而真陰之所由以長酸苦湧泄爲陰者此也張氏所謂桂枝下咽陽盛則斃正恐陽盛入內而誤以桂枝汗之又安得而不死觀古人發表之藥多溫攻裏之藥多寒則知陰陽虛實之意微非止於汗下設矣所以爲用藥寒溫設也

六經用藥格法

太陽屬膀胱寒水非發汗不能愈亦有桂枝麻黃以助陽祛邪此膀胱寒水之經有標本之作風寒初客仍在表宜用辛溫之劑以發散之若無頭痛惡寒或非冬時皆不可用

陽明屬胃非通泄不能痊必用大黃芒硝以疎利陽熱此言表證已罷頭痛惡寒已除則熱歸陽明之本矣宜承氣湯寒劑以泄熱若惡寒未除則爲表寒邪尙在不可下也冬時亦宜用不可拘忌少陽屬膽無出入之道柴胡半夏能利能汗消解血熱黃芩佐之

太陰脾土。惟惡寒濕。非乾姜、白朮不能燥濕也。

少陰腎水。惟惡寒燥。非附子不能溫潤。

厥陰肝木。藏血榮筋。非芍藥、甘草不能滋養。此用藥經常之道也。

陰陽虛盛用藥寒溫辯

夫傷寒發表攻裏之藥。寒熱殊途。用之一差。死生反掌。所以越人、仲景深致意於其間也。難經云。傷寒陽虛陰盛。汗之則愈。下之則死。陽盛陰虛。汗之則死。下之則愈。且寒邪之傷人也。有淺深焉。淺者汗之。深者下之。此古今不易之定法也。方其風寒初客皮毛之間。陰氣乃盛。閉塞腠理。身中陽氣已虛。不能禦衛。遂有惡風惡寒之證見焉。當此之時。止宜桂枝湯辛甘溫之藥。助陽抑陰而發之。陰邪既散。表氣沖和而愈。經云。辛甘發散爲陽者是也。不知用此而反以承氣湯苦寒之藥下之。表裏俱傷。不亡何待。表邪既罷。寒作爲熱。陽陷入深而盛於裏。則津液消耗。腸胃燥澀。而臟腑之真陰虛矣。陰氣既虛。卽譫妄狂燥煩渴惡熱之病而作也。當此之時。宜用承氣湯苦寒之劑。扶陰抑陽而泄去熱氣。陽邪卽退。胃中真陰來復。裏氣和平而愈。內經所謂酸苦湧泄爲陰者是也。不知用此。乃以桂枝辛熱之藥助邪伐正。安有不斃者乎。所以仲景云。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛乃亡。良以此夫。嗚呼。此論誠爲傷寒汗下之樞機乎。俗醫不能達此爲妙。昧于陰陽虛盛之道。悖逆此理而不殺人也幾希。經云。發表不遠熱。攻裏不遠寒。豈虛語哉。

三陰三陽脈證

經云。尺寸俱浮大者。陽受病也。當一二日發。以其脈上連風府。故頭項痛腰脊強。傷寒則發熱惡寒。傷風則鼻塞惡風。然傷風有汗。傷寒無汗。

尺寸俱長者。陽明受病也。當二三日發。以其脈夾鼻絡于目。故身熱目疼鼻乾不得臥。又曰。不惡寒而作渴。皆爲在經。不惡寒。反惡熱。自汗出。大便難。

尺寸俱弦者。少陽受病也。當三四日發。以其脈循脅絡於耳。故胸脅痛。而耳聾。口苦咽乾。目眩。往來寒熱而嘔。此三經受病未入于腑者。可汗而已。

尺寸俱沉細者。太陰受病也。當四五日發。以其脈布胃中絡于噤。故腹滿而咽乾。或腹痛手足溫。自利不渴。

尺寸俱沉者。少陰受病也。當五六日發。以其脈貫腎絡于肺繫舌本。故口燥舌乾而渴。惡寒。口中和。默默欲寐。時時腹痛。又咽痛三證。

尺寸俱微緩者。厥陰受病也。當六七日發。以其脈循陰器絡于肝。故煩滿而囊縮唇青舌捲筋急。或渴不欲食。卽吐蛔。此三經皆受病也。已入於腑者。可下而已。此皆自陽經傳來者。故宜下而去之。非若陰經自中之寒。此則爲真陰證矣。當用四逆湯輩溫之。

汗下溫正法

太陽傷風自汗惡風。桂枝湯。傷寒無汗惡寒。麻黃湯。陽明不惡寒反惡熱自汗者。大便秘。大柴胡湯。小承氣湯。汗不止者。胃汁乾。急下之。大承氣湯。無汗惡寒。升麻葛根湯。有汗脈遲微惡寒。爲表未解。桂枝湯。無汗脈浮而喘。麻黃湯。

少陽證病。屬小柴胡湯。

太陰自利不渴爲臟寒。理中湯。四逆湯。胸中脹滿。枳實理中丸。脹滿脈浮。桂枝湯。脹滿時痛。桂枝加芍藥湯。痛甚。桂枝加大黃湯。

少陰脈沉。口不乾。舌不燥。皆惡寒。小便清白。四逆湯。始得病脈。脈沉。反發熱。麻黃附子細辛湯。口燥咽乾而渴。急下之。大承氣湯。六經中惟此一經難治。大要以口燥而渴知其熱。脈沉而遲別其寒。厥陰脈微浮爲欲愈。不浮爲未愈。小建中湯。脈浮緩如瘡狀。桂枝麻黃各半湯。脈沉短者。囊必縮。爲毒氣入臟。承氣湯下之。利不止者。四逆湯。

傷風見寒傷寒見風脈證

熱盛而煩。手足自溫。脈浮而緊。此傷風見寒脈也。不煩少熱。四肢微厥。脈浮而緩。此傷寒見風脈也。二者爲榮衛俱病。法用大青龍湯。然不可輕用。須風寒俱盛。又加煩燥。方可與之。一法以桂枝麻黃湯覓穩。今改羌活湯。

三陽合病

本太陽病。若汗若下若利。小便無津液。胃中燥。轉屬陽明。是爲脾約。若惡寒。用升麻葛根。不惡寒反惡熱。大便難。白虎湯。譫語者。調胃承氣湯下之。喘而胸滿者。不可下。麻黃湯。太陽少陽。頭項強急。脅下硬滿。目眩。往來寒熱。小柴胡湯。

少陽陽明。本少陽病。因爲發汗利小便後。胃中燥。大便難。屬調胃承氣湯。

正陽陽明。乃本經風盛氣實也。大柴胡湯。大小承氣湯。選用之。

三陽合病。腹滿身重。譫語遺尿。口中不仁。屬白虎湯。口乾舌燥。不仁。背惡寒。同太陽陽明。少陽陽明。正陽陽明。無表證者。俱可下。惟惡寒者。爲太陽陽明合病。未過經。爲屬表。可發汗。桂枝麻黃各半湯。蓋在經則汗過經則下也。

太陽陽明併病

本太陽病發汗則汗出不徹。因轉出陽明。續自微汗出。不惡寒。是併歸陽明也。太陽證尙在。桂枝麻黃各半湯。太陽證也。大小承氣湯。陽明證也。

春溫變熱

溫熱病者。冬時感寒。偶不卽發。寒毒藏於肌膚。至春變爲溫病。夏變爲暑病。暑病者。熱又甚於溫也。溫病發於春三月。夏至前是也。發熱咳嗽。頭疼身痛。口燥渴。脈浮弦。熱甚者。小柴胡湯。熱微者。升麻葛根湯。解肌湯。微熱不渴。小柴胡加桂枝。渴者加五味。渴者去半夏加括蕒人參。脈實煩渴者。大柴胡湯微利之。以

其脈實。必大便難也。虛煩者。竹葉石膏湯。然用羌活湯解之爲當。渴加知母、石膏。

夏月熱病發熱、頭疼、身體痛重、不惡寒而惡熱、其脈洪、不可溫、宜羌活湯。渴加知母、石膏。三月至夏、謂之晚發。梔子升麻湯。有少陽證者。小柴胡湯。更于前方內選用。若春夏有惡風惡寒、類傷寒證者。蓋當時暴中風寒之氣、新病卽非冬時受寒、通用羌活湯治之。

瘧

瘧者、先太陽中風、重感寒溫所致。經曰、身熱、足寒、頸項強急、惡寒、時時頭熱、面赤、目赤、獨頭面搖、卒口噤、背反張者、瘧病也。桂枝加栝蒌湯主之。傷風頭痛、常自汗出而嘔者、若汗之必發瘧。大發濕家汗亦作瘧。新產血虛、汗出傷風亦作瘧。若其脈沉弦而遲、或帶緊、或散于指外、皆惡候也。

發熱無汗惡寒爲剛瘧。葛根湯。或麻黃葛根湯。發熱有汗不惡寒爲柔瘧。桂枝加葛根湯。桂枝栝蒌葛根湯。二瘧通用小續命湯。剛瘧爲陽。去附子。柔瘧爲陰。去麻黃。剛瘧胸滿、口噤、咬牙、腳攣、臥不着席。大承氣湯下之。柔瘧桂心白朮湯。附子防風湯。白朮散。桂枝煮散。選用。

風溫濕溫

風溫尺寸俱浮。素傷於風。因而傷熱。風與熱搏。卽爲風溫。其外證。四肢不收、身熱、自汗、頭疼、喘息、發渴、昏睡、或體重不仁。慎勿發汗。汗之則譫語煩燥。目無精彩。病在少陰、厥陰、二經。葳蕤湯。人參敗毒散。葛根龍膽湯。小柴胡湯。選用。未醒者。柴胡桂枝湯。

發汗已身灼熱知母葛根湯渴甚括囊根湯脈浮身重汗出漢防已湯誤汗風溫防已黃耆湯
濕溫寸濡而弱尺小而急素傷於濕因而中暑濕與熱搏卽爲濕溫其狀胸腹滿目痛壯熱妄言自汗兩
脛逆冷攣急惡寒若發其汗使人不能言耳聾不知痛處其身青而色變醫殺之耳

濕溫太陽經用白虎蒼朮湯加桂枝濕勝則一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快五苓散加茵陳臟
腑虛自利甚理中湯朮附湯

風濕中濕

風濕脈浮先傷濕而後傷風也其證肢體腫痛不能轉側額上微汗惡寒不欲去衣大便秘小便利熱至
日肺西而劇治法但微解肌若正發汗則風去濕在非徒無益而又害之解肌用麻黃杏子薏苡甘草湯
白朮防己黃耆湯不嘔不渴脈浮虛者桂枝附子湯濕多身痛小便自利甘草附子湯煩渴小便不利五
苓散外不熱內不渴小便自利朮附湯緩若昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁白通湯加白朮去甘草
身腫痛微喘惡風杏仁湯人參敗毒散通用熱而煩渴者加括囊若誤下之小便必不利可五苓散中濕
小便不利大便自利甘草附子湯五苓散大小便皆利則與朮附湯身體痛或鼻塞小建中湯加黃耆

溫毒中喝

溫毒者冬月感寒毒異氣至春始發也表證未罷毒氣不散故有發斑之證心下煩悶嘔逆咳嗽後必下
利寸脈洪數尺脈實大爲病則重以陽氣盛故耳治法通用玄參升麻湯黑膏主之詳見發斑條中

中暑脈虛而伏。身熱、背惡寒、面垢、自汗、煩燥、大渴、毛聳惡寒、昏昏倦怠、而身不痛。與傷寒諸證不同矣。內外俱熱、口燥煩渴、四肢微冷、而身不痛。用白虎湯。疲逆惡寒、橘皮湯。熱悶不惡寒、竹葉石膏湯。頭痛、惡心煩燥、心下不快、小便不利、五苓散。下消暑丸。中暑用小柴胡湯最良。脈扎遲、腠理開、灑然毛聳、口齒燥、白虎加人參湯。霍亂、煩燥、大渴、腹痛、四肢冷、脚轉筋、以黃連香薷湯。

發熱

夫翕翕然而熱者、表熱也。有蒸蒸而熱者、裏熱也。其屬表者、風寒客於皮膚、邪氣怫鬱于外、表熱而裏不熱也。其屬裏者、陽氣下陷、入於陰中、裏熱甚而達表也。其在半表半裏者、以表熱未罷、邪氣傳裏、裏未作實、則表裏俱熱、而但輕于純在裏也。太陽厥陰、皆不發熱、惟少陰反有發熱之證、或其脈沉、或下利、手足冷爲異耳。雖然、傷寒發熱、病之常也。脈陰陽俱虛、熱不止者、汗後復發熱、脈燥疾下利者、皆不易治、其可例視之乎。

太陽病發熱、頭疼、惡寒、有汗、桂枝湯。惡寒、無汗、麻黃湯。

傷寒六七日、目中不了了、無表裏證、大便難、身微熱、此爲實、急下之。大承氣湯。脈浮數者、大柴胡湯。

陽明病發熱、汗出、脈浮數實者、調胃承氣湯。脈浮、桂枝湯。汗多者、胃汁乾、急下大承氣湯。

中風發熱、六七日不解而煩、有表裏證、渴欲飲水、水入即吐、名曰水逆、五苓散。脈浮而大、其人發熱、煩渴、小便赤、表裏俱見、五苓散。

少陽發熱。脈弦細而嘔。小柴胡湯。

少陰反發熱。有二病。脈沉者。麻黃附子細辛湯。下利厥逆。裏寒外熱。脈不出者。通脈四逆湯。

脈浮熱甚。反灸之。因火而動。必咽燥吐血。四逆湯。脈浮大遲。表熱裏寒。下利清穀。四逆湯。發熱。口乾。鼻燥。能食者。黃芩湯。

脈浮發熱。無汗而渴。表未解也。小柴胡湯。加人參。括蕤湯。壯熱頭痛。心中煩者。梔子黃芩湯。汗下後有熱。大汗則損氣。氣損則陽微。故脈虛而惡寒。大下則傷血。血傷則陰弱。故脈濇而發熱。誤汗。誤下。皆有此耳。且陰以陽爲主。陽以陰爲根。下之亡陰矣。陰無所主。邪氣搏之。血虛乃發熱也。

太陽病發汗。遂發熱惡寒。小柴胡湯。蒸蒸而熱者。屬胃。調胃承氣湯。

下後陰弱而發熱。是爲內熱。葶藶苦酒湯。若脈浮則汗之。麻黃湯。脈實則下之。大柴胡湯。大下後。身熱不去。心中結痛者。未欲解。梔子豉湯。發汗又復下之。惡寒發熱無休止時。小建中湯。

傷寒以圓藥下之。身熱不去。微煩者。梔子乾姜湯。

下後。身熱不去。心中結痛者。梔子豉湯。瘥後勞復發熱。小柴胡湯。脈浮者。當汗解。柴胡桂枝湯。脈沉者。當下解。調胃承氣湯。

下利腹反痞滿者。生姜瀉心湯。小便不利。麥門冬湯。食復發熱。梔子豉湯。加大黃。病後虛羸。微熱不去者。竹葉石膏湯。

頭痛

大凡頭痛屬三陽。乃邪氣上攻也。太陽專主頭痛。陽明、少陽亦有之。三陰絡上不過頭。惟厥陰循喉嚨之後。上連目系頂顛。故有頭痛、乾嘔、吐涎沫之證。却無身熱。亦與陽證不同。雖然。風濕在少陰。濕溫在太陰。其經從足走至胸中而還。及頭痛過於陰毒。是又不可拘也。若兩感于寒。太陽、少陰俱病。則頭痛、口乾、煩滿而渴。與夫頭痛極甚。又連于胸、手足寒者。則爲眞頭痛。不可治矣。

太陽病。頭痛發熱惡寒。無汗。麻黃湯。有汗。桂枝湯。已發汗未發汗。頭痛如破者。葛根葱白湯。

太陽病。下之脈細數者。頭痛未止。連鬚葱白湯。

陽明頭痛。不惡寒。反惡熱。六七日不大便。胃實氣攻於上也。少與調胃承氣湯。

少陽頭痛。脈弦發熱。小柴胡湯。

濕家頭痛。鼻塞。瓜蒂末納鼻中。黃水出立愈。

痰涎頭痛。胸滿寒熱。脈緊。瓜蒂散吐之。

厥陰頭痛。乾嘔。吐涎沫。吳茱萸湯。

頭痛收熱。心煩。梔子黃芩湯。

項強

天行勞復。頭痛。四肢痛。葱頭湯。

項背強者。太陽表邪也。發散則解。結胸項強。有下之證。寒濕項強。則成瘥。見本條。臨病宜審。太陽病項強。無汗惡風。爲表實。葛根湯。項背強發熱汗者。惡風爲表虛。桂枝加葛根。誤下。太陰結胸項強。大陷胸丸。一法。頻與理中丸。若損甚者。兼與四逆湯。項強脅下滿。身熱惡風。手足溫而渴。小柴胡湯。陰毒初得病。項背強咽痛。心腹痛短氣厥逆吐利。身如被杖。附子湯。陰毒甘草湯。正陽湯。天行復作熱。至晚則腰痛。頭項強身重。葛根生薑豉湯。

惡風

惡風者。見風則怯。密室之中無所惡也。風傷衛氣。衛虛則腠理不密。由是而惡矣。悉屬於陽。非比惡寒有陰陽之別。若無汗而惡寒者。爲傷寒。當發其汗。汗出而惡風者。則爲中風。當解其肌。不可更發汗。若裏證甚而惡風未能者。尤當先解其表。三陽風濕。皆有此證。不可不辯。

太陽中風。陽浮陰弱。惡風自汗。發熱鼻噦乾嘔。桂枝湯。

頭痛發熱身疼腰痛骨節疼。惡風無汗而喘。麻黃湯。發汗太過。衛虛亡陽。遂漏不止而惡風者。法當用溫。桂枝附子湯。

小便難。四肢微急。難以屈伸。治與上同。

若吐若下後。七八日不解。表裏俱熱。時惡風。大渴。舌乾燥而煩。白虎加人參湯。汗不止。必惡風煩燥。不得臥。先防風白朮牡蠣湯。次小建中湯。風濕惡風。不欲去衣。骨節煩疼。不得屈伸。