

【第二卷】

径方医学

(日)

江部洋一郎
横田静夫著

戴昭宇译
徐文波监译



YZLJ0890112861

學苑出版社

圖書編目(CIP)數據

著者：吉田静夫 横田洋一郎
卷数：第2卷 / (日) 江部洋一郎著
出版社：北京出版社
出版时间：2010年1月第1版
ISBN 978-7-5080-3633-1

经方医学

第二卷

[日] 江部洋一郎 横田静夫 著
徐文波 译 戴昭宇 监译



YZL0890112861

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

经方医学. 第2卷 / [日]江部洋一郎, [日]横田静夫著; 徐文波译. —北京: 学苑出版社, 2010.10(2011.8重印)

ISBN 978-7-5077-3673-1

I. ①经… II. ①江… ②横… ③徐… III. ①伤寒论-经方-临床应用 ②金匱要略方论-经方-临床应用 IV. ①R222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 206835 号

著 夫 横田 静一 洋一郎 [日]
译 宇 部 洋 一 郎 文 徐

责任编辑: 周乙龙

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 河北三河灵山红旗印刷厂

开本尺寸: 890×1240 1/32

印 张: 5.75

字 数: 128 千字

印 数: 3001—6000 册

版 次: 2010 年 12 月第 1 版

印 次: 2011 年 8 月第 2 次印刷

定 价: 17.00 元

前言和谢辞

续《经方医学(第一卷)》，我们将进一步对《伤寒论》及《金匱要略》的条文和处方展开解析。在笔记的基础上补充而成稿，叙述上更为简洁。

希望诸位通过阅读本书，不断加深对经方理论体系的理解，同时能将经方理论运用在日常诊疗实践之中。

在此，对协助参与本书编纂、整理工作的九州山口恭广、小山季之、键本明男等几位医生，并北海道的诸冈透医生及其夫人，东洋学术出版社的山本胜旷社长深表谢意。

作 者

于 2000 年 7 月 13 日

目 录

(35)	桂枝汤类方	(1)
(36)	桂枝汤类方总论	(1)
(37)	1. 作用趋向	(1)
(38)	2. 各药物在处方中的功效	(2)
(39)	桂枝	(2)
(40)	芍药	(3)
(41)	生姜	(5)
(42)	大枣	(5)
(43)	甘草	(5)
(44)	桂枝汤加芍药汤、桂枝汤加大黄汤	(8)
(45)	◆ 关于肠鸣及肠蠕动	(10)
(46)	◆ 关于太阴病	(12)
(47)	◆ 太阴病小结	(16)
(48)	◆ 太阴病与阳明病的寒证	(20)
(49)	小建中汤	(21)
(50)	◆ 关于手足烦热	(27)
(51)	◆ 关于梦、失精	(27)
(52)	◆ 关于里急	(28)
(53)	黄芪建中汤	(31)
(54)	当归建中汤	(33)
(55)	当归	(34)
(56)	川芎	(35)
(57)	◆ 关于活血、行血药物	(35)

桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤	(36)
桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤	(37)
炙甘草汤	(39)
◆ 关于“脉结代”、“脉结悸”	(42)
(1) ◆ 关于阿胶	(45)
(1) 阿胶	(47)
(1) 麻子仁	(48)
(2) 桂枝去桂加茯苓白术汤	(51)
(2) 桂枝加桂汤	(54)
(2) 桂枝甘草汤	(56)
◆ 关于上冲、奔豚、悸、烦等的补充说明	(58)
(2) 桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(60)
◆ 关于烦和躁	(60)
(2) 桂枝加龙骨牡蛎汤	(61)
(2) 牡蛎	(64)
(2) 龙骨	(64)
(2) 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	(65)
(2) 《外台》牡蛎汤与桂枝救逆汤的比较	(67)
(2) 蜀漆	(68)
(2) 恒山	(68)
(2) 黄芪桂枝五物汤	(69)
◆ 再议风邪	(70)
(2) “尊荣人……”之证与黄芪桂枝五物汤证 的对比	(71)
(2) 黄芪桂枝五物汤的虚证与四逆汤的虚证之 不同	(73)

(01)	黄芪芍药桂枝苦酒汤、桂枝加黄芪汤	(74)
(11)	黄汗病的参考条文	(76)
(S11)	黄汗病的症状	(76)
(SII)	黄汗病的病因	(76)
(411)	黄汗病两个阶段的病理病机	(79)
(411)	湿	(80)
(511)	郁热	(82)
(811)	脉沉迟	(82)
(811)	黄汗病常用处方解析	(82)
(030)	醋	(83)
(132)	当归四逆汤	(84)
(030)	当归四逆加吴茱萸生姜汤	(89)
(130)	通草	(91)
(133)	细辛	(91)
	吴茱萸	(92)
(161)	◆ 有关厥寒	(93)
(141)	当归四逆汤、当归四逆加吴茱萸生姜汤应用于 寒疝治疗	(95)
(141)	◆ 关于寒疝	(95)
(841)	羊肉	(96)
	麻黄汤类方	(100)
(148)	麻黄汤类方总论	(102)
(125)	麻黄汤各论	(104)
(123)	头痛	(104)
(124)	衄	(106)
(122)	发热	(108)
(126)	疼痛	(109)

(17)	恶寒	(110)
(18)	体感温度	(111)
(19)	饮食与体温的关系	(112)
(20)	◆ 有关粘膜	(113)
(21)	过敏性鼻炎的发病机理	(114)
(22)	麻黄加术汤	(117)
(23)	有湿热的麻黄汤证	(117)
(24)	麻黄汤证的浮脉	(118)
(25)	补充说明麻黄汤证中的热和湿	(118)
(26)	麻黄	(120)
(27)	麻黄汤的发汗机制	(125)
(28)	麻黄杏仁甘草石膏汤	(126)
(29)	麻黄杏仁薏苡甘草汤	(130)
(30)	薏苡仁	(133)
(31)	桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝	茶吴
(32)	二越婢一汤	(134)
(33)	大青龙汤	(141)
(34)	越婢汤、越婢加术汤	(144)
(35)	◆ 关于湿证	(147)
(36)	◆ 关于补津和补阴	(148)
(37)	1. 补津	(148)
(38)	2. 补阴	(148)
(39)	白术	(152)
(40)	石膏	(153)
(41)	◆ 关于温病	(154)
(42)	风水	(155)
(43)	风水的治法	(156)

里水	(157)
里水的治法	(158)
瘀热在里的里水	(162)
麻黄附子细辛汤、麻黄附子甘草汤、麻黄附子汤 …	(164)

桂枝汤类方

(S 图)

桂枝汤类方总论

首先让我们再次分析一下桂枝汤。

桂枝汤：桂枝三两 芍药三两 大枣十二枚 生姜三两
炙甘草二两

1. 作用趋向

桂枝汤中各药物的作用趋向如图 1 所示。




图 1

桂枝汤中桂枝和芍药各用三两，如此桂枝汤在上下、内外、散收的作用上恰好平衡。而桂枝汤加桂枝、桂枝汤去桂枝、桂枝汤加芍药、桂枝汤去芍药等桂枝汤类方，正是打破了桂枝汤在上下、内外、散收上的平衡状态，制造了某种不平衡以突出作用于某个特定方向。

2. 各药物在处方中的功效

大类之桂枝

桂枝

(图 2)




图 2

- ①促使胃气贯通于脉外卫气（其中部分与皮气相承续）。
- ②上述①的作用使肾之冲气向肾→胃→肺方向转换，从而平冲降逆（苓桂味甘汤）。
- ③促进脉外卫气运行，从而推动脉中营血运行。
- ④使胃气外达于肌部（胃→心下→下膈→肌部）。
- ⑤使脉外之气、皮部卫气及肌气经腠理外散。
- ⑥上述第①③⑤项的作用结果，有助于肺气宣散。
- ⑦加强下膈“出”的功能。

芍药

1. 作用于血分：

促进脉中营血由络向肝、心的方向回流，从而祛除肌、肉、筋、骨之热（排脓散）。(图 3①)

2. 作用于气分：

(1) 向下

①加强心下向小肠、膀胱的肃降（第 2 肃降）。(图 3②)

②第①项的作用结果，促进肺向心下肃降功能（第 1 肃降）。(图 3③)

（以上作用使正常的津气，病理状态的气、水湿、水饮得以下降。）

③使过度上升的胃气、胃热下降（病理状态）。(图 3④)

④将正常的气、津液从胃供应到肾（补肾作用）。(图 3⑤)

⑤加强通过腠理进行的由皮部至肌部的小型肃降活动
(图 3⑥)

（从肺→心下→小肠、膀胱为大型肃降活动。）

(2) 向内

①将肌气及肌水引至心下。(图 3⑦)


②使过度外出的胃气向内、向下循行。(图 3⑧)

③加强膈的出入功能中“入”的功能。(图 3⑨)

(3) 其他

①促进脉中营血从络脉回归的同时，促使脉外之气回流。
(图 3⑩)

②通过促进肌部的回流及脉外之气的回流，祛除肉、筋、骨及其周围的水湿。(图 3⑪)



(10) 图 3 水道周围其筋骨、皮

③第②项和第1.①项的作用可清除肌、肉、筋、骨之热。(图3⑫)

④将血中过剩的“水”通过心→肺→胸→心下→小肠→膀胱进行肃降。(图3⑬)

生姜

- ①使胃气全方位地输出。
- ②大量使用具有止呕作用。
- ③祛除胃、心下之饮。

大枣

主要是固守胃津，也有生津作用。

甘草

主要是守护胃气，也有生津作用。(图4)




图4

上述构成桂枝汤的单味药物的药效合起来就是桂枝汤的功效。可以说桂枝汤加桂枝、桂枝汤去桂枝、桂枝汤加芍

药，桂枝汤去芍药等桂枝汤类方中，正是加强了某种药物的药效，减弱或完全去除某种药物的药效。

根据桂枝、芍药的作用方向，将桂枝汤类方予以归纳，如图 5 所示。




图 5

处方	桂枝	芍药	作用方向
桂枝汤	三两	三两	使胃气向上下、内外各方向均衡供给
桂枝汤加芍药	三两	六两	着重向内下方供给，也行于外上方
桂枝汤加桂枝	五两	三两	着重向上供给，也行于内下方
桂枝汤去芍药	三两	—	只向上供给，基本不行于内下方
桂枝汤去桂枝	—	三两	只向内下方供给，基本不行于外上方

补充：桂枝用到四两以上时，其作用方向主要向上。

由上可知，通过对桂枝汤进行加减，可以收到以下两种效果。

一是将生理状态的胃气向外上方，或内下方输出。或者

是向外上方及内下方两个方向同时输出。

二是针对气有余的病理状况，通过突出反方向的作用，以纠正其病理倾向而达到治疗目的。如对气过度上行的病证，处方中用桂枝三两，芍药六两；或不用桂枝单用芍药三两，如此该方所具有的下行作用，便可扭转气机上逆的病理状态。

桂枝汤类方

	桂枝	芍药	大枣	生姜	炙甘草	
桂枝汤	3 两	3 两	12 枚	3 两	2 两	
【桂枝汤加芍药类】						
桂枝加芍药汤	3	6	12	3	2	大黄 2
桂枝加大黄汤	3	6	12	3	2	饴糖 1 升
小建中汤	3	6	12	3	2	黄芪 3 两、饴糖 1 升
黄芪建中汤	3	6	12	3	2	当归 4 两、饴糖 1 升
当归建中汤	3	6	12	3	2	人参 3 两
桂枝加芍药生姜各一两 人参三两新加汤	3	4	12	4	2	
【桂枝去芍药汤】						
桂枝去芍药汤	3	0	12	3	2	附子 1 枚
桂枝去芍药加附子汤	3	0	12	3	2	人参 2 两、地黄 1 斤
炙甘草汤	3	0	30	3	4	阿胶 2 两、麦冬半升、麻子仁半升
【桂枝汤去桂枝类】						
桂枝去桂加茯苓白术汤	0	3	12	3	2	白术 3、茯苓 3
【桂枝汤加桂枝类】						
桂枝加桂汤		3	12	3	2	
【其他】						
桂枝甘草汤	4				2	
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	1				2	龙骨 2、牡蛎 2
桂枝加龙骨牡蛎汤	3	3	12	3	2	龙骨 3、牡蛎 3
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎 龙骨救逆汤	3		12	3	2	龙骨 4、牡蛎 5 蜀漆 3
黄芪桂枝五物汤	3	3	12	6		黄芪 3

	桂枝	芍药	大枣	生姜	炙甘草	大黄
桂枝汤	3 两	3 两	12 枚	3 两	2 两	
黄芪芍药桂枝苦酒汤	3	3				黄芪 5 (苦酒 1 升)
桂枝加黄芪汤	3	3	12	3	2	黄芪 2
当归四逆汤	3	3	25	3	2	当归 3、细辛 3 通草 2
当归四逆加吴茱萸生姜汤	3	3	25	半斤	2	当归 3、细辛 3 通草 2、吴茱萸 2 升

桂枝汤加芍药汤、桂枝汤加大黄汤

条文

第 279 条 本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。

桂枝加芍药汤方 桂枝三两(去皮) 芍药六两 甘草二两(炙) 大枣十二枚(掰) 生姜三两(切)

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温分三服。

本云桂枝汤，今加芍药。

桂枝加大黄汤方 桂枝三两(去皮) 大黄二两 芍药六两 生姜三两(切) 甘草二两(炙) 大枣十二枚(掰)

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

条文解析

第 279 条 本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。