

素治服

鹽蠱

女新藥

方方法



服鹽藥法

採星衍錄

叢書集 成 初 編

(本印補)

服鹽藥及他其二種

一九三七年六月初版
一九五九年十月補印

商務印書館出版

上海大众文化印刷廠印刷

服鹽藥法

無藥州土。則須服之大益。

成州鹽官第一。

次縣州封井。

次鹽州富因井。

次益州貴平井。

上四井鹽可服之。

右服法先以大豆許鹽置口中勿咽之。須臾津液滿口。令近齒。以方寸匕鹽內口。和津液一時咽之。日一服。

凡瘧新患者。一服得快利卽愈。百日以上者。五服差。若一月服之。終身不發。

諸下痢。初患一兩服卽差。赤白久痢經年者。一七二七服差。

諸心腹痛結。宿癖積聚。吐逆食不化者。一年以上。二三十年。不過三月服之。其痢及諸病皆愈。初服時。痢益極者勿怪。

諸氣滿喘逆不能食者。一服卽散。日服之。則根本皆除。

大氣熱疾。頭痛目眩。四肢煩熱者。一服得吐利差。

諸頭面皮膚百節皆風。一月服之差。若初服十日內。眉間益悶。勿怪。

諸痰飲欬逆不能思食者。一服差。

諸虛勞傷損骨節疼痛起止失聲者。二七日服之。少氣乏力而無顏色。十日服之。能三十日服佳也。常以平旦空腹服之。率以三七爲節。須得吐利者。須一度多服三七以上。令人大吐利。終不傷人。若覺煩熱。數數飲冷水。若至他方異域。不伏水土。到卽服之。得一升。百事不懼。鹽能補虛去冷熱。若有宿食不消。變成霍亂。一服卽差。

肘後備急方卷八服鹽方。

服鹽方。療得熱病頭痛目眩。并卒心腹痛。及欲霍亂。痰飲宿食。及氣滿喘息。久下赤白。及積聚吐逆。乏氣少力。顏色痿黃。瘧瘧諸風。其服法。

取上好鹽。先以大豆許。口中含勿咽。須臾水當滿口。水近齒。更用方寸匕抄鹽內口中。與水一時咽。不爾。或令消盡。喉若久病長服者。至二三月。每旦先服。或吐或安。擊卒病可服三方寸匕。取卽吐痢。不吐。痢病更加服。新患瘧者卽差。心腹痛及滿得吐下亦佳。久病每以心中熱爲善。三五日亦服佳。加服取吐痢。痢不損人。久服大補。補脾腎氣五石無不差之病。但恨人不服。不能久取此療方不一小品云。卒心痛。鬼氣宿食不消。霍亂氣滿。中毒鹹作湯服。一二升。剝便吐之。按肘後備急方。後人增附。不盡出于葛氏。故列于金匱後。


右孫氏云。成州鹽官者。成州今甘肅成縣。宋書氏胡傳。仇池地方百頃。四面斗絕。高平方二十餘里。羊腸盤道二十六回。上豐水泉。煮土成鹽。今在成縣西。一名瞿堆。又名仇池山也。又寰宇記。階州出石鹽。未知孰是。云次縣州封井者。縣州卽今州治。隋書地里志。巴西有鹽井。唐地里志。巴西魏城羅

江鹽泉有鹽。巴西等縣皆在今州境。元和郡縣志。陽下鹽井在鹽泉縣西一里。今在州界。有中井十所。下井十所。云次鹽州富因井者。漢地理志。安定三水有鹽官。水經河水注。縣東有溫泉。溫泉東有鹽池。城北有三泉。疑卽縣之鹽官也。今甘肅寧夏花馬池鹽也。云次益州貴平井者。華陽國志。牛婢縣有陽明鹽井。牛婢卽今簡州。西魏置貴平縣。在州境。井以爲名也。元和郡縣志。陽明鹽井在陽安縣北十四里。又有牛婢等四井。又上軍井。下軍井。並鹽井也。在平泉縣北二十里。今州鹽井共九十三陽。安平泉皆在今州境。然則此四井二在四川。二在甘肅也。按神農本經。有戎鹽、大鹽、鹵鹽三種。云戎鹽味鹹寒無毒。主明目目痛。益氣堅肌骨。去毒蠱心腹痛。溺血吐血。齒舌血出。一名胡鹽。生胡鹽山及西羌北地。酒泉福祿城東南角。北海青南海赤大鹽。主腸胃結熱喘逆。胸中病。生邯鄲及河東治澤鹵鹽。主大熱消渴。狂煩除邪。及下蠱毒。去五臟腸胃留熱。結氣心下堅。食已嘔逆喘滿。明日痛。生河東鹽池。說文鹵。西方鹹地也。安定有鹵縣。天生曰鹵。人生曰鹽。鹽在正東方。鹵在正西方。此據一切經音 東方謂之斥。西方謂之鹵。故禹貢兗州海濱廣斥。鄭康成注斥謂地鹹鹵。是本經鹵鹽卽東海之鹽。名醫以生河東鹽池注鹵鹽。與古義違失。陶宏景別錄云。東海北海鹽及河東鹽池。梁益鹽井交廣有南海鹽。西羌有山鹽。胡中有樹鹽。而色類不同。以河東者爲勝。又云黑鹽主腹脹氣滿。胡鹽主耳聾目痛。又云黑鹽。孫真人所云四井鹽。雖皆指涼益之鹽。然考之名醫所注鹵鹽。亦云去五臟腸胃留熱。結氣心下堅。食已嘔逆喘滿。明日目痛。則知東海鹽主治各病。亦與涼

益井鹽同功矣。此服鹽藥法最爲簡易。時俗庸醫爲人治疾。不按古書。不知脈理。但用俗書所謂本草綱目。不知李時珍妄改神農經藥物次序藥性。臆爲增加。其謬實甚。或遇富貴人先投人參。停食阻氣。以致殞命。故古人有不服藥爲中醫之說。謹案漢時知醫者。有淳于意。張仲景。華陀諸人。猶以不服藥爲中醫。今則妄人爲醫。當以不服藥爲上醫矣。鹽既治諸心腹病痛。遠方鄉鄙貧戶。一時不能卒致醫藥。可以如法服之。亦必無所損。千金翼方。世不多見。四庫書亦未及載。故摘錄此條刊布。以廣其傳云。辛未年三月十五日五松居士記。



治 疊 新 方



路 續 德 繆 紅 福 照 重 訂 纍

序

昔大禹鑄鼎象物。使民知神姦而爲之備。後世賴焉。然此皆有形有質。故得按圖而稽之。未若近世蠱之害人。其爲毒也無形。其中人也至烈。而其來也一發不可復制。嗚呼豈不痛哉。蓋南方地氣卑下。溼氣薰蒸。秉其氣者。毒每倍于他方。加以猺苗雜處。俗尚巫鬼。凡諸幻術。皆非意計所及。蓋蠱之由來久矣。余中年爲親負米。浮湘之粵。渡彭蠡以歸。凡洞庭南北。象郡西東。及滇閩邊界。足跡幾遍。計自戊寅迄甲午十七年。往來蠻烟瘴雨中。無日不臨深履薄。予雖幸免斯毒。而竊悲染此毒者。思有以治之而未得也。壬午春道出南寧。於旅肆中得鈔本治蠱新方一書。其言半雜融縣土音。其所抄錄亦魯魚殆半。猝卒未暇訂正也。乙酉丙戌間。客博白之大嶺埠。埠介山澤間。莠民之以蠱流毒者。指不勝屈。其地荒僻鮮醫藥。余心憫焉。爲之按方施藥。應手輒愈。乃取是書通其語言。訂其譌舛。郵寄同人。廣爲流布。今已倦歸故里。桑梓熙恬。民淳物阜。無復中蠱之患。然回思前此求治諸人。呼號匍匐。如在目前。痛定思痛。愈滋疚焉。因復取而校之。而誌其緣起如此。嗚呼。毒之生于天者。吾無如何矣。安得良有司者。取人之所爲蠱。而禁之。而化之哉。是則所謂功不在禹下者矣。道光乙未花朝後三日。澄江漁者繆福照介夫氏序。

治蠱新方

清 路順德纂

繆福照重訂
順德字應侯融縣人
福照字介夫江陰人

蘇荷湯

能治一切蠱症。凡蛇蠱疳蠱。腫脹癲狂癇症。以及一切感冒咳嗽氣逆沖上。肚皮緊急。審係內伏實火。小便黃赤。或服補藥而病加重者。用此湯方加減治之。百發百中。

紫蘇一兩

南薄荷一兩

條參八錢

連翹八錢

生黃芪七錢

當歸一兩

生首烏一兩

白芷一兩

川芎五錢

決明子五錢

槐花一兩

生白芍五錢

柴胡六錢

青蒿一兩

生元版八錢

右十五味爲一劑。水煨服。服三四劑後。病漸減者。加燒酒二兩。同水久煨服。取效更速。又此方每劑加田州三七二錢。更驗。又初服藥不可太急。急則內毒翻跳。病人不安。或大吐大瀉。病愈固速。而病人頗畏。至服藥五六劑。則無妨也。

右服藥一二劑後。內火炎上。大便結祕。口舌熱爛者。去當歸。白芷。川芎。紫蘇。薄荷。加黃柏。黃芩。茯苓。元參。天門冬。澤瀉。石膏。各五錢。酒一茶杯。同水久煨服。小便赤火盛者。加元參。梔子。茯苓。各五錢。帶熱嗽。或咳血者。審係內有實火。紫蘇。薄荷。暫停不用。並除當歸。白芷。川芎。加三七。百合。麥門冬。各一兩。

水煨服。時而傷寒帶寒嗽者，仍用焦薑陳皮洋參丁香當歸川芎杏仁半夏炙黃耆首烏炙甘草。寒在裏則加肉桂等藥一二劑以治其標。嗽漸愈復用蘇荷湯加減以治其本。或人弱帶痢者去條參連翹槐花柴胡生芪青蒿生地紫蘇薄荷決明子加百合附子扁豆淮山藥砂仁白朮乾薑各三錢洋參丁香木香各一錢水煨服。又服蘇荷湯已久蠱毒將淨火退腰痛者去條參連翹生黃芪槐花柴胡青蒿生地決明子生芍藥紫蘇薄荷加廣陳皮五錢或加熟地五錢肉桂二錢焦薑五錢丁香三錢炙甘草三錢杜仲二錢炒白朮三錢酒炒芍藥三錢茯苓一錢水煨服。或病人脾胃虛寒後復中蠱或服蘇荷湯已久蠱毒既淨五臟虛寒則蘇荷湯不可用宜用溫補行氣之藥詳見後篇。

忌喫諸物

狗肉雞鴨雉雞魚蚌螺蝦等物愈後尙要戒一二年。川山甲有鱗等物愈後要戒四年。蛤戒十年蛇終身不可吃。糖甘蔗紅棗黑棗一切生蟲招瘡之物服藥時宜戒愈後可喫。又蘿蔔菜惟中瘡者宜戒愈後可喫。

以上宜戒之物務要嚴爲戒口服藥方驗稍不謹慎病必復翻。

宜喫諸物

筍	豆腐	莧菜	青菜	白菜	菠菜	蒜	蓮藕	紫蘇	薄荷	芥藍	蒂賈	苦瓜	細粉
木耳	薑	茨菇	芋苗	豆角	筍水	每碗放一茶杯	同菜煮吃妙	夏月田內有之殺蛇	解毒	龍眼剥喫	宜成顆		

元眼肉恐有糖
參戒之

荔枝 滴重時惟此
二味可喫

柑 柚 橙 橘 李 藕

棠梨 石榴 葛薯

西瓜 醋 茶

水內之物
服藥後可喫
若未服
蟹惟此可喫
鵝

以上可吃之物或一吃此物則病翻者必在此物內中毒暫戒之愈後可喫

浸筍水法

凡筍皆可浸惟味苦而豔者尤妙筍用淨刀淨砧板切片放瓦罐內用午後水浸之不可吃葷犯嫩糠水將浸過筍不可多後添生筍則添生水

巴豆驅毒散

凡中蛇蠱者肚內或皮內既變蛇或變肉蟹肉龜或變蠍蟲凡遇肚痛時大便結祕少出治方用巴豆一味八歲以上小兒用二粒十二歲以上用三粒大人用六粒將巴豆研末水煨菖蒲滾斟其湯着茶杯內俟其湯將涼帶溫放巴豆末入湯內攪開令病人連湯並末吞喫靜坐片刻作瀉俟其肚內之物瀉盡方可飲食但此藥至奇喫後有瀉十餘次者最後屙出如雞蛋清則不瀉矣若未屙出雞蛋清遽飲茶水瀉即止則毒未淨後必復作但服此藥恐太虧人先買真葵豆細粉四兩煮熟待瀉後即將葵豆粉喫此粉能解巴豆毒或用滾水開蜂蜜喫更妙若喫後又作吐再調稀粥喫必愈服此後仍將蘇荷湯等方加減服數劑洗淨餘毒可也愈後仍戒喫雞鴨魚蝦等物數年

按巴豆一個剝開有三粒兩頭尖者能殺人不可用此方楊生光熊世傳醫愈蛇蠱者數十人藥少價

廉收效又速。又試蛇蠱法。一凡身上皮肉刺痛。或腹內刺痛。喫筍水即暫愈者。或將馬兜鈴一兩。水煨湯服。而病即減者。定是中蠱。血氣健旺者用巴豆方治之。頗捷。人弱者忌用。孕婦忌用此方。

加減蘇荷湯

紫蘇五錢	南薄荷五錢	當歸七錢	川芎五錢	甘草五錢	澤蘭二錢	白芷五錢	首烏五錢
生芪五錢	百合五錢	陳皮二錢	三稜二錢	莪朢二錢	鬱金一錢	木香一錢	丁香一錢
五茄皮五錢							

以上十七味爲一劑。生薑三片爲引。水煨服。

凡中一切蠱者。血氣平和。不受得生地。元參。黃柏。連翹。槐花。青蒿。生芍藥。柴胡等寒涼之劑。又不受得桂附等溫熱之味。用此方服驗。若服此湯後。大便祕結者。仍服蘇荷湯較妥。

蛇蠱

蛇蠱者。方書謂之桃生毒。傳聞山谷間。獵婦或歹人。於端午日。取毒蛇。蜈蚣。蝦蟇。同放一器內。令其自相吞嚥。用其生者研末。同黃泥作丸。包放竹筒內。其泥極腥。放出竹筒外。則見生蛇無數。能少能多。能短能長。能小能巨。能有形能無形。常用生雞蛋飼之。收入則成泥。或將少許蛇泥放路上。人踏過則蛇上人身。或放於茶酒內。與人喫。若酒醉甚。中毒者。戒鹽服藥可愈。

一曰生蛇蠱

有初中蛇蠱如外感症。面帶青色。氣逆氣短。肚皮緊急。兼之咳嗽。小便黃赤。內伏實熱。大便祕結。夜不得臥者。有初中不覺。至數月後。或一年後時而在兩脅皮內痛。時而在兩肩下皮內痛。或數月痛一次。或一月痛一次。或一月痛數次。永不出汗。怕寒。服蘇荷湯後。如有聲走入肚內者。

有在肚內痛。會動會移。痛時則氣欲絕者。

有遍身如風走竄。臥則手脚跳起。靜聽身上有如蟲行者。

有初積爲氣鬱。不順久而結爲血塊。久而成形。或爲蟻蟲。或爲肉蛇。肉鱉。肉龜。或爲有鱗有腳小蛇。或聚散無常。亦有終身止爲痞積。血積。食積。有常處者。

有夜臥忽然皮內。或背或腹。或肩。時有一處微痛。會吸人氣。靜聽之。氣行至其處。則欲絕者。

有吐蟻蟲者。按此症亦有因溼熱食積而生者。與蛇蠱同治。

有在心上脹。口涎出。痛而不移。常屬蟻蟲者。

有在路上踏著者。或卽時肚痛極。或打冷顫。至數月後。小便常黃赤。人漸瘦弱。肚常作痛。凡遇肚痛時。行動則皮內或肚內。有物堅實。夜臥以手按之。肚皮有物擁起。長二三寸。微覺跳動。心煩涎溢。得喫肉則稍止。或移入左脅右脅。則飯食減少。或痛上心。則心脹欲作吐。又此毒在身時。有時無。至年餘。或四五年。則變成肉鱉。肉龜。肉蛇。以作咬者。至蛇老時。或在皮內肚內行咬。有日咬一二十次者。命在頃刻。此時內蛇翻動作咬。則額焦頭痛。通身發熱。如有髮刺蟻咬。夜則更甚。此乃蠱家之外蛇從風而至也。內蛇咬入臟

腑外蛇入毛孔。其蛇無形亦無數。急用雄黃四觔。分作四包。安於病人牀上四角。病人臥則開此四包雄黃。以禦外蛇服藥方應。

一曰陰蛇蠱

初中時或吐或瀉以後。則肚腹膨脹。不想飲食。口極腥。頭面上筋起。如蟲行。蚓行。鼻內如有一二蟲欲不出。乃毒氣沖上。非蟲也。或耳內如有一蟲。亦毒氣也。或肚內如蛇翻有聲。甚則額熱面紅。大便結祕。若酒醉後在酒中受毒者。不獨腸臟青黑。卽肺肝心脾俱染黑氣。急服解毒發毒之藥。受毒重則屎黑輕則屎藍。若不知解藥。則因黑氣而變成黑星。黑星有十顆。則肚內跳動如針刺。有十餘顆。便開成蛇口。如蛇咬狀。咬上心。出恭瀉血。命在旦夕。聞蠱醫云。中此毒者。若不知醫。不出一月必死。又加以癩藥。則人多昏暗。又加以腫藥。則一耳常滿塞。一耳朵少紅厚。如有蟲行狀。服解藥。則黑氣隨屎出。但看食物全不變。如喫菜則屙菜。甚至喫飯則屙成顆飯。則毒淨矣。自此後食物仍變。出恭轉黃。則全愈矣。又毒重頭眩頭痛者。戒葷鹽半月。每殼用茶油清水。煮豆腐加筍水一茶杯。同煮熟。淘飯喫乃驗。

病人有實火。俱用蘇荷湯治之。屢驗至服藥病愈後。忽變內寒。須用十全大補湯。加減治之。

炙黃耆三錢 杜仲三錢

當歸五錢

炙甘草五錢

大熟地三錢 乾薑三錢

茯苓一錢

川芎五錢

丁香一錢

製首烏三錢 陳皮三錢

生芍藥二錢 白芷五錢

蘇子三錢 炒白朮三錢

木香一錢

附子二錢

肉桂一錢

右十八味爲一劑水煨服。

經驗

同姓某年二十餘中蠱。初中時常在心口皮肉刺痛。繼又移上兩胸上兩肩下。皮肉刺痛。繼又移下右脅腰間。皮肉刺痛。初則數月痛一次。後則一月痛一次。歹人謂之剪刀蠱也。病處其皮擁起約四五寸長。痛甚時則兼肚脹。不出恭時而愈。則如無病。常怕寒。永不出汗。越三年餘。因喫雞鴨魚蛤等物。遂大痛。右邊半身刺痛。腰間皮內痛更甚。氣逆欲絕。予令其家人取筍水一碗。煮熱與之吃。吃後痛即止。予曰此中蠱也。彼疑而不信。予用蘇荷湯加酒一兩。同水久煨服。服藥後通身發汗。其病如失。予復用雄黃五錢研末。蒜子二三兩。菖蒲二三兩。搗爛放滾水盃內。令病人用手巾自頭至腳。通身處處洗過。以防外蛇。是夜其人臥靜聽如有蛇頭近身。伸舌覩之。以手摸之。則無所得。遂大驚而哭。次日變成瘡疾。身上又略痛。復用前藥煨服。則如有物會叫。自右脅腰間痛處走入肚內。痛漸減。瘡疾亦愈。連服藥數日。小便鉢內每夜洗淨。次早倒尿。則鉢底有小珠八九顆。大如粟。研開。珠內有血。再服藥。越二三日。則鉢內血珠止有三四顆。再照前方服藥。越數日。則血珠全無。此乃毒氣積成惡血。服解藥。則毒隨小便出也。每兩日一劑。服藥一月而愈。後因同人歹人買肉釀飲。其病忽翻。肚內脹滿。通身刺痛。比前更甚。命在頃刻。照蘇荷湯取服。亦不見效。予思其故。或受歹人陰害。復中蠱也。因大加薄荷二兩。蘇子二兩。白芷二兩。田州三七二錢。當歸一兩。青蒿二兩。生地。生黃耆。柴胡。元參。川芎。槐花條參。連翹。天門冬。天花粉。黃柏各五錢。丁香一錢。木香

一錢。共十九味爲一劑。酒一茶杯同水煨服。一服而愈。此人年二十餘。血氣頗健。故用此重劑。後又將此十九味浸酒。加減兩數。令其人每早晚飲藥酒三四小杯。病遂全愈。

按若在酒內中蟲。則宜喫水藥。斷不可用酒。犯酒必翻。

族子某年十六。肚內左脅常痛。忽又移過肚內右脅痛。或五六日痛一次。或二三日痛一次。或一日痛二次。或走上心痛。則心脹頭熱。滿身發熱。痛時則並不出汗。得喫肉則暫停半日。身上常有蟲行。以手捉之。則無所得。予用蘇荷湯加三七一錢。酒一兩。同水煨服。兼服馬兜鈴二兩爲一劑。水煨服。服一月。吐出黑星十餘顆。次日屙下蛇蟲數條。自後肚亦不痛。但身上之蟲行仍然。予曰。此蛇蟲已愈。瘕蟲未盡淨也。此後但服蘇荷湯。一年全愈。

張某中陰蛇蟲。初時如感冒風寒。四肢有蚓行蟻咬氣逆沖上。誤聽俗醫教其喫蛇一條。于是遍身有蟲走竄。肉大跳。臥則手脚大跳。夜不得臥。危極。肚鳴肚痛。予授以蘇荷湯。酒水煨服。夜即得睡。連服二劑。次夜病翻。不得臥。彼疑藥味寒涼。不肯服。因取洋烟屎泡水喫。夜暫得睡。而病仍未愈。窮於治術。復將蘇荷湯。每劑加田州三七一錢。三日一劑。服藥兩月而愈。

李某子年八九歲。吐蛇蟲不止。夜不得睡。用南薄荷。紫蘇。白芷。當歸。川芎。連翹。青蒿。槐花。生黃耆。柴胡。元參。各二錢。丁香一錢。三七一錢。水煨服數劑而愈。按凡老人幼兒中蟲。常將三七一味切碎。蒸猪肺成豬肉喫。甚妙。