

颐恒®

2012



“鱼，众所欲也；渔，吾所予也；砥砺求索兼得之道。”

——总主编 颐恒

总主编 颐 恒
主 编 颐 恒 刘羽霞

国家执业医师资格考试 口腔助理医师历年考点解析



第四军医大学出版社

国家执业医师资格考试

口腔助理医师历年考点解析

主 编 颀 恒 刘羽霞

第四军医大学出版社·西安

图书在版编目(CIP)数据

口腔助理医师历年考点解析/顾恒,刘羽霞主编. —西安:
第四军医大学出版社, 2012. 1

(国家执业医师资格考试/顾恒主编)

ISBN 978 - 7 - 5662 - 0081 - 5

I. ①口… II. ①顾… ②刘… III. ①口腔科学 - 医
师 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 268974 号

口腔助理医师历年考点解析

主 编 顾 恒 刘羽霞

责任编辑 王 娥

执行编辑 马元怡

出版发行 第四军医大学出版社

地 址 西安市长乐西路 17 号(邮编:710032)

电 话 029 - 84776765

传 真 029 - 84776764

网 址 <http://press.fmmu.sn.cn>

印 刷 西安力顺彩印有限责任公司

版 次 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 1/16

印 张 16.25

字 数 560 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5662 - 0081 - 5/R · 949

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

目 录

授之以鱼，不如授之以渔——顾恒老师答考生问	(1)
口腔助理医师资格考试复习前评估测试卷 (2012)	(3)
第一部分 基础综合	(26)
第一章 口腔解剖生理学	(26)
第二章 口腔组织病理学	(34)
第三章 生物化学	(68)
第四章 药理学	(79)
第五章 卫生法规	(102)
第六章 预防医学	(117)
第七章 医学心理学	(134)
第八章 医学伦理学	(142)
第二部分 专业综合	(147)
第一章 口腔内科学	(147)
第二章 口腔外科学	(171)
第三章 口腔修复学	(202)
第四章 口腔预防医学	(236)
口腔助理医师实践技能考试模拟测试卷 (一)	(247)
口腔助理医师实践技能考试模拟测试卷 (二)	(251)

授之以鱼,不如授之以渔

——颐恒老师答考生问

【颐恒老师导语】

从2007年开始,我有幸到河北、河南、安徽、广东、广西等10余个省市授课,尽管没有给广大口腔专业的考生讲授专业课程,但还是结识了众多的考生并且成了朋友。正是他们为我们每年的图书编写提供了有力的帮助。山西考生郭晶晶发来手机短信:“我们口腔专业的考生最苦了,资料少、信息封闭,想上个辅导班吧,还找不到地方。我周围很多朋友考了三四年,还是过不了。建议您把学习方法、怎样选书、答题技巧都写到书里面去,让更多的基层考生受益。”于是我就把答复众多考生的提问作为本书的前言。

1. 听说这两年考题重复历年真题很少,历年考题还有用吗?

答:事实的确如此,近两年很少看到历年原题的重复,的确让那些指望背原题答案的人大失所望。不过,我们教学团队注意到,涉及历年考题的考点重复率却达到70%以上。所以说历年考题还是最好的练习题,关键是如何看待和使用,其中最关键是要看解释是否到位,是否以新大纲为线索。如果不符合以上标准或者只是单纯罗列一堆考题然后配上一个尚不知是对是错的答案,效果不会好。从命题规律看,大纲新增内容往往是命题的重点,而历年真题没有涉及。并且大纲体系调整后,如果还按照旧大纲的编写思路复习,可能会出现答题思路与新题型不兼容现象。

2. 市面上医考辅导书品种实在太多了,犹如雾里看花,请告诉我们如何配备辅导书?

答:这是一个年年重复的话题,复习用书包括大纲、技能教程、笔讲讲义、习题、真题、模拟试卷等六部分,并且需要备齐。有的考生以为书越多越好,事实上只要找对路研究透彻一套就足够!具体地说,大纲只是个标题,没必要单独研读,因为《指导》都已经全面贯彻大纲内容;技能部分,关键是要看是否与实考接近,有些冠名所谓“指南”,看了大半,还不知道技能的考题是什么模样的(参加过技能考试的最有体会),这类书不看也罢。其中的操作光盘要注意不规范之处;考试指导,最需要用心选择,有的版本打着新大纲的幌子,卖的却是旧酒。尤其是“换”的那部分内容,标题没变,但内容却换了,如果不是专业从事医考辅导的老师,很难发现。尽管近两年考题超纲比例很低很低,对于考执业者还是要系统完整地复习口腔专业本科教材。配套习题则需要火眼金睛,除了要按新大纲次序编写外,考题难度和题型要接近历年考题和反映新大纲的考核目标;真题及解析自然是不二选择,我们更名为“考点解析”,也正是研究命题动向的结果。模拟试卷则一定要赶晚不赶早,4、5月份以前就已经开卖的产品是不可能遵照新大纲的,最可怕的是旧版换新颜(封面)。而8月份刚到就心急火燎地找模拟试卷搞测试者则属于不懂得学习方法和规律的考生,过关希望亦渺茫。总之,无论哪个版本的习题还是真题、模拟试卷,单有答案而没有到位解析的,我们不推荐使用。

3. 过关越来越难,好像书上的每一句话都可能出题,不知道如何着手,有好的复习方法吗?

答:有关学习经验和方法的细节,请注意以下:

(1)改变传统的做题习惯。学校考试试卷涉及选择、名词、问答、填空等各种题型,把大家养成了死记硬背的习惯。应考失败与学习方法不当密切相关。一定要通过本书适应医考的题型。

(2)不要钻难题、偏题。每年考卷难度较大的考题不超过卷面的10%,加之个别科目(如生物化学)复习起来本身就很费时间,倒不如腾出时间和精力用于牢固掌握其他学科知识。

(3)概念清楚,注意提高知识运用能力。做题过程中就会发现五个备选答案总有两个是模糊的,实际就是要求考生概念清楚,不能光靠死记硬背,还必须运用所学知识解决问题。

(4)关注错题,避免再错。错题说明该知识点没有掌握,就是薄弱环节,尤其是差几分没过的考生尤其要注意。搞一个错题本集中起来是一个很好的办法。

(5)注意知识前后连贯,彻底学懂。选A是正确的,那么选B、C、D为什么是错误的,与之相关的知识一定要

学懂学透。前面提到,考点重复率很高,就是同一个考点换一种问法,就难住了众多考生。

(6)一定要重视复习方法,吸收往年考生的经验可以事半功倍。

4. 2012年版《口腔助理医师历年考点解析》有何变化?

答:细心的读者会发现,考点解析丛书名字略有变更,正是这一变更反映了我们多年研究医考试题的成果。所以本书不再是一本单纯全面罗列考题的复习题集,也不是一本把教材或指导中的大段文字搬过来当成解析的“二课本”,更不是一本引导考生猜题的押题试卷,而是全面融入顾恒老师“八步复习法”的精髓进行精心编排。毫不夸张地说,只要把本书研究透彻,过关无忧!仅就考题与答案的编排位置,我们就对数百考生进行调研,并向专业人员进行咨询,最终决定将考题与答案、解析拆分开来编排。也许仍有相当一部分考生喜欢每道考题后面直接跟着答案的编写模式(大部分习题、真题类图书都是这样编排),因为看着方便。但就是这种所谓的“方便”,养成了背答案的习惯,放弃了思考过程,违背了学习的规律,复习效果在不知不觉中打了折扣。我们编写体例改变的目的在于强迫考生必须先思考再看答案和解析,符合学习和记忆的规律。

2012年版绝非单纯地增加题量,而是力争在复习理念上完全与新大纲接轨,在章节编排上与新大纲保持一致,删除了约20%不再列入新大纲考核范围的考题。更主要的是,解析不就答案解释答案,而是全面揭示考点和命题规律。

2011年12月于北京

口腔助理医师资格考试复习前评估测试卷(2012)

第一单元

A1型选择题(1~98题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1. 蛋白质一级结构的主要化学键是
A. 氢键
B. 疏水键
C. 盐键
D. 范德华力
E. 肽键
2. 血糖的主要去路不包括
A. 转变成糖皮质激素
B. 在细胞内氧化分解供能
C. 转变成其他单糖及衍生物
D. 在肝、肌肉等组织合成糖原
E. 转变成非必需氨基酸、甘油三酯等非糖物质
3. 位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径代谢交汇点的化合物是
A. 6-磷酸果糖
B. 1-磷酸葡萄糖
C. 6-磷酸葡萄糖
D. 1,6-磷酸果糖
E. 磷酸二羟丙酮
4. 下列氨基酸属于非必需氨基酸的是
A. 异亮氨酸
B. 蛋氨酸
C. 缬氨酸
D. 色氨酸
E. 丝氨酸
5. 一分子软脂酸(16C)彻底氧化时净生成 ATP 的分子数是
A. 112
B. 114
C. 129
D. 131
E. 146
6. 能作为多种不需氧脱氢酶辅酶成分的维生素是
A. 维生素 A
B. 维生素 D
C. 维生素 PP
D. 生物素
E. 泛酸
7. 酶能加速化学反应的进行,其原理是
A. 降低反应的活化能
B. 降低反应的自由能变化
C. 降低底物的能量水平
D. 向反应体系提供能量
E. 提高产物的能量水平
8. 蛋白质分子中 α -螺旋的特点是
A. α -螺旋为左手螺旋
B. 靠氢键维持的稳定结构
C. 氨基酸侧链伸向螺旋内部
D. 结构中含有脯氨酸
E. 每一螺旋含 3 个氨基酸残基
9. 分子中含有两个高能磷酸键的化合物是
A. ATP
B. ADP
C. AMP
D. UDP
E. CMP
10. 下列氨基酸中属于碱性氨基酸的是
A. 苏氨酸
B. 丝氨酸
C. 赖氨酸
D. 亮氨酸
E. 苯丙氨酸

11. 沃森和克里克提出的 DNA 双螺旋结构模型每旋转一圈的碱基对数是
- 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
12. 具有抗幽门螺杆菌作用,并可抑制胃酸分泌的药物是
- 法莫替丁
 - 西咪替丁
 - 雷尼替丁
 - 哌化西平
 - 奥美拉唑
13. 肌肉组织中氨基酸脱氨基的主要方式是
- 转氨基作用
 - 氧化脱氨基作用
 - 联合脱氨基作用
 - 嘌呤核苷酸循环
 - 非氧化脱氨基作用
14. 维生素 K 不用于的出血类型是
- 创伤性
 - 新生儿
 - 梗阻性黄疸
 - 长期应用广谱抗生素
 - 过量使用水杨酸类
15. 具有广谱抗菌作用的抗结核药是
- 异烟肼(INH)
 - 链霉素(SM)
 - 利福平(RFP)
 - 吡嗪酰胺(PZA)
 - 乙胺丁醇(EMB)
16. 对青霉素易产生耐药性的细菌是
- 白喉杆菌
 - 肺炎球菌
 - 脑膜炎球菌
 - 溶血性链球菌
 - 金黄色葡萄球菌
17. 可用于治疗尿崩症的利尿药为
- 呋塞米(呋喃苯胺酸)
 - 依他尼酸
 - 氨苯蝶啶
 - 氢氯噻嗪
 - 螺内酯
18. 阿托品用于麻醉前给药的目的是
- 抑制呼吸道腺体分泌
 - 解除胃肠平滑肌痉挛
 - 加快心率
 - 抑制汗腺分泌
 - 松弛骨骼肌
19. 药物产生副作用的药理学基础为
- 药物的安全范围小
 - 机体对药物过敏
 - 药物的选择性低
 - 用药剂量过大
 - 用药时间过长
20. 导致牙周炎临床症状的主要病理变化是
- 牙龈出血与牙齿移位
 - 牙周袋形成与牙周溢脓
 - 牙周袋形成与牙槽骨吸收
 - 牙周膜间隙增宽与牙槽骨吸收
 - 牙周膜间隙变窄与牙槽骨吸收
21. 普鲁卡因穿透力较弱,不宜用于
- 硬膜外麻醉
 - 浸润麻醉
 - 传导麻醉
 - 表面麻醉
 - 蛛网膜下腔麻醉
22. 面神经主干在茎乳孔附近发生分支,分布于
- 镫骨肌,味觉纤维,泪腺
 - 耳后肌,味觉纤维,二腹肌
 - 耳后肌,泪腺,下颌舌骨肌
 - 耳后肌,二腹肌,茎突舌骨肌
 - 镫骨肌,茎突舌骨肌,下颌舌骨肌
23. 上前牙的牙体长轴向近中倾斜角度由小到大排列为
- 中切牙,侧切牙,尖牙
 - 中切牙,尖牙,侧切牙
 - 侧切牙,中切牙,尖牙
 - 尖牙,侧切牙,中切牙
 - 尖牙,中切牙,侧切牙
24. 以下组织中含味蕾的是
- 硬腭黏膜
 - 舌背黏膜
 - 舌腹黏膜
 - 颊黏膜
 - 唇黏膜
25. 翼颌间隙向后可通向
- 颊间隙
 - 颞深间隙
 - 腮腺间隙
 - 翼腭间隙

- E. 咽旁间隙
26. 下颌中切牙具有唇舌向两个根尖孔的只有
- 1%
 - 3%
 - 5%
 - 7%
 - 9%
27. 根管口最大,且呈圆形的是
- 上颌第一磨牙近中颊根
 - 上颌第一磨牙远中颊根
 - 下颌第一磨牙远中根
 - 下颌第一磨牙近中根
 - 上颌第一磨牙腭根
28. 形成牙髓的组织是
- 上皮根鞘
 - 牙乳头
 - 上皮隔
 - 成釉器
 - 牙囊
29. 一对唾液腺中,下颌下腺分泌量约占总量的
- 45%
 - 55%
 - 65%
 - 75%
 - 85%
30. 牙的萌出时间是指牙冠
- 发育开始的时间
 - 钙化开始的时间
 - 完整形成的时间
 - 达到咬合的时间
 - 破龈而出的时间
31. 上颌第一磨牙髓室底位于颈缘
- 冠方 0.5mm 处
 - 冠方 1.0mm 处
 - 龈方 1.0mm 处
 - 龈方 2.0mm 处
 - 冠方 2.0mm 处
32. 在舌骨舌肌的浅面,自上而下依次排列着
- 舌神经,舌下神经,颌下腺导管
 - 舌神经,颌下腺导管,舌下神经
 - 舌下神经,舌神经,颌下腺导管
 - 颌下腺导管,舌下神经,舌神经
 - 舌下神经,颌下腺导管,舌神经
33. 正中殆位又称为
- 牙位
 - 肌位
 - 姿势位
 - 铰链位
 - 正中关系位
34. 正常结合上皮的组织学特点是
- 无角化,有上皮钉突
 - 无角化,无上皮钉突
 - 正角化,有上皮钉突
 - 不全角化,有上皮钉突
 - 不全角化,无上皮钉突
35. 釉质龋透明层的形成原因是
- 吸收
 - 变性
 - 坏死
 - 增生
 - 脱矿
36. 下颌骨髁突的结构特点是
- 内外径长,前后径短;前斜面大,后斜面小
 - 内外径长,前后径短,前、后斜面大小相似
 - 内外径长,前后径短;前斜面小,后斜面大
 - 内外径短,前后径长;前斜面小,后斜面大
 - 内外径短,前后径长;前、后斜面大小相似
37. 以下矿化程度最低的牙本质为
- 小管周牙本质
 - 小管间牙本质
 - 小球间牙本质
 - 修复性牙本质
 - 继发性牙本质
38. 因致畸因子影响,面部突起联合失败,导致面部畸形的时间是胚胎
- 第 6 周和第 7 周
 - 第 8 周和第 9 周
 - 第 10 周和第 11 周
 - 第 12 周和第 13 周
 - 第 14 周和第 15 周
39. 穿髓孔大,龋洞内充满息肉组织的变化见于
- 急性浆液性牙髓炎
 - 急性化脓性牙髓炎
 - 慢性增生性牙髓炎
 - 慢性溃疡性牙髓炎
 - 慢性闭锁性牙髓炎
40. 口腔扁平苔藓的主要病理变化是
- 棘层内疱
 - 角质栓形成
 - 上皮异常增生
 - 固有层淋巴细胞浸润带
 - 黏膜下层淋巴细胞浸润带

41. 下列疾病中属于心身疾病的是
- A. 抑郁症
 - B. 消化性溃疡
 - C. 精神分裂症
 - D. 大叶性肺炎
 - E. 精神发育迟带
42. 下列涎腺中属纯黏液腺的是
- A. 腮腺
 - B. 腭腺
 - C. 味腺
 - D. 舌下腺
 - E. 颌下腺
43. 饮水的适宜氟浓度一般应保持在
- A. 2.1 ~ 2.5mg/L
 - B. 1.6 ~ 2.0mg/L
 - C. 1.1 ~ 1.5mg/L
 - D. 0.5 ~ 1.0mg/L
 - E. 0.1 ~ 0.4mg/L
44. 心理评估的常用方法,不包括
- A. 前瞻法
 - B. 观察法
 - C. 会谈法
 - D. 作品分析法
 - E. 心理测验法
45. 多数情况下,无上皮衬里的囊肿是
- A. 牙源性角化囊肿
 - B. 甲状舌管囊肿
 - C. 含牙囊肿
 - D. 鳃裂囊肿
 - E. 黏液囊肿
46. 下列不属于医学伦理学基本原则的是
- A. 团结协作原则
 - B. 不伤害原则
 - C. 有利原则
 - D. 尊重原则
 - E. 公正原则
47. 医疗机构的医务人员违反《献血法》规定,将不符合国家标准的血液用于患者,尚未构成犯罪的,由卫生行政部门给予的行政处罚是
- A. 警告
 - B. 罚款
 - C. 责令改正
 - D. 吊销执业证书
 - E. 没收非法所得
48. 能将蔗糖合成葡聚糖的酶是
- A. 烯醇酶
 - B. 细菌溶解酶
 - C. 蛋白溶解酶
 - D. 唾液淀粉酶
 - E. 葡糖基转移酶
49. 医疗机构发现甲类传染病时,对疑似患者在明确诊断前,应在指定场所进行
- A. 访视
 - B. 留验
 - C. 医学观察
 - D. 就地诊验
 - E. 单独隔离治疗
50. 对于人感染高致病性禽流感患者应当采取的预防、控制措施是
- A. 为甲类传染病,按照甲类处理
 - B. 为乙类传染病,按照甲类处理
 - C. 为丙类传染病,按照丙类处理
 - D. 为丙类传染病,按照乙类处理
 - E. 为乙类传染病,按照乙类处理
51. 现况调查的目的是通过调查研究了解一个地区人群当前
- A. 患病情况
 - B. 发病情况
 - C. 死亡情况
 - D. 病死情况
 - E. 罹患情况
52. 执业助理医师贺某调到县团委工作3年后,回到乡卫生院担任院长职务,拟继续从事临床医疗工作。依据《执业医师法》规定,贺某应当经主管部门考核合格后申请
- A. 执业注册
 - B. 注销注册
 - C. 变更注册
 - D. 重新注册
 - E. 再次注册
53. 在医患双方的道德关系中,起主导作用的是
- A. 患者的就医心理
 - B. 医生的道德修养
 - C. 患者的文化水平
 - D. 医生的职称高低
 - E. 患者的情绪
54. 智力发展的关键期在
- A. 3岁前
 - B. 4岁前
 - C. 5岁前
 - D. 6岁前
 - E. 7岁前

55. 需要证明一种中药牙膏对牙周疾病的预防效果, 实验设计中不包括
- A. 人群选择
 - B. 样本含量
 - C. 实验分组
 - D. 空白剂选择
 - E. 历史常规资料分析
56. 根面龋最易找到的细菌是
- A. 乳杆菌
 - B. 螺旋体
 - C. 放线菌
 - D. 范永菌
 - E. 变形链球菌
57. 平滑面浅龋临床表现的描述, 正确的是
- A. 邻面龋斑常呈肾形
 - B. 龋病病变呈口小底大的形状
 - C. 龋斑不可能自行恢复
 - D. 龈缘处的龋斑呈圆形
 - E. 平滑面浅龋常发生在邻面接触点的冠方
58. 氟牙症的临床表现, 错误的是
- A. 一般发生在恒牙
 - B. 氟牙症的釉质硬度增加
 - C. 氟牙症常发生在同一时期萌出的同名牙上
 - D. 釉质上有白垩色到褐色的斑块
 - E. 机体对氟化物的感受性存在个体差异
59. 切牙和尖牙邻面未损及切角的龋损所制备的窝洞称为
- A. 第Ⅰ类洞
 - B. 第Ⅱ类洞
 - C. 第Ⅲ类洞
 - D. 第Ⅳ类洞
 - E. 第Ⅴ类洞
60. 用温度测验牙髓活力时, 应利用
- A. 低于10℃或高于30℃的温度
 - B. 低于10℃或高于40℃的温度
 - C. 低于20℃或高于50℃的温度
 - D. 低于20℃或高于40℃的温度
 - E. 低于30℃或高于60℃的温度
61. 不符合氢氧化钙性能的是
- A. 对牙髓刺激性小
 - B. 有良好的隔垫性
 - C. 碱性
 - D. 无抗菌作用
 - E. 溶于唾液
62. 叩诊的注意事项之一是
- A. 用尖端金属器械
 - B. 诊前不应告知患者
 - C. 先做重叩, 后做轻叩
 - D. 全口牙均须进行检查
 - E. 先叩对照牙, 后叩患牙
63. 银汞合金充填发生迟缓性膨胀的原因是
- A. 研磨时间过长
 - B. 汞含量过少
 - C. 银含量过多
 - D. 充填压力过大
 - E. 水分渗透入银汞合金
64. 畸形中央尖最多发生于
- A. 下颌第一前磨牙
 - B. 下颌第二前磨牙
 - C. 上颌第二前磨牙
 - D. 上颌第一磨牙
 - E. 下颌第一磨牙
65. 龈下刮治中, 刮除牙石时刮治器工作面与根面的最佳角度为
- A. 0度
 - B. 30度
 - C. 45度
 - D. 80度
 - E. 90度
66. 根据病变程度分类的是
- A. 急性龋
 - B. 猖獗龋
 - C. 邻面龋
 - D. 继发龋
 - E. 中龋
67. 牙髓炎患者的应急处理是
- A. 消炎止痛
 - B. 开髓引流
 - C. 针灸止痛
 - D. 安抚治疗
 - E. 麻醉止痛
68. 牙髓炎的主要感染途径是
- A. 外伤
 - B. 龋齿
 - C. 牙隐裂
 - D. 酸蚀症
 - E. 楔状缺损
69. 临床上, 经过治疗也不能保存的年轻第一恒磨牙最佳拔除时间范围宜在
- A. 6~8岁
 - B. 8~10岁
 - C. 10~12岁

- D. 12 ~ 14 岁
E. 15 岁以上
70. 牙髓温度测验的结果表示为
A. 0° 、 1° 、 2° 、 3°
B. 20、30、60、80
C. (-)、(±)、(++)、(+++)
D. 正常、敏感、迟钝、无反应
E. 无痛、一过性痛、持续痛、剧痛
71. 复发性口腔溃疡较少发生的部位是
A. 颊
B. 腭弓
C. 硬腭
D. 软腭
E. 舌缘
72. 嵌入性牙脱位多见于
A. 错位牙
B. 松动牙
C. 牙周病患牙
D. 乳牙和年轻恒牙
E. 牙冠较短的恒牙
73. 间接盖髓术的适应证是
A. 中龋
B. 浅龋
C. 意外穿髓
D. 去腐未净穿髓
E. 可复性牙髓炎
74. 急性骨膜下脓肿的典型临床表现是
A. 阵发性疼痛
B. 牙髓无活力
C. 痛不能定位
D. 咬紧牙齿痛可缓解
E. 移行沟变平, 扪痛并有深部波动感
75. 慢性根尖周炎的最重要的临床表现是
A. 深龋洞已穿髓
B. X 线片根尖周透射区
C. 叩痛(+)、I 度松动
D. 热测出现迟缓反应
E. 患牙咬物不适
76. 慢性牙周炎(成人牙周炎)早期的特点为
A. 牙根暴露
B. 多数牙齿松动
C. 有根分叉病变
D. 牙槽骨嵴顶吸收
E. 经常发生牙周脓肿
77. V 类洞制备的要点包括
A. 倒凹固位应做于龈轴和殆(切)轴线角处
B. 倒凹固位应做于近中轴和远中轴线角处
C. 近远中壁和釉柱垂直
D. 对抗力形要求高
E. 洞壁与轴壁平行
78. 临床上急性化脓性根尖周炎的诊断可分为
A. 根尖脓肿、骨髓炎、骨膜下脓肿
B. 根尖肉芽肿、根尖脓肿、根尖周囊肿
C. 急性根尖炎、牙槽脓肿、骨膜下脓肿
D. 根尖脓肿、骨膜下脓肿、黏膜下脓肿
E. 急性根尖炎、慢性根尖炎、慢性牙槽脓肿
79. 下列为白斑的临床分型, 除外
A. 颗粒型
B. 增殖型
C. 均质型
D. 溃疡型
E. 疣状型
80. 根管预备前必须完成的重要步骤是
A. 测定工作长度
B. 根管内清洗
C. 根管口预备
D. 拍 X 线片
E. 进入髓腔
81. 牙周病的局部促进因素如下, 除外
A. 牙石
B. 咬合创伤
C. 银汞悬突
D. 甜饮料
E. 食物嵌塞
82. 牙槽骨不平吸收时形成的牙周袋通常为
A. 骨上袋
B. 骨内袋
C. 复杂袋
D. 1 壁骨袋
E. 4 壁骨袋
83. 边缘性龈炎的表现有
A. 龈沟探诊无出血
B. 牙槽骨吸收
C. 牙龈质韧
D. 龈缘菲薄
E. 龈缘色红
84. 根尖周炎的主要病因是
A. 免疫因素
B. 物理因素
C. 化学因素
D. 感染因素
E. 特发因素

85. 妊娠期龈炎的主要临床表现是
- 疼痛
 - 牙龈质地韧
 - 牙龈单个瘤样突起
 - 牙龈基本为粉红色
 - 常在妊娠后1个月出现
86. 急性牙髓炎临床表现的特点是
- 阵发性自发痛
 - 冷水入洞后痛
 - 患牙有深龋洞
 - 冷测一过性敏感
 - 热测引起迟缓痛
87. 逆行性牙髓炎不同于其他牙髓炎的临床表现特点是
- 冷测缓解疼痛
 - 有阵发性自发痛
 - 热测引起迟缓痛
 - 深及根尖的牙周袋
 - Ⅱ度松动,叩痛(++)
88. 牙周病的最基本治疗应包括
- 松牙周定术
 - 牙龈切除术
 - 牙周翻瓣术
 - 调磨接触面
 - 清除菌斑和牙石
89. 洁治术的目的是
- 漂白牙齿
 - 清除根面牙骨质
 - 清除袋壁肉芽组织
 - 清除龈上牙石和菌斑
 - 对根面进行生物预备
90. 牙周脓肿的特点是
- 脓肿弥散
 - 牙髓无活力
 - 牙齿不敢咬合
 - X线片上根尖区有阴影
 - 脓肿局限于牙周袋壁区
91. 乳磨牙髓室底解剖特点是
- 与恒牙厚度一致,侧支根管少
 - 较恒牙厚,侧支根管少
 - 较恒牙厚,侧支根管多
 - 较恒牙薄,侧支根管少
 - 较恒牙薄,侧支根管多
92. 患龈炎时菌斑的变化如下,除外
- 菌斑量增加
 - 革兰阳性球菌占优势
 - 菌斑内细菌组成改变
 - 菌斑内细菌比例变化
 - 菌斑内细菌数目增加
93. 临床上对乳牙近髓深龋的治疗最好采用
- 开髓术
 - 根管治疗
 - 姑息治疗
 - 冠髓切断术
 - 直接盖髓术
94. 乳尖牙过早拔除易造成
- 恒尖牙异位萌出
 - 恒侧切牙异位萌出
 - 恒中切牙异位萌出
 - 第一前磨牙异位萌出
 - 第二前磨牙异位萌出
95. 慢性根尖周囊肿最重要的诊断依据之一是
- 牙髓无活力
 - 咬物异样感
 - 根尖周亮区白线
 - 根尖呈燕尾状吸收
 - 牙龈瘻管挤出脓液
96. 萌出过早的乳牙多见于
- 上乳前牙
 - 上乳尖牙
 - 下乳前牙
 - 下乳尖牙
 - 第一乳磨牙
97. 口服雷公藤适用于
- 复发性口腔溃疡
 - 药物过敏性口炎
 - 接触性口炎
 - 扁平苔藓
 - 白斑
98. 有瘻性慢性根尖周炎的治疗应是
- 瘻管搔刮
 - 根管治疗
 - 根尖手术
 - 塑化治疗
 - 患牙拔除

A2 型选择题 (99 ~ 118 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

99. 女,6岁。舌背部出现不定的圆形线斑,检查:舌背中部偏左有一圆形丝状乳头剥脱区,色红、微凹陷,无疼痛,直径约10mm,边缘发白,微凸出,舌活动正常。全身未见异常。应诊断为
- A. 药物过敏性口炎
B. 球菌性口炎
C. 接触性口炎
D. 扁平苔藓
E. 地图舌
100. 男,35岁。2个月前开始右上后牙遇冷热酸痛,咀嚼不适,咬到牙齿某一点时引起剧痛,近一周出现阵发自发痛。检查发现 $\overline{6}$ 叩痛明显,牙齿不松动,遇冷热引起疼痛,未发现龋坏,咬诊出现定点疼痛。根据患者的症状和临床检查,引起患牙疼痛的最可能原因是
- A. 牙周炎
B. 牙隐裂
C. 牙震荡
D. 重度磨损
E. 咬合创伤
101. 医疗保健人员未按规定报告传染病疫情,造成传染病传播、流行或者其他严重后果,尚未构成犯罪的,由卫生行政部门给予的行政处分是
- A. 警告、记过或记大过
B. 记过、记大过或降级
C. 记大过、降级或撤职
D. 降级、撤职或开除
E. 撤职、开除或拘留
102. 患者右侧牙剧痛来急诊。查见右上第一磨牙咬合面龋深,叩痛(+).要做温度测验时,最好的对照牙应选
- A. 右下第一磨牙
B. 左上第一磨牙
C. 左下第一磨牙
D. 右上第二磨牙
E. 左上第二磨牙
103. 医师中止执业活动二年以上,当其中止的情形消失后,需要恢复执业活动的,应当经所在地县级以上卫生行政部门委托的机构或组织考核合格,并依法申请办理
- A. 准予注册手续
B. 中止注册手续
C. 重新注册手续
D. 变更注册手续
E. 注销注册手续
104. 一糖尿病患者,足部有严重溃疡,经治疗病情未减轻,并且有发生败血症的危险。根据会诊意见,主管医生在征得患者同意的前提下,对患者实施了截肢术。术后,患者情况良好。这种处置符合
- A. 公益原则
B. 公正原则
C. 有利原则
D. 不伤害原则
E. 经济价值原则
105. 男,10岁。右下后牙疼痛多日。右下第一磨牙龋,已穿髓,探痛明显,叩(±),温度测验敏感,牙龈未见瘘管。临床治疗宜采用
- A. 塑化术
B. 干髓术
C. 盖髓术
D. 活髓切断术
E. 牙髓摘除术
106. 某职工,竞争意识强,总想胜过他人;老觉时间不够用,说话快、走路快;脾气暴躁,容易激动;常与他人意见不一致。其行为类型属于
- A. A型行为
B. B型行为
C. C型行为
D. AB混合型行为
E. BC混合型行为
107. 某男,40岁。经常盲目行动,处理问题优柔寡断,办事虎头蛇尾,半途而废,这种一贯行为特征为
- A. 行为特征
B. 理智特征
C. 情绪特征
D. 态度特征
E. 意志特征
108. 女,20岁。因左下后牙冷热痛而就诊,无自发痛。检查发现 $\overline{6}$ 深龋,探痛,但未穿髓,无叩痛。在治

- 疗该深龋时,错误的操作是
- 由于窝洞较深,洞壁不必修直
 - 为避免穿髓,可保留少量软化牙本质
 - 用大球钻以先中央后四周的方式逐步去除腐质
 - 可疑有牙髓暴露而又不能肯定时应做安抚治疗观察
 - 接近髓角时,如患者特别敏感,应注意检查有无牙髓暴露
109. 对含氟牙膏的防龋效果进行研究。将若干名学生随机分成两组,一组用含氟牙膏,另一组用普通牙膏,三年后观察其防龋效果。这种研究方法为
- 历史常规资料分析
 - 病例对照研究
 - 横断面研究
 - 试验研究
 - 群组研究
110. 女,10岁。左下第一磨牙咬合面龋坏。备洞时意外露髓,约针尖大小。临床处理应选择
- 干髓术
 - 根管治疗
 - 活髓切断术
 - 直接盖髓术
 - 间接盖髓术
111. 女,28岁。左下后牙进食痛已半年,平时食物进洞后痛。查左下第一磨牙咬合面龋深,洞内粉红色息肉状物,探略敏感,叩痛(+),冷测迟钝,可探及牙周袋。该患牙诊断最可能是
- 深龋
 - 牙周息肉
 - 慢性根尖周炎
 - 慢性增生性牙髓炎
 - 慢性溃疡性牙髓炎
112. 男,25岁。咬苹果等物时出血1年。检查:牙石(+),全口牙的牙龈缘及乳头轻度暗红,探诊出血,探诊深度3~4mm,但无附着丧失。最可能的诊断是
- 坏死性龈炎
 - 慢性牙周炎
 - 边缘性龈炎
 - 局限性侵袭性牙周炎
 - 广泛性侵袭性牙周炎
113. 为了解某地区50岁中年人患牙周炎的情况,要求抽样误差为10%,从该地区中心医院病历中随机抽取1000份病历进行调查,得患病率达80%,最后发现检查结果与实际情况不符,这种误差属于
- 随机误差
 - 信息偏倚
 - 选择性偏性
 - 检查者偏性
 - 无应答偏性
114. 男,60岁。下前牙松动1年。检查:两个下中切牙松动Ⅰ度,牙石(++),探诊深度7mm。全口其他牙牙石(+),探诊深度普遍4~6mm,附着丧失3~4mm。最可能的诊断为
- 慢性牙周炎
 - 增生性龈炎
 - 边缘性龈炎
 - 牙周牙髓联合病变
 - 广泛性侵袭性牙周炎
115. 男,25岁。外地民工,车祸后昏迷被送某医院急诊室,诊断为多发性骨折伴出血,需马上手术。医生要求患者家属签字并缴纳手术押金后方能手术,因此延误了患者的治疗。医生的做法明显侵犯了患者的
- 平等权
 - 监督权
 - 知情权
 - 隐私保密权
 - 生命健康权
116. 男,8个月。上前牙未萌出。体检颌面部发育正常,对称,上颌左右乳中切牙局部牙龈颜色正常,扪无明显隆起,临床处理应选择
- 拍曲面断层片
 - 增加营养
 - 切开导萌
 - 局部用药
 - 观察
117. 女,30岁。口腔内黏膜破溃、疼痛两天。检查:下唇黏膜糜烂面周围充血,同时口角下部皮肤有一圆形红斑,中心有水疱,边缘充血。患者自述:口角处曾经出现过同样的红斑,两天前因感冒服用退烧药后,再次出现。该病应诊断为
- 药物过敏性口炎
 - 接触性口炎
 - 球菌性口炎
 - 疱疹性口炎
 - 扁平苔藓
118. 女,30岁。牙龈易出血2个月。检查:全口牙龈色红、松软光亮,右下尖牙间的龈乳头肥大成瘤

样,鲜红色,有蒂。最可能的诊断是

- A. 白血病的龈病损
- B. 急性牙龈脓肿

C. 妊娠期龈炎

- D. 边缘性龈炎
- E. 牙周脓肿

B1 型选择题 (119 ~ 143)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(119 ~ 121 题共用备选答案)

- A. 口泰
- B. 苯妥英钠
- C. 先锋霉素
- D. 阿莫西林
- E. 米诺环素

- 119. 能抑制细菌黏附和生长的是
- 120. 能引起牙龈增生的药物是
- 121. 近年来选用于牙周组织急性炎症期控制感染的是

(122 ~ 124 题共用备选答案)

- A. 病损确立期
- B. 早期病变
- C. 始发期
- D. 进展期
- E. 修复期

- 122. 表现为活动期病理变化的是牙周炎发展过程的
- 123. 急性渗出性炎症反应出现在牙周炎发展过程的
- 124. 表现为宿主应答反应的综合活动期的是牙周炎发展过程的

(125 ~ 127 题共用备选答案)

- A. 年轻恒牙早期急性牙髓炎
- B. 年轻恒牙牙髓充血
- C. 年轻恒牙晚期牙髓炎
- D. 乳牙牙髓坏死
- E. 年轻恒牙根尖周病

下列治疗适用于

- 125. 糊剂根管充填
- 126. 间接盖髓术
- 127. 活髓切断术

(128 ~ 130 题共用备选答案)

- A. 异丙肾上腺素
- B. 特布他林
- C. 肾上腺素

D. 氨茶碱

E. 吗啡

- 128. 既能用于支气管哮喘,又能用于心源性哮喘的药物是
- 129. 既能扩张支气管平滑肌,又能减轻支气管黏膜水肿的药物是
- 130. 只能用于心源性哮喘,不能用于支气管哮喘的药物是

(131 ~ 132 题共用备选答案)

- A. 6 个月
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年
- E. 4 年

- 131. 普通处方、急诊处方、儿科处方的保存期是
- 132. 麻醉药品处方的保存期是

(133 ~ 135 题共用备选答案)

- A. 上颌尖牙
- B. 上颌第一磨牙
- C. 下颌第一磨牙
- D. 上颌第一乳磨牙
- E. 下颌第二乳磨牙

- 133. 有三个等大颊尖的是
- 134. 殆面有明显斜嵴的是
- 135. 唇面似圆五边形的是

(136 ~ 137 题共用备选答案)

- A. 粮谷类
- B. 酱菜类
- C. 绿叶菜
- D. 干豆、花生
- E. 动物肝、肾、牛奶

- 136. 膳食中维生素 A 的主要来源是
- 137. 膳食中维生素 B₁ 的主要来源是

(138 ~ 139 题共用备选答案)

- A. 下颌第一磨牙
- B. 上颌第一磨牙
- C. 对称性的牙
- D. 上颌侧切牙
- E. 全口牙

138. 在恒牙列中患龋率最高的牙是

139. 釉质发育不全常发生在

(140 ~ 141 题共用备选答案)

- A. I 型单纯疱疹病毒
- B. 草绿色链球菌
- C. 变形链球菌

D. 白色念珠菌

E. 螺旋体

140. 膜性口炎的病原菌是

141. 鹅口疮的病原菌是

(142 ~ 143 题共用备选答案)

- A. 木馏油
- B. 樟脑酚
- C. 碘仿糊剂
- D. 甲醛甲酚
- E. 氢氧化钙

142. 根尖孔破坏的感染渗出根管封药用

143. 根尖孔未形成的年轻恒牙根管封药用

A3/A4 型选择题 (144 ~ 150 题)

答题说明

以下提供若干个案例,下设若干道考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考题下面的五个备选答案中选择一个最佳答案。

(144 ~ 145 题共用题干)

女,60岁。牙床肿痛2天。检查:左下第一磨牙颊侧牙龈肿胀,有波动感,叩痛轻,局限,有深牙周袋,热测反应同对照牙。

144. 该患牙最可能的诊断是

- A. 根分叉病变
- B. 边缘性龈炎
- C. 慢性牙周炎
- D. 牙槽脓肿
- E. 牙周脓肿

145. 当日的治疗措施是

- A. 拔牙
- B. 龈下刮治
- C. 脓肿切开引流
- D. 开髓、拔髓引流
- E. 急性期翻瓣手术

(146 ~ 148 题共用题干)

男,60岁。左侧后牙自发痛2天。一年多来该侧后牙遇冷或热痛。2天前开始,夜痛不能入睡。查6 $\overline{6}$ 龋深,探敏感,叩痛(+),不松动。冷测引起剧痛。

146. 该患牙的诊断最可能是

- A. 深龋
- B. 三叉神经痛
- C. 急性牙髓炎
- D. 可复性牙髓炎
- E. 慢性牙髓炎急性发作

147. “夜痛”的性质是

- A. 激发痛
- B. 自发痛
- C. 牵涉性痛
- D. 放散性痛
- E. 迟缓性疼痛

148. 该患牙的治疗是

- A. 根管治疗
- B. 盖髓治疗
- C. 干髓治疗
- D. 充填治疗
- E. 射频治疗

(149 ~ 150 题共用题干)

男,14岁。上颌牙龈溢脓月余。1 $\overline{ML}$ 龋,无探痛,叩痛(±),温度测无反应,唇侧牙龈根尖处见一瘘管,挤压少量溢脓,松动(-)

149. 临床诊断应为

- A. 根尖周炎
- B. 牙髓坏死
- C. 牙周炎
- D. 残髓炎
- E. 龋齿

150. 临床治疗宜采用

- A. 活髓切断术
- B. 姑息治疗
- C. 根管治疗