


春天
秋步
夏真
正原





天步真原

薛祚祚撰

中華民國二十五年十二月初版

發行人

王雲五

印刷所

上海河南路
商務印書館

發行所

上海及各埠
商務印書館

編初成集書叢

種一他其及原真步天

編主五雲王

壽

四庫全書提要

天步真原一卷國朝薛鳳祚所譯西洋穆尼閣法也。鳳祚有聖學心傳已著錄。順治中穆尼閣寄寓江寧喜與人談算術而不招人入耶穌會。在彼教中號爲篤實君子。鳳祚初從魏文魁游。主持舊法。後見穆尼閣始改從西學。盡傳其術。因譯其所說爲此書。其法專推日月交食。中間繪弧三角圖三。一則有北極出地。有日距赤道。有時刻而求高弧。一則有日距天頂。有正午黃道。有黃道與子午圈相交之角。而求黃道高弧交角。一則有黃道高弧交角。有高下差。而求東西南北二差。未繪日食食分一圖。鳳祚譯是書時新法初行。又中西文字輾轉相通。故詞旨未能盡暢。梅文鼎嘗訂証其書。稱其法與崇禎新法算書有同有異。其似異而同者布算之法對數之表與算書迥別。然得數無二。惟黃道春分二差。則根數大異。非測候無以斷其是非。然其書在未修數理精蘊之前錄而存之。猶可以見步天之術由疏入密之漸也。

大西東來應加一日日數末一日未成應減二算對仍依原數平朔中積月距日平行表總計各旬周及日數平行度分以減全周得全周餘度又以距日平行表取近小度數求

日時分並加于旬周日數爲平朔中積日分

如先得本年月朔望策只以朔望策遞加平朔免積日之煩

望策一十四日十八小時二十二分○二秒朔策倍之二十九日一十二小時四十四分○四秒

以中積入表求時分

以中積入表求春分平行卽以春分平行爲引數求加減

以中積入表求日平行

以中積入表求日心平行卽以心行爲引數求心差加減及比例分

以中積入表求高行以上段所得心差加減之爲真高行

以日平行減真高爲實引

以實引入表求日初均求餘分

以比例及餘分求次均度

以初均次均度加減日平行爲實經又加減春分爲日自春分實經

以中積入表求月距日度分兩倍之卽月心平行

以月心行入表求心差加減及比例分。

以月自行加減心差爲月實引。

以月實引入表求月初均度及餘分。

以比例餘分求次均。

以日平并月距日行得月平行。以加減初次均爲月實經。又加減春分差爲月自春分實經。

求平會離度分日月相距弧

太陽均度與太陰均度。若一加一減二均度相加。得平會離正會度分。若俱加或俱減。以小減大。其餘數即平會離正會度分。

求日月相距時刻

以太陰實引數入表取月一時行度分。若無正度。以上段平會離正會度分用比例法。用三率法當行幾時。爲日月相距時刻。

日月在前在後。日月均度或俱加。加大者在前。或俱減。減小者在前。若加減不同。即減者在前。

月在日前。平會比實會先到。日在月前。平會比實會後到。

相距時刻加減。平會先到。日月相距時刻加實會先到。日月相距時刻減。以加減平朔中積日分變時

分爲正會時刻。

試法真否

以正會時刻再算積日。

時分變日分。

日春分平行及加減。

日平行。

日心之平行及加減及比例。

日高行及真高行。

日實引數。

日加減度及餘分。

日次均。

日實經及自春分實經。

月距日平行及心平行。

月心差及比例分。

月平引及實引。

月加減均度及餘分。

月次均

月平行實經及自春分實經。

時分變日以下十六法皆同前。惟月距日平行算于太陽實經之後與上法異。前後二算太陽距太陰度差在三十秒以下即可用。若差多再算。

再算法

太陰實引數取月一時行用三率法。一率月一時行分。二率一時。三率太陰距太陽差分。第四得所求時分。

太陽在太陰前實會先到所得時減太陰在太陽前平會先到所得時加。算諸行俱同前。

應時

以太陽實經度查黃赤道變度表得赤道度。無正度用比例法。

太陽平減黃道根數四周紀三十八度三十六分三十四秒平行小加一圈減其餘爲黃道餘度。變赤道度減赤道根數二百八十度三十五分赤道小加一圈減其餘爲赤道餘度。

黃赤道二餘度相減變時分。黃道餘度大時分加正會。

南京比立表之地又加七時二十八分北京又加二十〇分爲實會應時。以上定朔。

求太陽實會經緯度

太陽黃道實經度變赤道卽距赤道實經度。
太陽黃道實經度用表查緯度南北度分卽太陽距赤道緯度。

求太陽距天頂度前後三時同用

月在日前月加減大日加減小平會先到。


實會後到自應時自午而已辰向後算

三小時若月加減小日加減大月在日
後平會後到實會先到自應時自午而
未申向前算三小時

算丁亥甲大三角

有亥甲邊北極出地之餘。

有亥甲邊北極出地之餘。
以日距赤道緯度減九十度若日過天
秤初度緯在赤道南以日距赤道緯度
加九十度。



從不知之
角打線從
丁從甲皆
可今從甲
打線至巳
先求亥巳
線若大於
亥丁分線
在外小於
亥丁分線
在內

有亥角距午時刻。每時作十五度。午後加赤道實經度。午前減。

先算亥巳甲三角

用圈線正角第三法。有兩角一邊。其先有邊爲正角對邊線。

求亥巳邊。先有角相連之邊。有巳正角。有亥角距午度。分有亥甲邊。北極出地之餘爲正角對邊。

一率通弦。二率亥角餘線。三率亥甲邊切線。四率得亥巳邊切線。

求甲巳邊。先有角相連之邊。有巳正角。有求透對亥角。分有亥甲邊。此爲正法。今用捷法省此算。

一率通弦。二率亥角正線。三率亥甲邊正線。四率得甲巳邊正線。

又算甲巳丁三角。有巳正角。有甲巳邊。

求巳丁邊。日距赤道緯度減九十度。或加九十度。除上所得亥巳邊。卽巳丁邊。

求甲丁邊。

一率通弦。二率甲巳邊餘線。三率巳丁邊餘線。四率得甲丁邊餘線。爲日距天頂度。其餘卽距地

平。

算前後三小時同法。但時在午前。以距午前分數。一小時六十分。所得求度分有時者。每一時加十五度。時在午後。以距午後分數求度分有時者。每一時加十五度。爲距午時。有捷法。省求甲丁邊徑。求甲丁邊。

一率亥巳邊餘線。二率亥甲邊餘線。三率巳丁邊餘線。四率卽徑得甲丁邊餘線。距天頂度。餘地平

算差角前後三時同用

算丙巳邊

離午時卽前時十五度看在午前後在午後。

自午而未申加太陽實經變赤道度卽應時所得

爲過午時圈度卽知入何宮度百二十二度五十分卽入天蝎一度五十一度五十分


變黃道以表中赤道對黃道度數取黃道度。

有黃道度即可入表求黃道緯度又看

黃緯在赤道南北在赤道北自白羊初十度以緯度減北極出地所得在赤道南自天秤初至三十度以緯度加北極出地度所得爲丙巳邊。

算已角

丙巳邊內有赤道過午時圈度實經所得有赤道變黃道度此入表不用過午時圈度用變黃道度求交角表有餘分則用比例法得已角。



如圖丑甲午爲差角。然丑甲邊難取而甲已丙角與甲午之大。小同故寧算丙甲已鈍角。

算甲角即差

一率丙甲邊距天頂正線。二率巳角正線。三率丙巳邊正線。

總數相較卽得甲角正線爲差角。

求地平差此法或前或後三時同用

東西南北差之本高卑差高卑差之本是地平差。

以太陰實引數入表得其相對之分秒有餘數以下度與餘數比例或加或減於相對之數爲太陰地平

差崇禎歷書作地半徑數。

求太陰高卑差此法或前或後俱算三時


查表以所得地平差分數從上以前得距地平即天頂距

減九十度之餘從右小餘另比例爲先得太陰高卑差。

太陽高卑差以距地平查表得分秒以減先得太陰

高卑差爲太陰真高卑差恒不加

就黃道極作一大圈至高卑差丁相交黃道又交過頂圈戊爲正角凡各圈過本圈之極其相交之角卽正角。甲丁爲高卑差日在甲人目視之不



如圖日月

在甲人目

在地視之

不見在甲

而見在丁

甲丙爲日

高卽甲丁

爲高卑差。

見在甲而見在戊。卽甲戊爲東西差。戊丁爲南北差。

高卑差南北差東西差者。惟甲丁高卑差至大。不過六十分。其甲戊東西差。戊丁南北差。皆小於甲丁高卑差。故皆銳角。又且分數少。在天俱可作直線。

算東西差前後三時同法

以通弦爲一率。以前得差角卽甲。正線爲二率。三率以高卑差分秒俱化成秒。求其對數。與二率相加。去一率通弦。求原數。以六十成分爲東西差。

算南北差前後三時同法

以通弦爲一率。以前得差角卽甲。餘線爲二率。三率以高卑差分秒俱化成秒。求對數。與二率相加。去通弦。求原數。以六十成分爲南北差。

若查表第一行距天頂數。第二行東西差邊。第三行南北差邊。省用前算三角法。

如算東西差。一率六十分。二率取表中第二行東西差邊。三率前取太陰高卑差。卽得所用東西差。南北差同法。但取表中第三行。

表中各宮皆初分用法。如午時正二刻六分。日在天蝎一度四十六分○八秒。如天蝎一分午時。得距天頂四十二度三十五分。人馬一分午時。得距天頂五十一度二十一分。其差八度四十六分用下法。
一率一宮三十度。二率八度四十六分。三率天蝎一度四十六分○八秒。

總數較數卽其差分以加先得四十二度三十五分卽天蝎一度四十六分距天頂度
東西南北差同法

求視會

以太陰實引數入表其表每隔三度以餘分求比例或加或減於正度之上爲太陰一時分實行度

有實行取視行

第一法月食在黃道九十度限東東西差先大後小早間食辰時在先巳時在後午後食未時在先申時在後其上所算第一時東西差與第二時東西差第三時東西差與第二時東西差相減其餘分與實行相減爲視行

若東西差先小後大其前後二差相減其餘分加實行爲視行

第二法日食在黃道九十度西東西差先大後小其東西差前後二差相減其餘分加實行爲視行

若先小後大其東西差前後二差相減其餘分減實行卽爲視行

第三法一半在九十度限東一半在九十度西前後二東西差相減不論大小其餘與實行相減餘分卽爲視行

視行距離

東西差大實行小以實行減東西差其餘爲實會與視會相距度分東西差小實行大卽以東西差爲實會距視會度分

視會相去度變時法

第一法.若實會東西差比視行小.其東西差分數.要實會相近時.視行比例分得實會與視會相去度數.變時分.

第二法.若實會東西差比視行大.除一時月視行.餘東西差分數.要視會相近時.視行比例分得實會與視會相去度數變時分.二段日食在東皆減實會時分爲視會時分.在西皆加實會時分爲視會時分.

一率太陰實行.二率六十分.三率實會去視會度分.俱化爲秒.乘除成分爲所變時分.

用第一法.加減實會爲視會.

用第二法.一時之外.加減實會爲視會.

試法真不真

用所得視會再算距天頂.再算差角.地平差同前數.再算太陰高卑差.再算東西差.再算南北差.日食月行同前數.

有實行求視行

以所得東西差置位.一率六十分.二率月一時實行.三率上段所得有實行求視會變時分.俱化爲秒.乘除成分與置位東西差相減.餘爲差分.

一差分變時分

一率上段實會距視會度分。二率上段實會距視會所變時分。三率差分。俱化爲秒。乘除成分秒爲變時分。

差分大東西差小。上段視會時分內當減。變時分爲視會差分。以加減實會爲視會。

差分小東西差大。上段視會時分內當加。變時分爲視會差分。以加減實會爲視會。

時分差至三十秒內。卽定視會。若多。又用三試。其算法與第二段試法同。但要所得差分成時與東西差合方定視會。求日食大小。

算交行

以日月實會時分_{用應時定數}。入平距離表。總計交行度。以太陰均度依號加減之爲實會交行。以加減東西差爲日月視會交行度。實會在前。東西差減。實會若在後。東西差加。

求距離

以交行宮度分秒查距離表。有小餘用比例法。爲視會距離。又本表後行餘分比例下度差分爲正餘分。與太陰心差比例分相較。乘除以加距離爲真距離。不減。日月食若無此比例分及餘分者。省此算。

距離在三○一二宮北下。六七八宮南上。

求視距離

正交看在南在北與南北差同類相加異類相減。北極出地二十三度三爲視距離。若南北差大於距離其日食交在北者移而南。

求日月半徑

以太陽實引數入表求日半徑。

以太陰實引數入表求月半徑。

以兩半徑總數減視距離餘數爲食分距離。若距離大於兩半徑總數即無食。

食分

以太陽全徑爲一率。日月兩半徑總數減視距離爲二率。西法十二分爲三率。取第四卽西法日食分。

又作中國分。以西法十二分爲一率。以所得西法日食分爲二率。中法日食十分爲三率。取第四卽中法日食分。

用表以日全徑從右以距離分從上再以日全徑小餘從右以距離分從上得食分。

求初虧

以食甚前一時東西差與食甚時東西差相較餘數以加月實引數所得月一時正行爲食甚前一時視行取法與前有實行求視行同法。