


千金寶要





千 金 寶 要

孫 思 邈 集



南京中医药大学图书馆版权所有

編主五雲王

編初成集書叢

要寶金千

中華民國二十六年六月初版

編集者

孫

思

邈

發行人

王

雲

五

印刷所

商

務

印書館

發行所

商

務

印書館

上海河南路

上海河南路

上海及各埠

★E九三五

張

重刻千金寶要序

千金寶要十七卷。附論及千金須知爲十八卷。宋宣和時郭學士思從孫徵君思邈所撰千金方擇要刻石華州公署。自明正統景泰間俱有木石刻本。至隆慶六年秦王守中復刊石耀州真人祠。四庫書未及收錄。余遊關中得其搨本藏笈中。按家徵君生於後周卒於唐永瀆之代。葉夢得避暑錄話稱其作千金前方時已百餘歲。後三十年作千金翼段成式西陽雜俎則謂昆明池龍宮有仙方三千首。徵君以救龍得之。因上帝不許妄傳。復著千金方三十卷。每卷入一方。千金方本與千金翼方爲二書。是以舊唐書本傳止載千金方三十卷。晁公武陳振孫書目則云各三十卷。今俗本千金翼方九十三卷。不知何人更其次第。千金前方竟不可別。此宣和時擇要本當從前方錄出者。龍宮仙方在其內。眞世閒祕異之書。不可不廣其傳。以公同志。書中謂今俗稱豆瘡爲小兒丹毒。又有反花瘡。元人奇效良方始謂之痘疹。可證俗人謂此疾出於近代者非也。縊死人可救。落水死人經一宿猶可活。倉卒間不知其方。書備其術。尤爲濟人之仁術。世之從政者。不師蓋公獄市勿擾之言。惟株累鍛鍊之是務。置一切積貯水利農田學校利益於人之事於不問。以致損傷元氣。感召災殃。誠不如尋覽方書。胸中常有活人之念。爲善最樂。在此不在彼矣。嘉慶十二年七月三日。賜進士及第授通奉大夫署山東布政使督糧道加四級陽湖孫星衍撰。

千金寶要序

於藩署之濟性堂

一

刻千金寶要序

千金寶要者。宋徽猷閣直學士郭思。按唐孫真人先生所集千金方中。纂要者也。宣和六年。思曾刻石于華州公署。我明正統八年。華州知州劉整重刻。景泰六年。和州楊勝賢以石刻。冬月不便摹印。易刊木板。往年春。予得之。喜其方之簡便。藥之近易。醫不煩而取效速。信有切于人之實用。迺珍如拱璧。不容自祕。已命壽之梓矣。竊惟寶要纂自真人千金方中。天下之遊耀州真人洞者。歲無虛日。日無虛時。願獨不立石于真人洞前。非所以廣其傳也。因刻于洞前云。隆慶六年歲在壬申春三月。上吉。秦王守中識。

千金寶要目錄

婦人第一

小兒第二

中毒第三

飲食中毒第四

解百藥毒第五

蛇蝎等毒第六

喉痺金瘡第七

瘡疽癰腫第八

霍亂吐瀉第九

虎犬馬傷第十 針折入肉附

舌耳心目等大小便第十一

中風大風水氣第十二

瘡痢癥等第十三

頭風吐逆第十四

疫瘴濁淋第十五

頭面手足瘰癧瘡漏第十六

痔第十七

論

千金須知

千金寶要卷之一

唐 孫思邈集

婦人第一

妊娠難產。燒車軋脂。內酒中服。亦治腹中痛并欬嗽。
妊娠忽苦心腹痛。燒鹽令赤熱。三指撮。酒服之。立產。

又方。吞槐子二七箇。

又方。菟絲子或車前子。以酒或米汁服方寸匕。卽生。

又方。水或酒。服家中黑塵。

子死腹中。及小難橫生。倒生。難生者。半夏白斂各二兩。末之。服方寸匕。亦可。加代赭瞿麥各二兩。佳。小難
一服。橫生二服。倒生三服。子死四服。

又方。榆白皮細切。煮三升。服之。

子死衣不出。上搶心者。急取蟻垤土三升。熬之。令熱。囊盛。熨心。良。

又方。末竈突中墨。三指撮。水或酒服之。

乳無汁者。土瓜根末之一服半錢匕。日三。

衣不出。及橫生逆生者。小麥小豆煮濃汁飲。立出。

產三日不出者。燒大刀鑕。以酒一盞沃之。頓服。

又方。燒藥杵令赤。內酒中飲之。救死不分。穉者。

產乳暈絕者。製了半夏一兩末之。丸如大豆。內鼻孔中。愈。

又方。神麩末。水服方寸匕。

又方。舍醎醋。喫面。

子死腹中。牛屎塗母腹上。立出。

胎死腹中。服水銀三兩。立出。

未足月而胎死者。以苦酒濃煮大豆。一服一升。死胎立出。

妊娠時疾。子不下。竈中黃土水。或酒。或泔。清調塗臍方寸。乾再上。

又方。酒服車轄脂。

又方。菖白一把。水三升。煮熟。食菖令盡。亦安胎。胎死者即出。

妊娠中蠱。燒敗鼓皮。酒服方寸匕。

妊娠傷寒。芩白十莖。生薑二兩。切。水三升。煮去半。服取汗。

產後血不盡。煩悶。搗生藕取汁。飲二升。良。

產後腹脹痛者。煮黍粘根爲飲。一服卽愈。

五色帶下者。煮飩帶汁。服一盃。良。

月水不斷。灸內踝下。白肉際。青脉上。隨年壯。

又方。服地黃酒。良。或大豆服亦佳。

月水不利。及無子。灸四滿三十壯。穴在丹田兩邊。相去各一寸半。丹田在臍下二寸。

漏下。積年困篤者。取鵲重巢。燒灰末之。服方寸匕。日三服。三十日愈。重巢者。連二年鵲產其上者是。

產後。月水往來多少不定。或不通痛。小腹急。腰身重。白馬尿一升服之。良。

逆生橫生者。竈下黃土。三指撮。酒服。立出。

小兒第二

凡小兒生下不啼者。取兒臍帶向身。卻捋之。仍呵之。百度。亦可以芩白鞭之。

浴新生兒。以豬膽一箇。汁入湯中。令兒無瘡疥。

小兒生輒死者。便覷兒口中懸癰。前上脣有胞者。急以指摘取頭。決令潰去血。勿令血入咽。入咽卽殺兒。

慎之。

小兒臍不合。燒蜂房灰末傅之。

小兒中風口噤。雀屎如麻子丸之。飲下即愈。

兒生三日內。朱蜜多則生陰癩。朱蜜三日內。通得用三豆許。朱蜜後。與牛黃。亦三豆許。除兒百病。牛黃後。可與米飲。研米作厚飲。如豆大。與兒。三豆許。止。日二。七日後方哺乳。

小兒解顛。熬蛇脫皮末之。和豬頰車中髓。傅頂上。日三四。

小兒肚皮卒然青黑。以酒和胡粉傅上。若不急治。須臾便死。

又方。灸臍左右上下各半寸。並鳩尾骨下一寸。凡五處。各三壯。

小兒暴脹欲死。半夏隨多少。微炮之爲末。酒丸如粟米大。日三。

小兒丹毒。搗慎火草。絞取汁塗之。

小兒赤遊腫。若徧身。入心腹。殺人。搗伏龍肝爲末。以雞子白和。傅之。乾。易之。

又方。白豆末。水和。傅之。勿令乾。

又身赤腫起者。熬米粉令黑。以唾和。傅之。

小兒傷寒發黃。搗土瓜根汁。三合服之。

又方。搗青麥汁服之。

又方。搗韭根汁。澄清。滴兒鼻中。如大豆許。卽出黃水。差。

小兒霍亂。研尿滓。乳上服之。

又方。牛涎。灌口中一合。

小兒客忤。吞麝香大豆許。立愈。

又方。以母月衣覆兒上。大良。

又方。取牛鼻津服之。

又方。取牛口沫。傅乳頭。飲之。

又方。取熱馬屎一丸。絞取汁。飲兒。下便愈。亦治嘔啼面青腹強者。

小兒誤吞針。取磁石如棗核大。吞之。或舍之。其針立出。

誤吞鐵物等。艾蒿一把。剉。以水五升。煮取一升半。服之。卽下。

誤吞髮。亂髮燒灰。酒服。一錢。

吞錢。艾蒿五兩。以水五升。煮取一升。頓服之。卽下。

又方。末火炭。酒服。方寸匕。水服。亦得。

又方服蜜二升即出。

吞金銀釵環白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳。

又方吞水銀一兩再服之。

吞環及指彊燒鴈毛二七箇末服鵝毛亦得。

吞釵暴韭令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋縷如非法皆可用但力意多食自消。

吞銅鐵而哽燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈。

吞釘針及箭簇等但多食脂肥肉令飽自裹出。

吞針取懸針磁石末飲服方寸匕即下。

小兒尿竈丹初起兩股八臍陰頭皆赤者水二升桑皮切二升煮取汁浴之良。

又方燒李根爲灰以田中流水和傅之良。

小兒朱田火丹一日夜即成瘡先從背漸徧身如棗大赤者濃煮棘根洗之已成瘡者赤小豆末傅之。

小兒野火丹徧身皆赤者用油塗之。

小兒菜萸丹初起背徧身如纈一宿成瘡者煮赤小豆作末以傅之。

小兒廢竈火丹初起足趺正赤色者以棗根煮汁沐浴五六度自愈。

小兒風瘙隱疹。心迷悶。巴豆二兩。以水七升。取煮三升。故帛染汁。拭之。大人加減用之。

又方。礬石二兩。末之。酒三升。清令消。帛染拭病上。

又方。吳茱萸一升。酒五斤。煮取一升半。帛拭病上。

小兒隱疹入腹。體強舌乾。蕪菁子末。酒服方寸匕。日三。

又方。蠶沙二升。水二升。煮去渣。洗之。

又方。鹽湯洗了。以蓼子按。傅之。

又方。車前子作末。傅之。

諸丹毒。渠中藻菜。細切。熟搗。傅丹上。厚三分。乾。易之。

又方。芸臺菜。熟搗。厚封之。隨手卽消。如餘熱氣未愈。但三日內。封之。使醒。醒好。差止。

五色油丹。縛母猪。枕頭臥之。良。

又方。牛屎塗之。乾。則易之。

赤流腫。搗火麻子。水和。傅之。

又方。以羊脂煎了。磨之。赤黑丹。起徧身者。殺人。

小兒瘡初起。燂漿似火瘡。熟搗桃仁。以麪脂和。傅之。亦治徧身赤腫。

小兒身體頭面生瘡。榆白皮隨多少暴令乾。末之。醋和塗。縣以傅瘡上。蟲自出。

小兒丹毒。馬齒莧一握。搗取汁飲之。以滓傅之。

又方。搗赤小豆五合。水和取汁飲之。一合良。滓塗五心。

又方。濃煮大豆汁塗之。良。差亦無癢痕。

又方。臘月豬脂和釜下土。傅之。乾則易之。

小兒五色丹。搗蒟藿葉。傅之。

又方。薤白一把。鼓一升。以水三升。煮取二升。分三服。

又方。柏葉一升。麻子末一升。以水五升。煮三沸。百日兒。每服三合。

又方。搗石榴汁服之。

又方。亂髮灰。鹿角灰等分。三歲兒。以水和服。三錢。七日二。

小兒赤白痢。單服生地黃汁一合。

小兒熱痢。煮木瓜葉飲之。

小兒冷痢。蓼菜搗汁。量大小飲之。一作芥菜。

又方。搗蒜傅兩足下。

小兒暴痢。赤小豆末。酒和。塗足下。日三。油和亦得。

小兒蠱毒痢。藍青汁一升二合。分爲四服。飲之。

小兒渴痢。搗木瓜汁飲之。

小兒頭不生髮。楸葉搗汁。傅之。

小兒瘰瘡。冢中石灰。厚傅之。

小兒浸淫瘡。以竈下黃土。髮灰等分。末之。以豬脂和。傅之。

小兒疥瘡。以臭酥和胡粉。傅之。

小兒濕癬。煎馬尿洗。

小兒斑瘡入眼。浮萍陰乾爲末。以生羊子肝半箇。入盞內。以杖子刺碎。沒水半合。絞取肝汁。食後調下。不甚者一服。已傷目者。十服見效。大人亦可用。

小兒赤熱腫目。川大黃白礬朴硝等分爲末。冷水調。作掩子。貼目上。

小兒重舌。腫起舌下。以朴硝研水。敷咽喉外。其內用成塊者。含涎出乃平。

又方。地蟬蟲和薄荷。研汁帛包。蘸舌下。腫起重舌。

極證。用指去爪。先于舌下筋上。擦至根。漸深深擦。如此三次。又用指蘸水。取項後燕窠小坑中筋。自上趕