

是乃仁術醫方集

四

责任编辑 王庆福

图书在版编目 (CIP) 数据

是乃仁术医方集 / (清) 糜世俊编; (清) 皓山氏增补. — 北京: 中医古籍出版社, 2001.1

(中医古籍孤本大全/中医古籍孤本大全选编工作委员会选编)

ISBN 7-80013-952-2

I. 中… II. ①糜… ②皓… III. 中国医药学—古籍—汇编
IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 54223 号

是乃仁术医方集

清·糜世俊 编

(《中医古籍孤本大全》)

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

金坛市古籍精装印务有限公司 印刷

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 001~200 册

ISBN 7-80013-952-2/R·948

定价: 460.00 元

婦人科

保命勝金丹

此丹尚能和經益精補虛種子百發百中兼治男

婦諸虛百損女子胎前產後血枯經閉崩漏赤白帶下男子遺

精白濁腰痛腿酸精寒陽痿咳嗽痰喘耳鳴眼花等症

南香附

一觔第一浸第二次浸第三次浸第四次浸

官棟參

川當歸

赤芍

白芍

香白芷

川芎

延胡索

遠志

去心

白朮

各一

桂心

白茯苓

丹皮

川牛膝

各二

各一

大熟地

酒洗

五

白薇

四

大甘草

七

五

桑本

三

石除香附

另製

外

其

十

七

味

俱

用

煮

酒

十日浸過

晒乾

為末

聽用

後加

赤石脂

白石脂

各一

月

冬

七

此二味用好醋浸三日入火煨紅再淬入醋內如此七次焙乾
為末和入藥內滴乳香明沒藥各一真琥珀五珠砂五子
右四味用煮酒細研成膏和入前藥內煉蜜拌丸如龍眼大以
金箔為衣曬乾入磁罐收貯封固聽用凡修合此丸須擇壬
寅壬申日虔誠製造勿令婦女雞犬一切不潔淨人見之為妙
赤石脂 琥珀 乳香 沒藥 硃砂 此六味婦人不可用
服藥法 凡男婦遇諸症取藥一丸放在磁碗內入煮酒半碗蒸
服若大人胎前產後月子諸病用滾水小半碗將藥手捻碎入
碗內用碟蓋上泡開如冷水冷將碗放鍋內慢火蒸熱取出碗以
銀匙研細服之如月子病用些酒醋滴在藥內服之若碗內藥

未淨再用酒滌之飲盡令其半醉服後少坐片時待身覺困倦可卧用衣被蓋暖使出汗則遍身暢快有病遂消如女人經至而腹痛時服此一丸則下月即不作痛如行經三日前依法連服三日任其久不生育雖老成孕百發百中並無一空然淨後第三日服藥交媾一定生男六日交媾則生女矣須當謹記莫致差錯可也

四物湯 治婦人有孕卒然見血胎欲墜落腰疼其重之症

赤芍

當歸

各一月

熟地

一月

五錢

川芎

二錢

共為細末每服三錢何膠慈艾煎湯調服

催生奪命丹

治臨產胎不順者或橫或倒或數日不下

母丁香末二子乳香 沒藥各一麝香五共為細末用臘月

初八日无腦合丸雞頭子大硃砂為衣每服一丸冬月熱酒夏

黑神散 治婦人產後敗血致諸疾者臨產亦宜用之

當歸 熟地 白芍 酒炒肉桂去皮各沉香 蒲黃 炒黑 沒藥

搜灰 赤芍各一乳香三血竭五炙甘草 一月共研細末

每服二小凡產後十八症俱用量便和煮酒調服神效

黑神丸 治產後一切病症俱用四物湯送下一丸

仙方濟世黑神丸 京墨一兩用水研一錢二分飛羅麵

天麻細末秤二錢 佛面赤金須五貼 二錢百草霜再研

共合為丸四十粒 產婦一粒保安痊

烏金丸

治產後血迷瘀血上攻兩脇脹滿胃脘疼痛大小便不

通發熱作喘大渴飲涼眼見鬼神惡露去早不行但服之

乳香

沒藥

歸尾

台一

百草霜

二

子

已

三

去

右為細末煉

蜜丸如黃豆大硃砂為衣每服一丸用煮酒四日生姜一片煎

數沸將藥研化服之從食紅素三五枚如不吃素則吐吃通素

烏金散

治產後血迷氣敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛頭眩

血竭

百草霜

血餘

煨

存性

當歸

肉桂

去粗

鯉魚鱗

炒

末黃

真京墨

延胡索

各

等

石研極細末

每服二

子

溫

黃酒調服

益母丸

七月七日採益母草連根葉花採來將花葉另放一處授用

刀切斷入鍋內水煮無青色將投渣撈出不用即將花葉放湯
內煮熟撈起晒乾研末將此汁澄去泥腳就將末放入汁內量
有十觔對無灰酒重便各五觔用文武火煮三炷香為度用荆
條篩子一箇上攤豆腐濾子一塊放在大磁盆上將藥攤平上
再用荆條橫豎架住再將布四圍蓋之勿令藥沾布上俟澄下
水來又對量便煮酒各三觔將篩中之藥倒在蒸籠內蒸一炷
香如此七次蒸完連汁並藥盡入鍋內以文火炒用竹板鏟勻
炒乾不粘布單取出晒乾為末細羅：過煉蜜為丸藥蜜對均
勿令輕重每丸重二小照症隨引送下
如胎前產後臍腹刺痛或作聲胎動不安下血不止譫語渴下

胎衣不下及橫生不順死胎不下經日脹悶心滿心痛妙藍下湯
中風牙關緊急半身不遂失音不語惡露不盡結滯刺痛上衝
心胸滿悶童便合黃酒化下

兩太陽穴脹痛呵欠心忪氣短瘦弱不思飲食血氣身熱手足
頑麻遍體骨節疼痛水瀉赤白痢疾血山崩漏糯米湯化下

血暈眼黑頭疼內熱口乾作渴如見鬼神狂言亂語不省人事
薄荷湯或黃酒化下

瘀血不散結成血塊臍腹疼痛煩悶時發寒熱或有冷汗或未
滿月氣血閉塞不順咳嗽氣喘胸膈不利惡心吐酸面目浮腫
兩脇疼痛鼻衄舌黑口乾四肢無力經脈不調自汗發熱骨蒸

作腫及婦人久不孕育俱用黃酒化下

大小便不通煩燥口苦面垢顏赤五心煩熱薄荷湯化下

赤白帶下艾湯化或鴛血水棗湯化生產前後以黃酒化下

活血紫金丹 治婦人經脉不通腹內成塊遍身發熱並治心疼

歸尾 巴豆各五枚油 五靈脂 代赭石火煨醋淬七次 共為細末

醋糊為丸如棗豆大每服五七丸紅花湯送下 心疼艾醋湯

一婦人懷孕須用安胎之法少生氣惱戒慎勞碌則胎元無傷再

少進保胎之劑自然無事稍有不妥即服四物湯加

白芍 黃芩酒炒 二味水煎服

一孕婦懷胎三箇月因氣所觸致傷胎元腹內少痛覺胎微動當

服四物湯加 桑葉 水煎服服後復作痛四物湯送紫金丹

一 孕婦三四個月或因氣怒或登高騎馬失脚墜落傷折胎動用
四物湯加 艾葉 大麥 水煎服

一 孕婦四五箇月勿食傷胎之物若誤食之並氣怒傷胎腰疼腹
痛見血者煎四物湯送 烏金散打下惡物效

一 孕婦六七箇月偶有所傷腹痛不安或從高墜下觸動胎元痛
不可忍或見血露或惡心嘔吐即服安胎飲四物湯內加

白朮 條芩 陳皮 紫蘇 砂仁 水煎服如胎安不住服即

烏金散 黑神丸 如再不應胎不下服奪命丹

一 孕婦七八箇月身體面目四肢浮腫用 烏金丸 丁香薤下湯

取下惡物後臍腹痛用四物湯補之加 篇蓄 艾葉煎湯服

一產前小便澀少惡血阻隔不通服 烏金散

一產前小便淋瀝不通上下不和嘔吐惡心小腹脹滿服烏金丸

一產前卒然不得小便此是胎逼尿胞用 葱白搗膏貼臍上或

用白蠟肉搗膏亦可同葱白搗用亦可

一胎漏下血不止或心腹脹滿用 當歸 川芎 冬五不黃酒煎入童便服

一若因母病而胎動但治其母惟用 當歸 川芎 益母草

右三味煎湯送烏金散 若因胎動而母病者急當安胎用

芍藥 黃芩 益母草 右三味煎湯送黑神丸須認輕者轉

動不安重者心致傷墜若面赤舌青是兇已死面青舌赤是母

死唇舌俱青兩邊沫出子母俱死速進奪命丹

一產前身體黃腫 痼疾涎潮搐目吊口噤中風頭項強直徑脉

拘急語言蹇澀不省人事者服 黑神丸 烏金散

一胎氣不和心胃脹滿疼痛或臨產驚恐氣結者服 烏金丸 或服

一胎腹中已死或橫倒或產生不下急用 單麻仁 粒 九 麝香 五

已豆仁 粒 九 共搗如泥攤貼臍下丹田穴隨時就下即去其藥

少有不應即服 紫金丹 烏金丸 或先服藥後貼臍亦妙

一產前頭疼咳嗽用 蛇脫燒灰入黃酒內送烏金丸

一難產者血塞子宮門也即用 烏金散 黑神丸用 煎湯送下

一臨產之婦不可坐卧只宜行動不可用力太早臨產之時先服

烏金散

黑神丸

用黃酒送下

一婦人月子後受風四肢攣拳名為雞爪風痛牽遍身不時發者

兩腿膝蓋旁有鬼眼穴各灸三壯即愈

一產前崩漏用槐子煎湯送烏金散

治胎衣不下方

皮硝一子用童便黃酒煎滾調服即下

治產後大熱不能着衣蓋被方

用猪苦膽一箇生飲其汁即愈

霹靂散

治血山崩漏徑行不止之症

黃芩炒

荆芥炒

右研細末各二寸黃酒四升同盛碗內先將銅

秤錘一箇用桑木炭燒通紅淬入藥碗內酒滾乘熱服之即效
治產後腹脹閉結膨悶氣急生臥不安方

大麦芽炒為細末用陳醋一合調服立效

治產後血暈迷悶方

五靈脂

半生知

為末每服三小滾水調下如口閉稍開灌之

治產後症方

產後面白乃惡血下多氣脫之故目閉不開

人參一月

煎湯灌之將手插入中眉心即回神效

又方

產後面紫乃惡血上冲氣壅故目閉不開

山查

一月炒

童便煎服

再用韭菜搗爛裝入有嘴瓶內煎

滾醋冲入急包其口將嘴薰二鼻孔手掐人中穴即效

治產後面黑方

此係惡血入肺發喘欲死

人參五寸為末

蘇木一升槌碎

用水三鍾先煎蘇木至一鍾

去渣調入人參末內服之神效

治產後肉線下垂方

乃產時用力太過垂出肉線痛徹心脾

老姜

三觔連皮搗爛

入芝麻油炒乾

先以熟絹盛起

納近產戶乃以絹

袋盛姜就近薰之冷則更換漸次循進也

如重者須一二日方愈

治產後要方

新產後不問有無病症即宜服此

童便

一鍾陳醋

半鍾合而溫服則百病不生甚驗

治產後昏暈方

急將亂髮浸陳醋燒於床前三匙即溫服童便一碗可保無虞

治生產諸病方

治產後惡血攻心語言顛倒健忘失志及打撲

血竭

沒藥

各等分

共為末

每服二

子童便酒

各半

鍾調和溫

服其惡血即下行而愈

其酒必用上好陳酒方妙

治產後血崩大下不止方

蒲黃

炒黑為末

每服二

子童便酒

各半

鍾調和溫

服其惡血即下行而愈

其酒必用上好陳酒方妙

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

止此藥治身體無汗手足不冷者乃血歇脫而氣未脫也當服

之若汗大出手足冷而無神氣眼欲閉者身倦無力口鼻氣淡

者氣欲脫也不用前方只用人參五子煎湯熱服即止

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

之若汗大出手足冷而無神氣眼欲閉者身倦無力口鼻氣淡

者氣欲脫也不用前方只用人參五子煎湯熱服即止

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

者氣欲脫也不用前方只用人參五子煎湯熱服即止

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

剖尋穗

微炒

為末

每服三

子童便一

鍾煮酒少

許調下或煎服

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治

治產後血暈方

中風口噤不能服藥灌入鼻中其效如神

又治