



经济管理学科数学配套丛书


微积分

典型题精解

与习题详解

(第2版)

王春花 主编



- 知识结构
- 典型题型的解题方法及技巧
- 历年考研真题解析
- 习题及详解



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

经济管理学科数学配套丛书

微积分典型题精解与 习题详解

(第2版)

王春花 主编

彭书英 朱新河 潘秀娟 编
马文兴 李庚雷 李长国

内 容 提 要

本书是高等学校经济类、管理类各专业学生学习微积分课程的辅导书. 内容包括:一元微积分,多元微积分,无穷级数,微分方程与差分方程.它是与《微积分》(第3版)(朱来义主编)配套的复习参考书.

本书总结归纳了各种典型题型,介绍了各种解题思路、解题方法和技巧,帮助读者把微积分中各种概念予以融会贯通,以提高学生的解题能力.本书选用的大部分例题都有一定的难度,其中一部分是近年硕士研究生入学考试试题.

本书是高等学校经济类、管理类各专业学生在校学习和报考研究生时的必备读物,也可作为从事高等数学教学的教师和非数学专业的研究生参考.

图书在版编目(CIP)数据

微积分典型题精解与习题详解/王春花主编. —2版. —天津:
天津大学出版社, 2011. 8

(经济管理科学数学配套丛书)

ISBN 978-7-5618-4058-0

I. ①微… II. ①王… III. ①微积分-高等学校-题解
IV. ①0172-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 153043 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 河北省昌黎县第一印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 17

字 数 424 千

版 次 2009 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 2 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次

印 数 1—4 000

定 价 30.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

第 2 版前言

本书是在 2009 年天津大学出版社出版的《微积分典型题精解与习题详解》的基础上修订而成的. 本书可以帮助经济类和管理类在校学生和自学者学好“微积分”, 也可以给他们备考研究生提供一份复习资料, 同时也对从事“微积分”教学的教师有一定的参考价值.

本书仍沿用第 1 版的结构, 每章分为以下四部分.

一、知识结构

给出每一章的主要知识结构脉络.

二、典型题型的解题方法及技巧

总结归纳了各章节的各种题型, 并以实例的形式给出了各类问题解题的技巧和方法. 这部分内容对学生解题能力具有很好的帮助.

三、历年考研真题解析

本书对考研真题按照考查的知识点放在相应章节, 这样有助于学生掌握每年考研知识点分布在各章中的比重, 也有助于学生对知识点的理解和掌握. 本书在第 2 版中增加了 2010 年、2011 年的考研真题, 而且都给出了具体的解题过程, 供考研学生复习使用.

四、习题及详解

这部分内容是针对高等教育出版社出版的《微积分》(第 3 版)(朱来义主编)做了相应的调整, 因此本书对课后习题逐节给出解答, 以供初学者和自学者使用.

书中不足之处恳请读者批评指正.

编者

2011 年 7 月

前言

“微积分”是当代经管类大学生必修的一门公共基础课,它是进一步学好其他后续课程的基础.朱来义主编的《微积分》(第三版)是目前我国经济类专业学生用量最大的一本数学教材,习题量大且具有一定的难度,考虑到经济类与管理类学生和自学者学习“微积分”的需要,为了帮助他们学好微积分,给他们提供一份较好的考研复习资料,特编写了与《微积分》(第三版)(朱来义主编)配套的教学辅导书.在本书的编写过程中,从选材、理论推导、文字叙述等方面尽量适应经济类、管理类学生的特点,通过对各种典型题型的分析,介绍各种解题思路、解题方法和技巧,帮助读者把微积分中的各个概念予以融会贯通,提高分析解决问题的能力,掌握解题技巧.

每章包括以下内容.

一、知识结构

系统归纳了每一章的概念、定理、公式,并给出了一些常用的公式.

二、典型题型的解题方法及技巧

本书总结归纳了各章节的各种题型,并且针对各种题型,相应地给出了具体的解题思路和分析,同时还介绍了许多新的更简捷的解题方法.这些内容对提高解题能力有着很好的帮助.对于同一种题型,我们选择了比较典型的能反映教学要求的例题进行解析,并详细地给出了解题过程.除此之外,本书还积极地探索一个题目的多种解法,可以使读者对各个相关概念的相互关系有更深刻的理解,通过各种解法的比较,掌握用最简捷的方法去解决问题.

本书中所选用的大部分例题都有一定的难度,一部分是近年研究生入学考试试题,一部分是与各种题型相适应且具有代表性的典型例题.

三、历年考研真题解析

本书给出了近年来的研究生入学考试试题,同时给出了详细的解题过程,对于与试题相关的知识点以注的形式介绍给读者.

四、习题及详解

本书给出课后习题及其参考答案.

本书由王春花主编,参加编写的有马文兴、潘秀娟、彭书英、李庚雷、朱新河、李长国.本书在编写过程中参考了众多的教材和辅导材料,在此谨向有关作者以及为本书做出贡献的同志们表示衷心的感谢.

由于时间仓促和编者水平所限,书中难免存有错误和不妥之处,欢迎广大读者批评指正.

编者

2009年5月


目 录

第 1 章 函数	1
§ 1.1 知识结构	1
§ 1.2 典型题型的解题方法及技巧	1
§ 1.3 习题及详解	4
第 2 章 极限与连续	8
§ 2.1 知识结构	8
§ 2.2 典型题型的解题方法及技巧	8
§ 2.3 历年考研真题解析	21
§ 2.4 习题及详解	22
第 3 章 导数与微分	34
§ 3.1 知识结构	34
§ 3.2 典型题型的解题方法及技巧	34
§ 3.3 历年考研真题解析	42
§ 3.4 习题及详解	43
第 4 章 中值定理与导数应用	50
§ 4.1 知识结构	50
§ 4.2 典型题型的解题方法及技巧	50
§ 4.3 历年考研真题解析	66
§ 4.4 习题及详解	72
第 5 章 不定积分	88
§ 5.1 知识结构	88
§ 5.2 典型题型的解题方法及技巧	88
§ 5.3 历年考研真题解析	96
§ 5.4 习题及详解	97
第 6 章 定积分	110
§ 6.1 知识结构	110
§ 6.2 典型题型的解题方法及技巧	110
§ 6.3 历年考研真题解析	119
§ 6.4 习题及详解	123

第 7 章 多元函数微积分学	146
§ 7.1 知识结构	146
§ 7.2 典型题型的解题方法及技巧	146
§ 7.3 历年考研真题解析	169
§ 7.4 习题及详解	173
第 8 章 无穷级数	199
§ 8.1 知识结构	199
§ 8.2 典型题型的解题方法及技巧	199
§ 8.3 历年考研真题解析	211
§ 8.4 习题及详解	212
第 9 章 微分方程初步	234
§ 9.1 知识结构	234
§ 9.2 典型题型的解题方法及技巧	234
§ 9.3 历年考研真题解析	237
§ 9.4 习题及详解	238
第 10 章 差分方程	254
§ 10.1 知识结构	254
§ 10.2 典型题型的解题方法及技巧	254
§ 10.3 历年考研真题解析	255
§ 10.4 习题及详解	255

第1章 函 数

§ 1.1 知识结构



§ 1.2 典型题型的解题方法及技巧

一、有关函数的概念

题型1 求函数的定义域

【解题思路】 由解析式表示的函数，其定义域是使运算式子有意义的实自变量值的集合；根据实际问题建立的函数，其定义域是具有实际意义的实自变量值的集合。

例1 已知 $f(x) = \frac{1}{\lg(3-x)} + \sqrt{49-x^2}$ ，求 $f(x)$ 的定义域。

解 要使函数 $f(x)$ 有意义，只需

$$\begin{cases} \lg(3-x) \neq 0 \\ 3-x > 0 \\ 49-x^2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow -7 \leq x < 2 \text{ 与 } 2 < x < 3,$$

即 $f(x)$ 的定义域为 $[-7, 2) \cup (2, 3)$.

题型 2 判断函数的等价性

【解题思路】 当且仅当两个函数的定义域和对应规则完全相同时,才表示同一函数,否则,不表示同一函数.

例 2 判断函数 $y = \log_2(x-2) + \log_2(x-3)$ 和 $y = \log_2(x-2)(x-3)$ 是否等价.

解 要使 $y = \log_2(x-2) + \log_2(x-3)$ 有意义,只需 $\begin{cases} x-2 > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases} \Rightarrow x > 3$,

即定义域为 $(3, +\infty)$.

要使 $y = \log_2(x-2)(x-3)$ 有意义,只需 $(x-2)(x-3) > 0 \Rightarrow x > 3$ 与 $x < 2$,
即定义域为 $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$.

因为两个函数的定义域不同,所以两个函数不等价.

题型 3 利用函数的表示与用什么字母表示无关的特性求 $f(x)$ 的表达式

【解题思路】 一种方法是所谓“凑法”,即将给出的表达式凑成对应符号 $f(\quad)$ 内的中间变量的表达形式,然后用“无关特性”得出 $f(x)$ 的表达式. 另一种方法是先作变量替换,再用“无关特性”,然后通过建立方程得出 $f(x)$ 的表达式.

例 3 设 $f(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x, 0 < x < 1$, 求 $f(x)$.

解 $f(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x = 1 - 2\sin^2 x + \sec^2 x - 1$
$$= -2\sin^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} = -2\sin^2 x + \frac{1}{1 - \sin^2 x},$$

所以 $f(x) = -2x + \frac{1}{1-x}, 0 < x < 1$.

例 4 设 $f(x)$ 满足 $af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x}$, 其中 a, b, c 为常数, 且 $|a| \neq |b|$, 求 $f(x)$.

解 设 $t = \frac{1}{x}$, 则 $af\left(\frac{1}{t}\right) + bf(t) = ct$.

由“无关特性”有 $af\left(\frac{1}{x}\right) + bf(x) = cx$.

解方程组 $\begin{cases} af(x) + bf\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{c}{x}, \\ af\left(\frac{1}{x}\right) + bf(x) = cx, \end{cases}$

得 $f(x) = \frac{c}{a^2 - b^2} \left(\frac{a}{x} - bx \right).$

二、有关函数的性质

题型 4 函数奇偶性的判别

【解题思路】 判断函数奇偶性的方法如下:

① 主要是根据奇偶性的定义,有时也运用其运算性质;

② $f(x) + f(-x) = 0$ 是判断 $f(x)$ 为奇函数的有效方法;

③ 函数的奇偶性是针对对称区间而言的,若函数的定义域关于原点不对称,则函数就无奇偶性可言.

例5 设 $F(x)=f(x)\left(\frac{1}{a^x-1}+\frac{1}{2}\right)$, 其中 $a>0, a\neq 1, f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且对

任何 x, y 恒有 $f(x+y)=f(x)+f(y)$, 判断 $F(x)$ 的奇偶性.

解 因为 $f(x+y)=f(x)+f(y)$,

所以令 $x=y=0$, 得 $f(0)=f(0)+f(0), f(0)=0$.

令 $y=-x$, 得 $f(0)=f(x)+f(-x)$,

所以 $f(x)+f(-x)=0$, 于是 $f(x)$ 为奇函数.

设 $g(x)=\frac{1}{a^x-1}+\frac{1}{2}$, 则

$$g(x)+g(-x)=\left(\frac{1}{a^x-1}+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{a^{-x}-1}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{a^x-1}+\frac{a^x}{1-a^x}+1=0,$$

所以 $g(x)$ 为奇函数.

故 $F(x)=f(x)g(x)$ 为偶函数.

题型5 函数单调性的判别

【解题思路】 若没有说明函数可导, 则用定义判别; 若说明函数可导, 则用导数判别(见第4章).

例6 设 $f(x)=\frac{1+x}{x}, x>0$, 判断 $f(x)$ 的单调性.

解 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_2)-f(x_1)=\frac{1+x_2}{x_2}-\frac{1+x_1}{x_1}=\frac{x_1-x_2}{x_1x_2}<0,$$

即 $f(x_2)<f(x_1)$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少.

题型6 函数周期性的判别

【解题思路】 利用周期函数的定义及其运算性质.

例7 设函数 $y=f(x), x \in (-\infty, +\infty)$ 的图形关于 $x=a, x=b$ 均对称($a<b$), 证明 $y=f(x)$ 是周期函数, 并求其周期.

解 由已知 $f(x)=f(2a-x), f(x)=f(2b-x)$,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(2a-x) = f[2b-(2a-x)] \\ &= f[2(b-a)+x], \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 是周期函数, 周期 $T_0=2(b-a)$.

题型7 函数有界性的判别

【解题思路】 判别函数有界性的方法如下:

- ①利用定义;
- ②闭区间上连续函数的有界性(见第2章);
- ③有极限的数列必有界;
- ④当 $x \rightarrow x_0$ 时, 有极限的函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域中必有界.

例8 设 $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}, x \in (-\infty, +\infty)$, 证明 $f(x)$ 有界.

证明 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)=1-\frac{2}{e^{2x}+1}$, 所以 $0 \leq f(x) < 1$.

当 $x < 0$ 时, $f(x) = -1 + \frac{2}{e^{-2x} + 1}$, 所以 $-1 < f(x) < 0$.

综上, $-1 < f(x) < 1$, 所以 $f(x)$ 有界.

§ 1.3 习题及详解

练习 1.3

1. 已知 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数, 在 $[0, 2)$ 上, $f(x) = x^2$, 求 $f(x)$ 在 $[0, 6]$ 上的表达式.

解 当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^2$;

当 $2 \leq x < 4$ 时, $0 \leq x-2 < 2$, $f(x) = f(x-2) = (x-2)^2$;

当 $4 \leq x < 6$ 时, $0 \leq x-4 < 2$, $f(x) = f(x-4) = (x-4)^2$;

当 $x = 6$ 时, $x-6 = 0$, $f(x) = f(x-6) = f(0) = 0$.

$$\text{综上, } f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 2, \\ (x-2)^2, & 2 \leq x < 4, \\ (x-4)^2, & 4 \leq x < 6, \\ 0, & x = 6. \end{cases}$$

练习 1.5

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \leq 0, \\ 2, & x > 0, \end{cases}$ 求 $f(x+1)$ 及 $f(x) + f(-x)$.

解 $f(x+1) = \begin{cases} (x+1)^2 + 2(x+1), & x+1 \leq 0 \\ 2, & x+1 > 0 \end{cases} = \begin{cases} x^2 + 4x + 3, & x \leq -1, \\ 2, & x > -1; \end{cases}$

又 $f(-x) = \begin{cases} (-x)^2 + 2(-x), & -x \leq 0 \\ 2, & -x > 0 \end{cases} = \begin{cases} x^2 - 2x, & x \geq 0, \\ 2, & x < 0, \end{cases}$

所以 $f(x) + f(-x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ x^2 + 2x + 2, & x < 0. \end{cases}$

2. 已知 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\varphi(x)] = \ln x$, 求 $\varphi(x)$.

解 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2 - 1 + 1}{x^2 - 1 - 1}$,

所以 $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$,

$$f[\varphi(x)] = \ln \frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = \ln x,$$

因此 $\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = x, \quad \varphi(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

3. 在下列各题中, 求由给定函数复合而成的复合函数:

(1) $y = u^2, u = \ln v, v = \frac{x}{3}$; (2) $y = \sqrt{u}, u = e^x - 1$;

$$(3) y = \ln u, u = v^2 + 1, v = \tan x; \quad (4) y = \sin u, u = \sqrt{v}, v = 2x - 1.$$

解 (1) $y = \left(\ln \frac{x}{3}\right)^2, x \in (0, +\infty);$

(2) $y = \sqrt{e^x - 1}, x \in (0, +\infty);$

(3) $y = \ln(\tan^2 x + 1), \left\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\right\};$

(4) $y = \sin \sqrt{2x - 1}, x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right).$

4. 指出下列函数是由哪些基本初等函数复合而成的:

(1) $y = \arccos \sqrt{x};$ (2) $y = \ln \sin^2 x;$ (3) $y = x^x;$ (4) $y = \arctan e^{\sqrt{x}}.$

解 (1) $y = \arccos u, u = \sqrt{x};$

(2) $y = \ln u, u = v^2, v = \sin x;$

(3) $y = x^x = e^{x \ln x}, y = e^u, u = x \ln x;$

(4) $y = \arctan u, u = e^v, v = \sqrt{x}.$

5. 以下各对函数 $f(u)$ 与 $u = g(x)$ 中, 哪些可以复合构成复合函数 $f[g(x)]$? 哪些不可复合? 为什么?

(1) $f(u) = \arcsin(2+u), u = x^2;$ (2) $f(u) = \arccos u, u = \frac{x}{1+x^2};$

(3) $f(u) = \sqrt{u}, u = \ln \frac{1}{1+x^2};$ (4) $f(u) = \ln(1-u), u = \sin x.$

解 以下用 $D(f)$ 表示 $f(u)$ 的定义域, 用 $R(g)$ 表示 $u = g(x)$ 的值域.

(1) $D(f) = [-3, -1], R(g) = [0, +\infty), D(f) \cap R(g) = \emptyset,$ 所以不能复合;

(2) $D(f) = [-1, 1], R(g) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right], D(f) \cap R(g) \neq \emptyset,$

所以能复合, $f(x) = \arccos \frac{x}{1+x^2};$

(3) $D(f) = [0, +\infty), R(g) = (-\infty, 0], D(f) \cap R(g) \neq \emptyset,$

所以能复合, $f(x) = \sqrt{\ln \frac{1}{1+x^2}};$

(4) $D(f) = (-\infty, 1), R(g) = [-1, 1], D(f) \cap R(g) \neq \emptyset,$

所以能复合, $f(x) = \ln(1 - \sin x).$

练习 1.7

1. 某公司全年需购某商品 1 000 台, 每台购进价为 4 000 元, 分若干批进货. 每批进货台数相同, 一批商品售完后马上进下一批货, 每进货一次需消耗费用 2 000 元, 商品均匀投放市场(即平均年库存量为批量的一半), 该商品每年每台库存费为进货价的 4%. 试将公司全年在该商品上的投资总额表示为每批进货量的函数.

解 设该商品的总投资总额为 y 元, 每批进货量为 x 台, 则

$$y = 2\,000 \times \frac{1\,000}{x} + 4\,000 \times \frac{4}{100} \times \frac{x}{2} + 4\,000 \times 1\,000$$

$$= \frac{2 \times 10^6}{x} + 80x + 4 \times 10^6.$$

习题一

1. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 证明:

$$|f(x)| = f(x) \operatorname{sgn}[f(x)],$$

其中

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

称为符号函数.

证明 当 $f(x) < 0$ 时, $|f(x)| = -f(x)$, $f(x) \operatorname{sgn}[f(x)] = f(x) \cdot (-1) = -f(x)$;

当 $f(x) = 0$ 时, $|f(x)| = 0$, $f(x) \operatorname{sgn}[f(x)] = 0 \cdot 0 = 0$;

当 $f(x) > 0$ 时, $|f(x)| = f(x)$, $f(x) \operatorname{sgn}[f(x)] = f(x) \cdot 1 = f(x)$.

综上, $|f(x)| = f(x) \operatorname{sgn}[f(x)]$.

2. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上有定义, 证明: $f(x)$ 等于一个奇函数与一个偶函数的和.

证明 设 $F(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$, $G(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$,

可证 $F(x)$ 为偶函数, $G(x)$ 为奇函数且 $f(x) = F(x) + G(x)$, 故 $f(x)$ 等于一个奇函数与一个偶函数的和.

3. 求 $y = |x| + |x-1| - |4-2x|$ 的最大值与最小值.

解 当 $x < 0$ 时, $y = -x + 1 - x - (4-2x) = -3$;

当 $0 \leq x < 1$ 时, $y = x + 1 - x - (4-2x) = 2x - 3$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, $y = x + x - 1 - (4-2x) = 4x - 5$;

当 $x \geq 2$ 时, $y = x + x - 1 - (2x-4) = 3$.

综上, y 的最大值为 3, 最小值为 -3.

4. (1) 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单减函数, 证明: 对任何满足 $\lambda + \mu = 1$ 的正数 λ, μ 及 $x \in [0, +\infty)$, 有下列不等式成立:

$$f(x) \leq \lambda f(\lambda x) + \mu f(\mu x).$$

(2) 设 $\frac{f(x)}{x}$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单减函数, 证明: 对任何满足 $\lambda + \mu = 1$ 的正数 λ, μ 及 $x \in [0, +\infty)$, 有下列不等式成立:

$$f(x) \leq f(\lambda x) + f(\mu x),$$

并由此证明: 对任何正数 a, b , 有下列不等式成立:

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b).$$

证明 (1) 由已知 $0 \leq \lambda \leq 1, 0 \leq \mu \leq 1$,

$$\forall x \in [0, +\infty), x \geq \lambda x, x \geq \mu x.$$

因为 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单减函数, 所以

$$f(x) \leq f(\lambda x), f(x) \leq f(\mu x),$$

$$\lambda f(x) \leq \lambda f(\lambda x), \mu f(x) \leq \mu f(\mu x).$$

两式相加, $\lambda f(x) + \mu f(x) \leq \lambda f(\lambda x) + \mu f(\mu x)$,

所以 $f(x) \leq \lambda f(\lambda x) + \mu f(\mu x)$.

(2) $\forall x \in (0, +\infty)$, 由(1)得

$$\frac{f(x)}{x} \leq \lambda \cdot \frac{f(\lambda x)}{\lambda x} + \mu \cdot \frac{f(\mu x)}{\mu x} = \frac{f(\lambda x) + f(\mu x)}{x},$$

所以 $f(x) \leq f(\lambda x) + f(\mu x)$.

令 $x = a + b, \lambda = \frac{a}{a+b}, \mu = \frac{b}{a+b}$, 代入上式得

$$f(a+b) \leq f(a) + f(b).$$

5. (1) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义, 证明: $y = f(x)$ 的图形关于直线 $x = 1$ 对称的充要条件是 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = f(1-x), x \in \mathbf{R}$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义, 且 $y = f(x)$ 的图形关于直线 $x = 1$ 与直线 $x = 2$ 对称, 证明: $f(x)$ 是周期函数, 并求 $f(x)$ 的一个正周期.

证明 (1) “ $\Rightarrow$ ” $\forall x \in \mathbf{R}$, 由已知, $f(x) = f(2-x)$,

所以 $f(x+1) = f(2-(x+1)) = f(1-x)$.

“ $\Leftarrow$ ” 由已知, $\forall x \in \mathbf{R}, f(x+1) = f(1-x)$,

设 $t = x+1$, 则 $f(t) = f(1-(t-1)) = f(2-t)$.

所以 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = f(2-x)$,

即 $y = f(x)$ 的图形关于直线 $x = 1$ 对称.

(2) $y = f(x)$ 的图形关于直线 $x = 1$ 与直线 $x = 2$ 对称的充要条件是 $\forall x \in \mathbf{R}$,

$$f(x) = f(2-x) = f(4-x),$$

所以 $f(x+2) = f(4-(x+2)) = f(2-x) = f(x)$,

因此 $f(x)$ 是周期函数, 周期 $T_0 = 2$.


6. 设 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处有定义, 证明: $F(x) = \frac{[f(x)]^2}{1+[f(x)]^4}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的有界函数.

$$\text{证明 } |F(x)| = \frac{[f(x)]^2}{1+[f(x)]^4} \leq \frac{[f(x)]^2}{2[f(x)]^2} = \frac{1}{2},$$

所以 $F(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的有界函数.

第2章 极限与连续

§ 2.1 知识结构



§ 2.2 典型题型的解题方法及技巧

一、求数列极限

题型 1 当 $n \rightarrow \infty$ 时, n 项和的极限的求法

【解题思路】 当 $n \rightarrow \infty$ 时, n 项和的极限的求解方法主要有:

① 利用特殊级数求和(如等差数列求和, 等比数列求和)简化数列, 从而简化为易求的极限形式;

② 利用夹逼准则; 具体解法是: 对 n 项和进行适当缩小和放大, 并保证缩小和放大后的两个数列极限相等;

③ 利用定积分的定义(见第 6 章).

例 1 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{4n^2-1} \right).$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}.$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[2 + \frac{\frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)}{1 - \frac{1}{3}} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[2 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right) \right] = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

(3) 因为 $\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{4n^2-1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} (1-0) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例 2 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2-n+1} + \frac{2}{n^2-n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2-n+n} \right).$

解 设 $x_n = \frac{1}{n^2-n+1} + \frac{2}{n^2-n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2-n+n}$, 则

$$\frac{1}{n^2-n+n} + \frac{2}{n^2-n+n} + \cdots + \frac{n}{n^2-n+n} \leq x_n \leq \frac{1}{n^2-n+1} + \frac{2}{n^2-n+1} + \cdots + \frac{n}{n^2-n+1},$$

即 $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2-n+n} \leq x_n \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n^2-n+1},$

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2-n+n)} \leq x_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2-n+1)}.$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2-n+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2-n+1)} = \frac{1}{2},$

由夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$

错解:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2-n+1} + \frac{2}{n^2-n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2-n+n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2-n+1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2-n+1} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2-n+1} \\ &= 0+0+\cdots+0=0. \end{aligned}$$

因为数列极限的四则运算法则只适用于有限个数列的情形.

题型 2 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 求 n 项积的极限

【解题思路】 一种方法是分子分母同乘以一个因子, 使之出现连锁反应; 另外一种方法是通过分解因式使之成为两因子乘积形式, 在整个相乘过程中中间项相抵消, 从而简化为易求的极限形式.

例 3 求下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n} \right);$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}),$ 其中 $|x| < 1;$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^3-1}{2^3+1} \cdot \frac{3^3-1}{3^3+1} \cdot \cdots \cdot \frac{n^3-1}{n^3+1} \right).$$

解 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \cdots \cdot \frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$

$$\begin{aligned} (2) \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})}{1-x} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x^2)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})}{1-x} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x^4)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})}{1-x} \\ &= \cdots \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x^{2^n})(1+x^{2^n})}{1-x} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}, \end{aligned}$$

因为 $|x| < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2^{n+1}} = 0$,

故 原式 $= \frac{1}{1-x}.$

$$(3) \text{因为} \frac{k^3-1}{k^3+1} = \frac{k-1}{k+1} \cdot \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1},$$

又 $\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} = \frac{2}{n(n+1)}, \prod_{k=2}^n \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1} = \frac{n^2+n+1}{3},$

故 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n^2+n+1}{3} \right] = \frac{2}{3}.$

题型3 已知数列的前几项数值及通项的表达式,求数列的极限

【解题思路】先判断极限的存在性(单调性和有界性),可用数学归纳法和不等式的放缩法;再令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$,解关于 a 的方程,从而求得极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

例4 求下列极限:

(1) 设 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, 其中 $a > 0, x_0 > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

(2) 设 $x_1 = 1, x_2 = 1 + \frac{x_1}{1+x_1}, \cdots, x_n = 1 + \frac{x_{n-1}}{1+x_{n-1}}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 (1) 由已知 $x_n > 0, n = 1, 2, \cdots$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \frac{1}{2} \times 2\sqrt{a} = \sqrt{a}, n = 1, 2, \cdots, \text{即} \{x_n\} \text{有下界},$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{x_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{a} \right) = 1, n = 0, 1, 2, \cdots, \text{即} x_{n+1} < x_n, \text{所以} \{x_n\} \text{单调递减},$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 为 l , 由保号性知 $l \geq 0$.

由 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, 两端同时取极限得 $l = \frac{1}{2} \left(l + \frac{a}{l} \right)$, 解得 $l = \sqrt{a}$ (负的舍去).

(2) 由已知 $x_n > 0, n = 1, 2, \cdots$, 以下用数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 单调递增.

$$x_2 - x_1 = \left(1 + \frac{x_1}{1+x_1} \right) - 1 = \frac{x_1}{1+x_1} > 0, \text{即} x_2 > x_1.$$