

中國醫學大辭典

商務印書館國際有限公司

1995年·北京

ZHONGGUO YIXUE DA CIDIAN

中國醫學大辭典

(上、下冊)

編 著 謝 觀

裝幀設計 于名川

出 版 商務印書館國際有限公司
(北京東四南大街 85 號 郵政編碼 100703)

印 刷 河北三河市藝苑印刷廠

經 銷 新華書店總店北京發行所

開 本 787 × 1092mm 1/32

版 次 1921 年 7 月初版

1995 年 3 月重印

1995 年 9 月北京第 2 次印刷

書 號 ISBN 7-80103-024-9/R·1
定 價 180.00 元

第二次改訂四角號碼檢字法

第一條 筆畫分為十種，各以號碼代表之如下：

號碼	筆名	筆形	舉例	說	明	注意
0	頭	上	言主广宀	獨立之點與獨立之橫相結合		0 4 5 6 7 8 9 各
1	橫	一九八	天 土 地 江 元 風	包括橫刀與右鉤		種均由數筆合為一
2	垂	丨ノ丨	山 月 千 則	包括直撇與左鉤		後筆。檢查時遇單
3	點	、 丶	山 木 一 𠂇 之 衣	包括點與捺		筆與複筆並列，應
4	义	十 义	草 杏 皮 刈 大 莖	兩筆相交		儘量取複筆；如此
5	插	才	才 戈 申 史	一筆通過兩筆以上		作0不作3，才作
6	方	口	國 鳴 目 四 甲 由	四邊齊整之形		4不作2，厂作7
7	角	𠂇 L F T	羽 門 𠂇 陰 雪 衣 學 罩	橫與垂相接之處		不作2，𠂇作8不
8	八	八 人 人	分 頁 羊 余 災 余 死 午	八字形與其變形		作32，𠂇作9不
9	小	小 小 小 小	突 絲 蘭 畢 惟	小字形與其變形		作33

第二條 每字祇取四角之筆，其順序：

(一) 左上角 (二) 右上角 (三) 左下角 (四) 右下角

(例) (一) 左上角 端 (二) 右上角

(三) 左下角 端 (四) 右下角

檢查時按四角之筆形及順序，每字得四碼：

(例) 頭 = 0128 截 = 4325 瞬 = 6789

第三條 字之上部或下部，祇有一筆或一複筆時，無論在何地位，均作左角，其右角作0。

(例) 宣 直 首 冬 畫 宗 母

每筆用過後，如再充他角，亦作0。

(例) 干 之 持 掛 犬 十 車 時

第四條 由整個口門所成之字，其下角取內部之筆，但上下左右有他筆時，不在此例。

(例) 圓 = 6043 閉 = 7734 闔 = 7712

齒 = 4466 潤 = 7712

中國醫學大辭典索引說明

本辭典單字及名詞，均依筆畫順序編次；檢查仍感不便。茲特採用四角號碼檢字法編為索引，體例如下：

(一)單字註四角號碼及附角之號碼於本字之上；

例 0010。立

(二)名詞除第一字四角號碼已見該名詞上面單字用～記號代表外，第二字取上二角之號碼於本條之上；

例 0010。立

08 ~ 效 神 散

(三)名詞之第三字，仍依號碼順序排列，但不註號碼；

例 0010。立

08 ~ 效 方

~ 效 神 散

(四)名詞之下所註數字，代表頁數，點下之數字代表格數；

例 立效神散 949.1 即九百四十九頁第一格

(五)名詞之下數字之前所註「補」字，代表補遺；

例 主藥補 74.1 即補遺第七十四頁第一格

(六)每頁版心所列之數字，為本頁起訖號碼；

(七)四角號碼檢字法詳見次頁。

附 則

I 字體均照楷書如下表

正 𠂇 巳 反 丶³ 戸 安 心 卄³ 刂³ 业³ 亦³ 草⁴ 真⁴ 軌⁴ 罷⁴ 衣³
誤 佳⁵ 巳 反 丶¹ 戸 安 心 卄¹ 斤¹ 及³ 垝³ 亦³ 草¹ 真¹ 軌⁶ 罷² 衣³

II 取筆時應注意之點

- (1)𠂇𠂇等字，凡點下之橫，右方與他筆相連者，均作3，不作0。
 (2)𠂇𠂇門等字，方形之筆端延長於外者，均作7，不作6。
 (3)角筆之兩端，不作7，如𠂇𠂇。
 (4)交义之筆，不作8，如𠂇𠂇。
 (5)𠂇𠂇中有二筆，水𠂇𠂇中有二筆，切不作小形。

III 取角時應注意之點

- 1獨立或平行之筆，不問高低，概以最左或最右者為角

(例) 非 健 疾 浦 帝

2 最左或最右之筆，有他筆蓋於其上或承於其下時，取蓋於上者為上角，承於下者為下角。

(例) 宗 幸 寧 共

3. 有兩複筆可取時，在上角應取較高之複筆，在下角應取較低之複筆。

(例) 功 盛 頗 鴨 奉

4 斜撇為他筆所承，取他筆為下角。

(例) 春 垦 碰 衣

5 左上之撇作左角，其右角取右筆。

(例) 勾 鈎 侔 鳴

四角同碼字較多時，以右下角上方最貼近而露鋒芒之一筆為附角；如該筆畫已用過，則附角作〇。

(例) 英₀⁴=44710 元¹ 洋¹ 是¹ 痘² 故² 畜³ 残³ 主⁴ 難⁴ 霖⁴

我拼蠻覽功郭癡愁金遠仁見

附角仍有同碼字時，得按各該字所含橫筆（即第一種筆形，包括橫亅及右鈎）之數順序排列。

例如市，帝字含有二横，市字含有三横，故帝之在前四角，市字在後四角，均同餘，照此類推。

中國醫學大辭典補遺

一 畫

【一上散】●張潔古方。功用療蠍蟻痛。藥品生半夏。雄黃（另研）各一字。巴豆一個（去皮研如泥）。用法研爲細末。和勻敷之。●朱丹溪方。功用療疥瘡痛癩。或喜湯火烘洗。藥品蛇牀子（略炒）雄黃（另研）黑狗脊寒水石（另研）白膠香（銅錢熬熔過傾乾石頭上放冷）各一兩。白礬黃連各五錢。吳茱萸三錢。硫黃二錢五分（另研）斑蝥十四枚（去翅足）。用法研爲細末。先以蒼耳草或羊不食草藤濃煎湯洗去瘡痂。然後用香油調敷。●證治準繩方。○功用療皮膚燥癩生瘡。藥品苦參一兩。白芷。礬硝枯礬各五錢。荆芥穗。白芨各三錢。寒水石二兩（煅）。用法研爲末。油調塗。●功用療疥癬。藥品雄黃。熟硫黃。黑狗脊。蛇牀子（炒）各五錢。寒水石六錢。斑蝥（去翅足研碎）三個。用法先以雄黃硫黃寒水石研如粉。次入斑蝥和。

勻。蛇牀子黑狗脊另爲細末。同研勻。洗疥癩令湯透去。奶油調手中擦熱。鼻中嗅二三次擦上可一上即愈。如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍。如不苦癩。加狗脊微癩。加蛇牀子。瘡孔中有蟲加雄黃喜火炙湯。燙加硫黃。口臭不止亦可愈。

【二字金】證治準繩方。○功用治嬰孩七日外。欲成臍風撮口。及卒中急慢驚風。牙關緊閉。痰涎壅上。藥品殼蠶（炒去絲）威靈仙（去蘆）各四錢。生明礬二錢。細辛（去葉）一錢。生甘草二錢五分。用法剉焙爲末。每服一字至半分。薑汁沸湯調勻。以指抹入牙關內。卒中急慢驚證。口噤不開。用鹽梅湯調擦上下牙根二處。

【一字神散】婦人良方。○功用治胎死或胞破。藥品鬼臼（黃色者去毛。碾極細如粉。不用羅。以手指燃之。）不拘多少。用法每服二錢。無灰酒一盞。煎至八分。通口服。

【一赤散】證治準繩方。○功用療損傷。敷藥後起疱者。藥品赤石脂。大黃。石膏（煅）各等分。用法研爲細末。先

以稜鍼挑破。然後搗藥。

【一抹金】證治準繩方。**功用**治小兒遍身生瘡潰爛燥

痛。膿汁不乾。**藥品**藜蘆(淨洗焙)蛇牀子(去埃土)

紅丹(水飛)各五錢。硫黃。赤石脂。明白礬(水飛)五倍子(去蟲屑)黃檗(去粗皮)各二錢五分。輕粉五十帖。(後入)用法曬焙爲末。同輕粉在乳鉢再杵匀。用生肥豬膏碎切。以瓦鉢和藥末爛杵。塗抹患處。或清油調塗。

【一抹散】證治準繩方。**功用**療乾癬不瘥。**藥品**天南星。

草烏頭各一枚。用法生研細末。羊蹄根搗絞取汁調塗。不過三次即瘥。

【一物獨活湯】小品方。**功用**治產後中風體虛者。**藥品**川獨活三兩(切細)用法清水三升。煮取一升。分服。

耐酒者亦可酒水煮。與白鮮皮合煮之亦得。

【一匙金】沈氏尊生書方。**功用**治小兒疹後風及痘後脫痂風。癰蟲白花蛇(去骨刺炒褐色)三分人指甲一分五釐(炒黃色)用法研爲細末。用透骨草麻黃各三錢。入水酒各半杯。煎三沸。去渣調下。蓋臥微汗。

卽愈。如兒小。分作三服。

【一捻金】**一**蕭存敬方。卽愈風散用古老錢煎湯也。治

詳愈風散條。**二**證治準繩方。用法治眼睛痛。**藥品**乳

香沒藥。黃連。雄黃。益硝。各等分。(一方加片腦麝香。各少許)**功用**研爲細末。搐入鼻內。**二**醫宗金鑑方。榔各等分。用法研爲細末。每服一字。蜜水調下。

【一粒金】李東垣方。**功用**治偏頭風。**藥品**白芷。川芎。葛

(豬肉汁杵勻。入膽內。懸待陰乾用)玄胡索。青黛。各一兩。製法共研細末。無根水爲丸。用法每用一丸。無根水化開。搐入鼻內外。以銅錢咬口內出涎。

【一粒笑】徐氏方。**功用**治一切牙痛浮腫。**藥品**五靈脂。

麝香各一錢。蟾酥二錢。製法先將二味研末。蟾酥烊化。作粒如麥子大。用法每用少許。嵌於患處。痛立止。

如虛火牙痛。止後接服知橐八味丸。老人服還少丹。**二紫散**證治準繩方。**功用**療損傷眼胞青黑紫色腫痛。**藥品**紫金皮(童便浸七日曬乾。餘處傷不用製)。生地黃各等分。用法搗爛茶清調勻敷貼。

【一勝膏】證治準繩方。功用治癰疽初生。藥品白芷紫

荊皮。用法研爲細末。酒調塗能令內消。

【一筆鉤】卽一筆消。

【黃散】證治準繩方。功用療打撲傷痕紫黑。瘀血流注有熱者。藥品大黃不拘多少。用法研爲末。薑汁調溫敷。

【一塊氣丸】證治準繩方。功用治傷寒心膈膨脹。腰痛。

欬嗽吐逆。風熱閉塞下元虛冷。大小便祕。脫肛。小腸氣赤白痢。婦人一切血氣血昏。經脈不通。血崩。亦白帶下。血塊氣血胎前產後諸疾。室女經閉。小兒驚風。

脾積。姻脾藥品官桂。玄胡索。蓬莪茂。泡薑黃。縮砂仁。枳實。枳殼。黑牽牛頭末。檳榔。大黃。醋煮雷丸。使君子肉。白豆蔻。丁香各五錢。芫花。酒浸炒。香附子。(醋浸)京三稜。泡陳皮。去白。胡椒各一兩。糖桂。青皮各一兩五錢。川烏頭二錢五分。酒浸炒。錫灰。大麥芽(用江子炒熟去江子)各四兩。蘿蔔子一兩。(用江子炒熟去江子)江子一兩。去油沈香木香各四兩。阜角八兩。(去皮醋浸炒)鹽法共研末。酒煮

米糊爲丸。如梧桐子大。用法每服五七丸。常服淡薑湯送下。①傷寒。葱白湯下。②心膈膨脹。新汲水下。③腰痛。牽牛湯下。④欬嗽。烏梅湯下。⑤吐逆。生薑湯下。

⑥下元虛冷。好酒下。⑦風熱便祕。井花水。豆粉調下。

⑧脫肛。艾葉湯下。⑨小腸氣。茴香湯下。⑩白痢。乾薑湯下。⑪赤痢。甘草湯下。⑫婦人血氣血昏。當歸酒下。

⑬經脈不通。紅花當歸煎酒送下。⑭血崩。燕子泥湯下。⑮赤白帶下。蔓荆子湯下。⑯血塊氣血。生薑。橘皮。煎湯加醋少許送下。⑰胎前產後。吳茱萸一兩。黃酒一升。煎至二沸送下。⑱室女經閉。紅花當歸煎酒送下。⑲小兒驚風。一歲一丸。薄荷湯下。⑳脾積。使君子

一升。煎至二沸送下。㉑姻脾。橘皮湯下。㉒孕婦不可服。忌一切熱物。

【一煎散】醫宗金鑑方。功用治臘毒之屬於陽證。及在

肛門外者。藥品當歸尾。穿山甲(炙研)。甘草。桃仁泥。阜角刺各二錢。川黃連一錢五分。枳殼(麸炒)。檳榔。黃各三錢。紅花五分。用法清水二鍾。浸一宿。次早煎。

一滾。空腹時服。俟大便行三四次。以稀粥補之。

【一滴金】一滴金丸之簡稱。

【一滴金丸】奇效方。**功用**治首風偏正頭風。**藥品**人中白(煅)地龍(曬乾)各等分。翻搗共研細末。羊膽汁爲丸。如芥子大。**用法**每用一丸。新汲水一滴。化開滴兩鼻中。

【一醉散】卽一醉膏之第一方。

【一醉膏】**證治準繩方**。**功用**治心病。**藥品**香油四兩。無灰酒二碗。楊柳枝二十條。**用法**先將無灰酒。香油和勻。用柳條逐條攪一二百下。候香油與酒相入成膏。煎至八分灌之。熟睡迨醒。或吐或下。卽安。**二沈氏尊生書方**。**功用**治癰疽。發背。乳癰。初起。**藥品**甘草五錢。沒藥二錢五分。瓜萎一個(去皮研爛)。**用法**黃酒三碗。煎至一碗半。分溫二服。重者再進一服。以瘥爲度。或加當歸。白芷。乳香。尤妙。如要宣毒。加阜角刺一錢。

二 畫

【丁虎湯】沈氏尊生書方。**功用**治妊娠惡阻。**藥品**丁香。白朮。人參。甘草。**用法**清水煎服。

【丁泥散】沈氏尊生書方。**功用**治瘡瘍不收口。**藥品**孩兒茶一錢五分。珍珠五分。乳香。沒藥各二分。冰片一分。絲線(燒存性)七分。**用法**共研細末。撒於患處。約厚一文錢。以紙裹縛。如結卽已。有水出。再洗。摻。

【丁砂散】瑞竹堂經驗方。**功用**烏髭髮。**藥品**母丁香十五個。鍼砂(醋炒七次)。高茶末各少許。訶子(大者)一個。百藥煎一錢。**用法**研爲細末。清水一大碗。熬數沸。不去渣。貯淨瓷器內。更浸新釘於藥中。尤佳。**用法**每夜臨臥時。溫漿水洗淨。髭髮用藥水掠之。次早仍以溫漿水洗淨。百日自黑。

【丁香丸】婦人大全良方。**功用**治婦人癰痞結塊。心腹疼痛。**藥品**雄雀糞(炒黃)。鼈甲各一兩。當歸(焙)。硝砂。芫花(醋炒乾)各五錢。巴豆(去皮心油)二分五釐。**用法**共研細末。醋煮麪糊爲丸。如小豆大。**用法**每服三丸。當歸酒送下。

【丁香五套丸】太平惠民和劑局方。**功用**治胃氣虛弱。

三焦痞澀。不能宣行水穀。致成痰飲。結聚胸膈。嘔吐惡心。脹滿不食。常服溫脾順氣藥品。丁香(勿見火)。木香。青皮。陳皮(去白)各五錢。南星(每個切作十數塊)。同半夏先用酒浸三日。每日易水一次。次用白

礬二兩研碎。調入水內。再浸三日。洗淨焙乾。半夏。

(切破)各二兩。乾薑(泡)白朮。高良薑。茯苓。各一兩。製法研爲末。神麴一兩。大麥蘖二兩。同研取末。打糊爲丸。如梧桐子大。用法每服五十九。加至七十九。不拘時熟湯送下。

【丁香柿蒂湯】●證治準繩方。功用治欬逆。丁香。十粒。柿蒂十五枚。用法咬咀。清水一盞半。煎至八分。去滓熱服。●沈氏尊生書方。功用治胃寒呃逆。丁香。人參。茯苓。高良薑。橘皮。半夏。各五錢。甘草。二錢五分。生薑七錢五分。用法研爲粗末。每服三錢。清水煎服。或調蘇合丸服。

【丁香黃耆散】證治準繩方。功用治小兒脾胃虛弱。不能飲食。榮衛傷損。肌體羸瘦。時時下痢。面色青白。丁香。黃耆(剉)。吉林人參(去蘆頭)。白朮。當歸。

(洗。焙乾。)蜜甲(塗酥炙黃。去裙襠)各一兩。胡黃連。甘草(炙)各五錢。用法搗羅爲細末。每服一錢。清水一盞。加生薑二片。大棗二枚。煎至五分。去滓。食前溫服。

【丁香棟實丸】卽酒煮當歸丸之第一方。

【丁香煮散】●太平惠民和劑局方。功用治脾胃虛冷。嘔吐不食。丁香(不見火)。紅豆。甘草。乾薑。青皮。川烏頭(去皮)。陳皮。高良薑。胡椒。益智。各等分。用法剉散。每服三錢。清水一盞。加生薑三片。煎至六分。入鹽一捏。不拘時服。●證治準繩方。功用治反胃呃逆。丁香(一作三七粒)。石蓮肉(去心)。嚙泄瀉瀉。●此做附子梗米湯之制。彼用粳米。此用糯米。皆取其直達胃腑。雖其勢稍平。亦是突圍之將。此做附子梗米湯之制。彼用粳米。此用糯米。皆取其直達胃腑。雖其勢稍平。亦是突圍之將。

八錢。附子。蛇牀子。芎藭各六銖。山茱萸。天雄。人參。茯苓。黃耆。牛膝各五錢。桂心十銖。蕤。十一銖。巴戟。天。十二銖。用法研爲細末。每服方寸匕。溫酒調下。每日二次。如不知增至二匕。以知爲度。禁如藥法。不能酒者。蜜丸服亦可。

【七生丸】證治準繩方。功用治頭風。痰厥。氣厥。飲厥。傷寒。傷風。頭痛不可忍者。藥品川烏頭。草烏頭。天南星。（並去皮）半夏。（冷水洗去滑）川芎。白芷。石膏。各等分。製法並生研細末。韭菜研自然汁爲丸。如梧桐子大。用法每服七丸。加至十九丸。食後嚼生葱。茶送下。一日二次。

【七生湯】沈氏尊生書方。功用止血。藥品生地黃。生荷葉。生藕節。生茅根。生韭菜。各一錢。生薑。五錢。用法共搗取自然汁一碗。濃磨陳京墨同服。

【七味散】千金方。功用治久痢不瘥。藥品黃連。八分。龍骨。赤石脂。厚朴。烏梅肉。各二分。甘草（炙）。一分。阿膠。七分。用法研爲細末。每服二方寸匕。小兒一錢。七漿水調下。一日二次。

【七味鴨】驗方。功用治陰虛勞傷。欬嗽痰喘。藥品生地黃。熟地黃。當歸。身。茯神。白朮。土炒各三錢。川貝母。二錢。地骨皮四錢。製法用老鴨一隻。去毛。原湯洗淨。去肚雜。不可再見水。將前藥加陳甜酒一碗。生曬薑油三酒杯。同入鴨肚內。縫緊。用瓦蓋。盆盛時。盆內不可放水。蓋好。以棉紙將盆蓋縫封固。放在鍋內。亦不可放水。鍋蓋蓋好。稻草三斤。打成小草結。對鍋腑慢慢燒之。如鍋太熱。少停再燒。草完鴨爛可食。能飲再加老酒送服。

【七星妹】卽十姊妹。

【七星丹】提毒丹之別名。

【七星散】證治準繩方。功用治痘瘡乾焦發癢。藥品黃耆。芍藥。各二錢。人參。桂心。各一錢。黑魚一個。用法研爲末。置黑魚腹內。升麻酒煮熟。連藥食之。凡癰在上焦者。食頭。在中焦食身。在下焦食尾。亦驗方也。

【七星劍】七星劍湯之簡稱。

【七液丹】驗方。功用治癰瘍。時毒。傷寒。暑風。卒忤。爛喉痧。證。癰瘍。諸般瘻氣。霍亂吐瀉。瘡痢。諸痢。一切癰疽。

毒瘡。藥品鮮蘿蔔。鮮佩蘭。鮮側柏。鮮藿香。鮮紫蘇。生大黃各三十兩。鮮荷葉九十兩。滑石(飛)三百兩。製法逐味打爛取汁。拌滑石逐味拌七次。曬乾收貯。用法每服三錢。小兒減半。熟湯調下。二三次即愈。紅痢。梔子湯下。白痢。薑湯下。痛痢及噤口痢。木香湯下。論此方有起死回生之功。誠萬病之靈丹。不論男婦老幼胎前產後。並可用之。

【七棗湯】濟生方。功用治臟腑虛弱。痃癰時作。或寒多熱少。或但寒者。藥品附子一枚。(炮製以鹽水浸。再炮。如此七次。不浸去皮臍。或以川烏代附子。水調陳壁土爲糊。浸炮七次。)用法分作二服。清水一碗。加生薑七片。大棗七枚。煎至七分。臨發日早溫服。

【七葉樹】娑羅之別名。

【七製固脂丸】驗方。功用補火。壯陽。固精。種子。保真元。

壯筋骨。健脾胃。長精神。除疾病。治命門火虧。下元虛損。耳聾眼花。腰痛腿軟。腎冷精流。陽痿不舉。小便過多。筋骨疼痛。肚腹畏寒。脾胃虛弱。飲食難消。夜多盜盜。

汗。精神疲倦。時愛躺臥。藥品固脂十斤。製法(甲)淘米水泡一夜。曬七日。(乙)黃藥二斤。熬濃汁。泡一夜。曬七日。(丙)杜仲二斤。照前法製。(丁)生鹽二斤。照前法製。(戊)魚鰾三斤。照前法製。(己)核桃肉六斤。照前法製。(庚)黑棗。糯米各三斤。共煮粥。將固脂磨細末。忌鐵器。和勻。搗融爲丸。如梧桐子大。用法每服一錢。空腹時淡鹽湯送下。服至一月後加三分。加至二錢爲止。忌食羊血。油菜。菜油。若陰虛水虧者。早服此丸。晚服六味地黃丸。則水火兼補。不致偏枯。服至半年後方效。

【七竅出血】耳目口鼻一齊出血者。治法如下。(一)由上虛下竭而致者。最爲危候。宜急用冷水噀其面。婦女則兼分開頭髮。以水噀之。男子則用粗紙數層。冷醋浸透。搭頸門上。血立止。隨以補血湯服之。使血脈歸經。再加調理。或可得生。(二)因中毒而致者。宜用刺蝟皮(煅存性)爲末。每服三錢。酒調下。立止。參看九竅出血條。

【七釐散】驗方。功用治跌打損傷。瘀血停滯。遍身疼痛。

藥固血竭(另研)一兩。乳香(去油)沒藥(去油)紅

花各一錢五分。孩兒茶二錢四分。硃砂(飛)一錢二分。麝香冰片各一分。二釐。(一作各三分)。製法研爲細末。瓷瓶密收。蠟封口勿泄。氣愈久愈佳。用法每服七釐。(一作一分)。童便或溫酒送下。不可多。孕婦但可外敷。不可內服。

【七寶洗心散】醫宗金鑑方。功用治目眞赤脈。藥品當歸。赤芍藥。黃連。大黃。梔子。各一錢。麻黃。荆芥。各八分。

用法研爲粗末。清水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

【七寶湯】證治準繩方。功用治寒熱往來。藥品當歸。赤芍藥。黃連。大黃。梔子。各一錢。麻黃。荆芥。各八分。

用法研爲粗末。清水二盞。煎至一盞。去滓。食後溫服。

(去蘆)知母。生地黃。各五錢。柴胡(去蘆)。秦艽。甘草。

(炙)前胡(去蘆)。各二錢五分。用法咬咀。每服五錢。清水一盞半。加人參三寸。煎至七分。熱服。●功用治內障橫翳。橫著瞼人中心。起如劍脊。藥品羊角(鏘)各一兩。胡黃連。車前子。甘草(炙)。石決明(刮洗。搗研)。丹砂(另研)各五錢。用法除丹砂。決明外。餘粗篩搗。每服三錢。匕。清水一盞。煎至七分。去滓。入丹砂末五分。決明末一字。再煎兩沸。用鍼撥翳。食後溫服。

【九天丹】驗方。功用治爛風眼。藥品真珠水。晶貝齒。各一兩。石決明。琥珀。各七錢五分。空青。瑪瑙。龍腦。各五錢。製法研爲細末。和勻。清水五升。石器內煎至一升。去滓。再煎至一盞。入蜜五錢。煎和爲膏。用法每用少許。夜臥時點之。早晨不得點。

【九子瘍】證治準繩方。功用治混睛外障。藥品真珠水。晶貝齒。各一兩。石決明。琥珀。各七錢五分。空青。瑪瑙。龍腦。各五錢。製法研爲細末。和勻。清水五升。石器內煎至一升。去滓。再煎至一盞。入蜜五錢。煎和爲膏。用法每用少許。夜臥時點之。早晨不得點。

【九子瘍】證治準繩方。功用治混睛外障。藥品真珠水。晶貝齒。各一兩。石決明。琥珀。各七錢五分。空青。瑪瑙。龍腦。各五錢。製法研爲細末。和勻。清水五升。石器內煎至一升。去滓。再煎至一盞。入蜜五錢。煎和爲膏。用法每用少許。夜臥時點之。早晨不得點。

【九天丹】驗方。功用治爛風眼。藥品真珠水。晶貝齒。各一兩。石決明。琥珀。各七錢五分。空青。瑪瑙。龍腦。各五錢。製法研爲細末。和勻。清水五升。石器內煎至一升。去滓。再煎至一盞。入蜜五錢。煎和爲膏。用法每用少許。夜臥時點之。早晨不得點。

【九仙靈應散】沈氏尊生書方。功用治陰囊溼瘻。製品附子(炮)蛇牀子紫梢花石菖蒲遠志海螵蛸蟄丁香木鼈子各二錢小茴香一錢五分。用法研爲粗末。每用五錢。清水三碗。煎至一碗半。溫洗患處并陰囊。每日二次。留水再溫洗。多洗尤妙。

【九君子湯】卽麥門冬湯之第四方。

【九味柴胡湯】證治準繩方。功用治肝經熱毒下注。便毒腫痛。或小腹脅間結核。及肝膽經部分一切瘡瘍。或風毒惡核瘰癧。藥品柴胡(炒)黃芩(炒)各五分。人參(炒)半夏龍膽草(炒)當歸芍藥(炒)各三分。甘草二分。用法清水煎服。腫痛赤色元氣無虧者宜用。潰後腫消痛止者不宜用。

【九物牛黃丸】九精丸之別名。

【九種胃痛丹】驗方。功用治九種胃脘攻痛。製品川五倍子八兩(洗淨刮去毛曬乾)。製法研爲末。生薑汁泛

泛丸。如菜菔子大。用法每服四五分。痛時生薑湯送下。

【九精丸】證治準繩方。功用治男子爲鬼魅糾纏欲死。驚怖無休者。藥品牛黃(土精)一云火精。龍骨(水精)荆實(人精)玄參(玄武精去蘆)赤石脂(朱雀精)玉屑(白虎精)曾青(蒼龍精)空青(天精)雄黃(地精無石者炒)各一兩。製法共研細末。煉蜜爲丸。如小豆大。用法每服一丸。熟湯送下。每日三次。以知爲度。

【九製香附丸】驗方。功用治經水不調。崩漏。帶下。胎前產後癥瘕。積聚氣逆。血塊。腹痛。令人有子。藥品金華香附一斤。製法分作九份。①酒浸。②醋浸。③鹽水浸。④童便浸。⑤小茴香二兩。煎汁浸。⑥益智仁二兩。煎汁浸。⑦萊菔二兩。煎汁浸。⑧丹參二兩。煎汁浸。⑨生薑汁浸。各浸春三夏一秋三冬七日。同艾絳四兩。用無灰酒煮燥。焙乾研末。酒煮神麃打糊爲丸。如梧桐子大。用法每服四錢。熟湯送下。

【九製硫黃丸】驗方。功用補先天本元。健脾胃。壯筋骨。

卻百病。治虛弱齒落陽痿。久服面如童顏。老當益壯。
藥品舶硫黃。(土硫黃不可用)。製法。①用老白豆腐。將黃研末。用淨砂鍋。以竹籬夾鍋底。籬上蓋豆腐一層。鋪黃一層。疊疊鋪好。入水煮至豆腐黑黃色爲度。用清水漂淨腐渣。再煮二次。每黃一斤。豆腐一斤。或黑豆拌煮亦可。②用大蘿蔔挖空。將黃末入內。蓋緊縛好。慢火煮至蘿蔔黃黑爛爲度。清水漂淨。復煮二次。或蘿蔔切片拌亦可。一黃二薑。④將鮮紫背浮萍洗淨。拌黃末。煮至黃腐爛爲度。但萍根鬚葉最多。清水漂淨。或打爛取汁拌煮亦可。一黃三萍。①用新綠豆揀淘洗淨。以黃末拌煮。至豆爛爲度。清水漂淨。一黃二豆。②用石菖蒲或菖蒲洗淨。切小段。拌黃末。入水煮至爛爲度。取汁拌煮更妙。③松柏葉各半。洗淨去枝用葉翦碎。拌黃煮至葉爛爲度。清水漂淨。或藕或梨或藕梨各半。切片同黃煎至藕梨爛爲度。④肥豬大腸洗淨氣味。將黃末研細漂淨。裝入大腸。兩頭繫緊。勿令走漏。煮至大腸熟爛爲度。清水泡過夜。澄出陰乾。⑤用地黃二兩。全當歸。天門冬。麥門冬。各

一兩。川芎。陳皮。枸杞。杜仲。茯苓。甘草。(炙)前胡。防風。澤瀉。蛇牀子。五加皮。各五錢。每黃一斤。用藥一料。照黃遞加。用清水煎濃。將黃末投入。煎至藥汁乾。起出陰乾。用糯米煮粥拌爲丸。如綠豆大。陰乾。瓷瓶裝收。用法。每服第一月用三分。第二月四分。三月六分。四月八分。五月一錢。每月遞加。至二錢爲度。空腹時鹽湯送下。如恐服久發毒。病愈則止。自無妨礙。忌一切牲畜血及細辛。

【九製黃耆】功用補虛弱。治婦人體虛血崩。及產婦虛證。

藥品縣黃耆一斤。(洗淨切片。烘乾)。製法。①用木通二兩。煎水泡一夜。曬乾。②升麻一兩。照前法製。③牡丹皮二兩。四錢。照前法製。④沙參三兩。五錢。照前法製。⑤玉竹四兩。六錢。照前法製。⑥附子一兩。照前法製。⑦五味子二兩。照前法製。⑧防風二兩。照前法製。⑨蜜糖三兩。拌炒製完。蒸過七日。用法。每服二錢。清水一杯。飯上蒸好。臨食和酒少許服。渣再煎服。

【二丹丸】證治牽絆方。功用治健忘。養神定志。和血安神。

神清中外華勝理。藥品天門冬（去心）熟地黃丹參。

各一兩五錢白茯苓（去皮）麥門冬（去心）甘草各一兩遠志（去心）人參（去蘆）各五錢。研爲細末。煉蜜和丸。如梧桐子大。硃砂五錢（研極細）爲衣。用法每服五十九加至一百丸。空腹時煎愈風湯送下。雜論此方爲安神清中之劑。

【二仁丸】證治準繩方。功用治虛人老人風祕不可服。峻藥者。藥品杏仁（去皮尖。炒黃另研）。麻仁（另研）。枳殼（去瓢。炒赤）。阿子（慢火炒。搗去核）。各等分。研末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。用法每服三十九。熟湯送下。

【二仙飲】證治準繩方。功用治諸瘧。藥品青蒿（去梗。調下）二兩桂枝（去粗皮）五錢。用法剉焙爲細末。每服一錢。寒熱未發前或先隔晚涼酒

【二冬】麥賣冬天賣冬也。

【二朮二陳湯】張氏醫通方。功用治肺虛痰食不運。藥品二陳湯加生白朮（薑汁拌曬）。茅山蒼朮（麻油

拌炒）用法與二陳湯同。

【二母湯】證治準繩方。功用治肺勞實熱。面目浮腫。欬喘急煩。熱頰赤。骨節多痛。乍寒乍熱。齶齒知母貝母（去心膜）杏仁（去皮尖炒）。甜草薑（炒）甘草各五錢。半夏（製）秦艽橘紅各一兩。用法每服四錢。清水一盞。加生薑五片同煎。不拘時溫服。

【二甘湯】沈氏尊生書方。功用治胃虛不能納穀。藥品生甘草。炙甘草。五味子。烏梅各等分。用法研爲末。每服五錢。加生薑二片。大棗一枚。清水煎服。

【二白丸】醫壘元戎方。功用治小兒痰溼生蟲。藥品白礬一塊（約一兩）。研末用生蒸餅裹蒸熟去皮。入輕粉一字或五分爲丸。如梧桐子大。用法每服二三十丸。生薑湯送下。

【二石散】沈氏尊生書方。功用治女勞疽。藥品滑石石膏各等分。研爲末。每服方寸匕。大麥汁送下。每日三次。小便大利即愈。如腹滿者不治。

【二妙湯】驗方。功用治一切風溼癱瘓。筋骨疼痛。藥品生甘草。威靈仙各一斤。用法清水一石。將藥煎五六

滾入大缸內。用板凳坐其中。周圍用布圍住。乘熱薰之。待水溫渾身洗透。務使汗出。護避風寒。卽愈。

【二妙蒼蠻散】卽二妙散之第一方。

【二味黑錫丹】卽黑錫丹第一方之第二種。

【二和丹】來復丹之別名。

【二和湯】證治準繩方。功用消食扶氣。藥品藿香、附子各等分。用法研爲極細末。每服二三錢。滾水放溫調下。

【二花散】證治準繩方。功用治小兒痘瘡已出未出。不發不起。隱在皮膚之間。兼治熱證。藥品梅花(陰乾)一兩。桃花(陰乾)絲瓜(陰乾)各五錢。硃砂(水飛過)二錢。甘草一錢(去皮火煅)。用法研爲細末。每服五分五釐。痘未出時蜜湯調下。

【二活散】沈氏尊生書方。功用通經絡。散瘡腫。藥品羌活、獨活、當歸、烏藥、赤芍藥、連翹、金銀花(酒洗)、天花粉、白芷、甘草節各五錢。紅花、蘇木、荆芥、蟬退、葛根各三錢。檀香二錢。用法共研爲末。每服三錢。蒼耳子煎湯調下。

【二皇】伏羲、神農也。(素問著至教論)著至教。疑於二皇。

【二美散】驗方。功用治臍疥瘡。藥品吳茱萸、硫黃各等分。用法研細如麪粉。照合掌散法摩擦。每日二次。愈後再擦三四日。

【二苓清利飲】沈氏尊生書方。功用補陰。藥品茯苓、猪苓、生地黃、麥門冬、牡蠣、澤瀉、甘草、黃芩、黃藥、車前子。用法清水煎服。

【二海丸】證治準繩方。功用治氣壅。藥品海藻、昆布、各等分。製法酒洗曬乾。共研末。煉蜜爲丸。如杏核大。用法每服一丸。稍稍嚥汁。又用海藻洗淨切碎。油醋煎熟作常菜食之。

【二英散】沈氏尊生書方。功用治茄病。藥品吳茱萸、山茱萸、川棟子各一錢。白蒺藜九分。海藻、延胡索、桔梗、青皮各八分。小茴香、五味子各七分。茯苓五分。用法研爲末。每服三錢。米湯調下。

【二參湯】醫宗金鑑方。功用治胃經虛火。牙齦肿。藥品人參、玄參各等分。用法清水煎。溫服。