

实用传染病 中草药彩色图集

黄元金 彭治章 编著

广东科技出版社



62

实用传染病中草药彩色图集

黄元金 彭治章 编著

广东科技出版社
· 广 州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

实用传染病中草药彩色图集 / 黄元金, 彭治章
编著. — 广州: 广东科技出版社, 2003. 5

ISBN 7 - 5359 - 3222 - 3

I. 实… II. ①黄…②彭… III. 传染病 - 中
草药 - 图谱 IV. R287 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 003327 号

出版发行: 广东科技出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号 邮编: 510075)

E-mail: gdkjzbb@21cn.com

http: // www. gdstp. com. cn

经 销: 广东新华发行集团

印 刷: 广东惠阳印刷厂

(广东省惠州市南坛西路 17 号 邮编: 516001)

规 格: 787mm × 1092mm 1/32 6.75 印张 字数 150 千

版 次: 2003 年 5 月第 1 版

2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 8 000 册

定 价: 30.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换。

前 言

本书是作者积累多年行医实践，并搜集、整理古今诸多民间方剂、传统经验及参照有关医药文献资料综合编著而成。

我国地域宽广，气象条件复杂，中草药资源丰富而又东西南北各有差异。限于篇幅，本书仅在偏向于中、南部的中草药资源里收载常见常用的中草药 100 种，并精选治疗传染病较为有效的验方 218 条。

本书收载部分现代中草药对传染病的最新研究成果，并统一采用现代医学病名。对收载中草药的名称亦取通用的药材名（附植物拉丁学名），某些民间药采用地方名或原植物名。

本书文字部分系广西药科学学校黄元金先生编写，图片由广西药用植物园摄影师彭治章先生主持拍摄，并由该园信息资源室吕惠珍女士进行中草药植物分类鉴定。全书体例简明扼要，图文并茂，识药用药，一目了然，力求适合有关医患人员和广大群众参考使用。

限于水平、时间和条件，书中文字阐明及方剂筛选难免有不妥之处，有的图像从拍摄部位的构思剪裁到画面效果，亦不易尽善尽美，借此恳请读者批评指正。

编 者

目 录

● 一画

- 一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. (2)
一支箭 *Ophioglossum vulgatum* Linn. (4)

● 二画

- 丁葵草 *Zornia diphylla* (L.) Pers. (6)
七叶一枝花 *Paris polyphylla* Smith var. *chinensis*
(Franch.) Hara (8)
了刁竹 *Cynanchum Paniculatum* (Bunge.) Kitag. (10)
儿茶 *Acacia catechu* (L.) Willd. (12)
八角莲 *Dysosma versipellis* (Hance) M. Cheng (14)

● 三画

- 三叉苦 *Evodia lepta* (Spreng.) Merr. (16)
三白草 *Saururus chinensis* (Lour.) Baill. (18)
三筒管 *Aristolochia championii* (Champ.) Merr. et. Chun (20)
千里光 *Senecio scandens* Buch. - Ham. ex D. Don (22)
土甘草 *Fordia cauliflora* Hemsl. (24)
大田基黄 *Lysimachia fortunei* Maxim. (26)
大青叶 *Isatis indigotica* Fort. (28)
小叶水团花 *Adina rubella* Hance (30)
小蜡树 *Ligustrum sinense* Lour. (32)

山藿香 <i>Teucrium viscidum</i> Bl.	(34)
广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr.	(36)
马兰 <i>Kalimeris indica</i> (Linn.) Sch. - Bip.	(38)
马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> Linn.	(40)
马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.	(42)
马缨丹 <i>Lantana camara</i> Linn.	(44)
马蹄金 <i>Dichondra repens</i> Forst.	(46)
马蹄蕨 <i>Angiopteris fokiensis</i> Hieron.	(48)
马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> (Linn.) Vahl	(50)

● 四画

丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge	(52)
元宝草 <i>Hypericum sampsonii</i> Hance	(54)
天胡荽 <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	(56)
少花龙葵 <i>Solanum photeinocarpum</i> Nakamura et Odeshima ...	(58)
无根藤 <i>Cassytha filiformis</i> Linn.	(60)
月季花 <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	(62)
火炭母 <i>Polygonum chinensis</i> Linn.	(64)
牛筋草 <i>Eleusine indica</i> (Linn.) Geertn.	(66)
牛蒡 <i>Arctium lappa</i> Linn.	(68)

● 五画

冬叶 <i>Phrynium capitatum</i> Willd.	(70)
田基黄 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	(72)
白马骨 <i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce	(74)
白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	(76)
白背叶 <i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell. - Arg.	(78)
龙血树 <i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	(80)

龙俐叶 *Sauropus spatulifolius* Beille (82)

● 六画

决明子 *Cassia tora* Linn. (84)

江南星蕨 *Microsorium fortunei* (Moore) Ching (86)

红毛毡 *Ardisia mamillata* Hance (88)

红花酢浆草 *Oxalis corymbosa* DC. (90)

红豆蔻 *Alpinia galanga* (L.) Willd. (92)

纤弱木贼 *Equisetum debile* Roxb. (94)

闭鞘姜 *Costus speciosus* (Koenig) Smith (96)

● 七画

何首乌 *Polygonum multiflorum* Thunb. (98)

余甘子 *Phyllanthus emblica* Linn. (100)

忍冬藤 *Lonicera confusa* DC. (102)

旱莲草 *Eclipta prostrata* Linn. (104)

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook. (106)

苏铁 *Cycas revoluta* Thunb. (108)

赤苍藤 *Erythrolalum scandens* Bl. (110)

鸡血藤 *Spatholobus suberectus* Dunn (112)

鸡冠花 *Celosia cristata* Linn. (114)

鸡骨草 *Abrus cantoniensis* Hance (116)

● 八画

侧柏 *Platycladus orientalis* (Linn.) Franco (118)

刺苋 *Amaranthus spinosus* Linn. (120)

卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring. (122)

夜香牛 *Vernonia cinerea* (Linn.) Less. (124)

- 线纹香茶菜 *Rabdosia lophanthoides*(Buch. – Ham.
ex D. Don)Hara (126)
- 虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. (128)
- 败酱 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. ex Link (130)
- 金丝草 *Pogonatherum crinitum*(Thunb.)Kunth (132)
- 鱼腥草 *Houttuynia cordata* Thunb. (134)

● 九画

- 南柴胡 *Bupleurum marginatum* Wall. ex DC. (136)
- 姜黄 *Curcuma longa* Linn. (138)
- 美人蕉 *Canna indica* L. (140)
- 柳 *Salix babylonica* Linn. (142)
- 独脚疳 *Striga asiatica*(Linn.)O. Ktze. (144)
- 脉叶香茶菜 *Rabdosia nervosus*(Hemsl.)C. Y. Wu et
H. W. Li (146)
- 茵陈蒿 *Artemisia capillarios* Thunb. (148)
- 荠菜 *Capsella bursa – pastoris*(Linn.)Medic. (150)

● 十画

- 夏枯草 *Prunella vulgaris* Linn. (152)
- 射干 *Belamcanda chinensis*(Linn.)DC. (154)
- 桉树 *Eucalyptus robusta* Sm. (156)
- 海南大风子 *Hydnocarpus hainanensis*(Merr.)Sleum. (158)
- 海南蒲桃 *Syzygium cumini*(Linn.)Skeel (160)
- 破布叶 *Microcos panicuiata* Linn. (162)

● 十一画

- 假菠菜 *Rumex maritimus* Linn. (164)

杪椴 <i>Alseophilola spinulosa</i> (Wall. ex Hook)Tryon	(166)
犁头尖 <i>Typhonium divaricatum</i> (Linn.)Decne.	(168)
银杏 <i>Ginkgo biloba</i> Linn.	(170)
黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> Linn.	(172)

● 十二画

紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.)Bl.	(174)
扁蓄 <i>Polygonum aviculare</i> Linn.	(176)
葫芦茶 <i>Desmodium triquetrum</i> (Linn.)DC.	(178)
酢浆草 <i>Oxalis corniculata</i> Linn.	(180)
阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.)Carr.	(182)
鹅不食草 <i>Centipeda minima</i> (Linn.)A. Br. et Aschers.	(184)

● 十三画

蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand. - Mzt.	(186)
蒴藋 <i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	(188)
雷公根 <i>Centella asiatica</i> (Linn.)Urb.	(190)

● 十四画

翠云草 <i>Selaginella uncinata</i> (Desv.)Spring.	(192)
豨薟草 <i>Siegesbeckia orientalis</i> Linn.	(194)

● 十五画

潺槁木姜 <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.)C. B. Rob.	(196)
---	-------

● 十八画

藤黄连 <i>Fibraurea recisa</i> Pierre	(198)
鹰不扑 <i>Aralia armata</i> (Wall.)Seem.	(200)



一枝黄花

别名 蛇头王。

来源 用菊科一枝黄花属植物一枝黄花 (*Solidago decurrens* Lour.) 的根做药。

形态 为多年生草本(图1), 高20~70厘米, 根须状, 丛生。茎直立, 少分枝, 基部略带棕红色。叶互生, 下部为卵状披针形, 有柄, 长4~7厘米, 宽1~2厘米, 先端尖, 基部狭, 下延成柄, 边缘有小锯齿, 上部的叶较小, 披针形, 近全缘。开黄色花朵, 头状花序复组成顶生圆锥花序, 舌状花雌性, 管状花两性。花期于冬春季间。瘦果有白色冠毛。

分布 生于山野路旁草丛中。多分布于长江以南地带。

采集 全草, 夏秋采, 洗净切段晒干备用。

成分 含酚类、鞣质、皂碱配醣体。

性味 微苦, 甘辛, 平。有小毒。

用法用量 本书对本味药用无内服。

验方

1. 疱疹性咽炎(病毒感染): 一枝黄花鲜根皮60克, 水煎浓缩含漱, 每日含5~6次。每次含约5分钟。

2. 丹毒: 一枝黄花根150克(鲜品400克), 水煎浓缩, 调青黛粉适量, 涂患处。



图 1 一枝黄花

一支箭

别名 瓶尔小草、一枝枪、矛盾草。

来源 用瓶尔小草科一支箭属植物一支箭 (*Ophioglossum vulgatum* Linn.) 的全草做药。

形态 为多年生直立草本(图2), 高达20厘米。地下根状茎短, 圆柱形, 有一簇黄色肉质粗根。营养叶一枚, 稍呈肉质, 着生于总柄上, 狭卵形或椭圆形, 先端圆钝或锐尖, 基部狭楔形而下延, 全缘, 叶脉网状。孢子囊群穗状, 由营养叶基部抽出, 有长柄, 远高出于营养叶, 穗长2.5~3.5厘米, 狭条形, 顶部有小突尖; 孢子囊圆球形, 对生, 排列成2行。

分布 生于阴湿的山地, 河岸及沟边。产于长江流域各省区。

采集 夏、秋季采收, 洗净晒干备用。

成分 含3-0-甲基槲皮素-7-0-双葡萄糖甙-4-0-葡萄糖甙。

性味 甘, 平。

功效 清热解毒、止痛。

用法用量 内服, 水煎, 15~30克。

验方

1. 肺结核潮热: 一支箭30克、不出林12克、银柴胡12克、麦冬15克, 水煎服, 每日1剂。

2. 传染性口角炎: 一支箭鲜全草60克、知母15克, 水煎服, 每日1剂。

3. 结核性喉炎: 一支箭鲜全草60克(用量一般不限)、鱼腥草20克, 水煎服, 每日1剂。



图2 一支箭

丁 葵 草

别名 人字草。

来源 用蝶形花科丁葵草属植物丁葵草 [*Zornia diphylla*(L.) Pers.] 的全草做药。

形态 为多年生草本(图3)。从根部发出多数纤细而坚韧的小枝，直立或倾斜，高15~40厘米。根常不分枝，较粗壮，外皮灰褐色。叶细小，2片着生于叶柄的顶端，呈倒“人”字形张开。穗状花序，腋生，长2~6厘米；花开有2~6朵，多可达10朵，呈黄色。花期于夏秋季间。荚果小，2~6节，有小针刺。

分布 常生于较干旱的山坡上。

采集 全草，夏秋季采，洗净鲜用或晒干备用。

成分 全草含黄酮甙、氨基酸等。

性味 甘、凉。

功效 清热解毒、散瘀消积。

用法用量 内服，水煎，10~60克。

验方

1. 流行性结膜炎：丁葵草鲜全草90克、草决明子15克，水煎服，每日1剂。
2. 菌痢：丁葵草30克、白头翁30克，腹痛明显加薄荷6克后下，水煎服，每日1剂。



图3 丁癸草

七叶一枝花

别名 蚤休、重楼。

来源 用七叶一枝花科七叶一枝花属植物七叶一枝花 [*Paris polyphylla* Smith var. *chinensis* (Franch.) Hara] 的根茎做药。

形态 为多年生草本 (图4)，光滑无毛，高90厘米上下。根茎横卧，圆柱形，稍压扁，黑褐色，结节明显，节上生须根。叶6~8片，通常7片，轮生于茎顶，长圆形、长卵形或长椭圆形，长8~18厘米，宽2.5~5.5厘米，先端急尖或渐尖，基部楔形，基出脉3条，全缘或作波状；叶柄短。花开从茎顶抽出花茎，顶端着花一朵；花被两轮，外轮花被叶状，3~6片，卵状披针形，内轮花被片线形，呈黄绿色，略下垂；花期于3~5月间。浆果球形，成熟时绿色带紫色；种子多数，鲜红色。

分布 生于高山密林下沟旁阴湿处。分布于江西、广东、四川、贵州、云南、西藏等省区。

采集 野生品夏、秋季采挖；栽培品栽后3~5年秋末采挖。切片、晒干备用。

成分 含生物碱和氨基酸。

药理 有镇静作用。对痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、脑膜炎双球菌均有抗菌作用。

性味 苦、寒。有小毒。

功效 清热解毒、散瘀消肿。

用法用量 内服，水煎，6~9克。外用根茎适量，研粉，同醋调外敷或外涂。

验方

1. 结核性中耳炎：七叶一枝花根茎干品6克、研粉，用姜水（解毒作用。生姜3片，水煎）送服。每日1剂。另取七叶一枝花适量、水煎，滤渣，滴入耳内1~2滴，每日4~5次。

2. 流行性腮腺炎、淋巴结核：七叶一枝花根茎适量研粉，同醋调外敷、或外涂。

禁忌 本品有毒，内服须慎。如内服引起中毒，可用甘草60克水煎取药液与白米醋、生姜汁各60克混合，一半含漱，一半内服可解毒。