

飲片新叅

張通謨題



南京中醫藥大學圖書館藏

分類飲片新參 下編

新安王一仁主撰

從學婺源江紹芬同訂
聲遠

去瘀之品



蟬蟲

形色 身黃頭黑。體小。狀如蟬。

性味 苦寒。

功能 逐瘀破結。消堅痞癥瘕。通經閉。

分量 三分至六分。

用法 炙用包煎。多入丸劑。

禁忌 體虛無瘀者忌用。

●水蛭

形色 色黑。如條蟲。

性味 苦鹹腥。

功能 破瘀通經絡。治血蟲。

分量 一錢至三錢。

用法 炙用。

禁忌 血虛者忌用。

●地鱉蟲（即蟻蟲）

形色 色不黑。形小如鱉。無翅有足。

性味 鹹腥苦。

功能 破癰瘕血瘕。通乳脈。利經絡。

分量 八分至一錢半。

用法 風乾用。

禁忌 氣血虛者忌用。

●斑蝥

形色 頭身黑色。大如小指。翅有黃黑斑紋。

性味 辛苦熱。

功能 破癰積石淋。下獐犬毒。外用蝕死肌。拔瘰癧疔腫。

分量 三分至五分。

用法 內服。宜用糯米炒黃研服。或取米研用。

禁忌 有毒慎用。

●蜣螂蟲

形色 外殼色黑光潔。頭有角。內藏乾翅。

性味 鹹寒。

功能 去瘀熱。消痞塊。治多骨。

分量 酌用。

用法 合丸劑。及研末外用。

禁忌 虛者忌用。

●蟬蟪（卽地蠶）

形色 色灰黃。粗大於蠶。

性味 鹹微溫。

功能 破血結。治瘀傷疼痛。通乳汁。

分量 一個至三個。

用法 酒洗淨。炙研末冲服。罕入湯劑。

禁忌 體虛血弱者忌用。

●青娘子（即芫青）

形色 色青藍。身細翅長。

性味 微辛溫。

功能 消癰癰。下痰積。去瘀墮胎。塞耳開聾。

分量 一個至三個。

用法 去翅足研末。外用。罕入湯劑。

禁忌 體虛者慎用。

●紅娘子（即樗雞）

形色 身色紅。頭翅黑。

性味 苦平微溫。

功能 去瘀。通經閉。消痰癰。強陰。益精氣。可作溫中坐藥。

分量 三個至五個。

用法 去翅足糯米炒。罕入湯劑。

禁忌 體虛血衰者忌用。

●五靈脂

形色 色灰褐。形如鼠屎。

性味 鹹溫腥。

功能 散瘀通經。治心腹血滯疼痛。

分量 一錢至三錢。

用法 生用去瘀。炒炭止崩血。

禁忌 血虛無瘀者忌用。

● 驚甲

形色 色黃。甲有駁紋。

性味 鹹平。

功能 養陰平肝。去瘀退熱。主治勞瘵癰疽。

分量 三錢至一兩。

用法 炙用。或醋炒。

禁忌 外感寒熱者忌用。

●牛角腮

形色 色灰黑兼黃。爲角尖中之堅骨。

性味 苦辛溫腥。

功能 破寒瘀。通經絡。治療血疼痛。止血崩赤白帶。冷痢。

分量 一錢半至三錢。

用法 炙研末。酒沖服。

禁忌 溼熱瘀結者忌用。

●白丁香（即雀糞）

形色 色灰白。細條。

性味 苦溫。

功能 治癰疽久痢。塗癰疽即潰。和乳消翳。外塗瘡癰。平胬肉。

分量 酌用。

用法 研末製丸。或外用。

●花蕊石

形色 色白結晶。

性味 淡平香辛。

功能 治金瘡出血。能化瘀爲水。下死胎。平血暈。

分量 二錢至四錢。

用法 煨煉水飛用。

禁忌 血虛者忌用。

●硃砂

形色 色紅光潔悅目。如瑪瑙。

性味 鹹苦辛熱。

功能 消惡肉。除疣贅。化痰積。治噎膈。去鼻中癰痔。

分量 五厘至一分半。外用酌配。

用法 煎膏藥。及製末外用。罕有內服。

禁忌 及內熱虛體忌用。

●無名異

形色 色紫褐。石粒小如花子。

性味 香涼平。

功能 活血涼血。治跌仆損傷。消腫止痛。

分量 一錢半至三錢。

用法 研碎包煎。或酒沖服。或醋調外塗腫毒。

禁忌 寒瘀者忌用。

● 黑丑

形色 色黑。作三角形。

性味 苦辛潤。

功能 去瘀消痞。導水通腸。

分量 八分至一錢半。

用法 生用。或炒用。

禁忌 血虛無瘀。大便溏泄者忌用。

● 白丑

形色 色淡黃。形如山查核。

性味 苦腥微甘。

功能 去瘀結。消核塊。通水利腸。

分量 五分至一錢半。

用法 生研用。

禁忌 血虛便溏者忌用。

● 乾漆

形色 色黑。如泥塊。

性味 腥溫。

功能 去瘀。續筋骨。消痞結。

分量 八分至一錢半。

用法 炒漆令烟盡，研末冲服。

禁忌 胃弱血虛。及內熱者忌用。

● 血竭

形色 色紫紅。結晶。

性味 香淡溫。

功能 散瘀止痛。消癥瘕。療傷。

分量 三分至六分。

用法 研末酒冲。入丸散爲多。

禁忌 血少陰虛者忌用。

● 自然銅

形色 色金紫相雜。

性味 辛平。

功能 主治折傷。續筋骨。消瘀止痛。

分量 三錢至五錢。

用法 生研包煎。

禁忌 非筋骨折傷者勿用。

● 荆三稜

形色 色黃白。映之有小紅點。

性味 苦辛平。

功能 入肝肺。散血瘀氣結。消堅痞止痛。

分量 八分至三錢。

用法 醋炒用。

禁忌 氣血虛者忌用。

●蓬莪朮

形色 色淡紫。中有白點。形似川鬱金。稍枯晦。

性味 香宣苦溫。

功能 去瘀。通經止痛。消癥癖。

分量 一錢至三錢。

用法 生用。或醋炒。

禁忌 熱瘀。及氣血虛者忌用。

●延胡索

形色 質堅色黃。

性味 香苦溫。

功能 入肝理氣。去瘀止痛。

分量 一錢半至三錢。

用法 炒用。

禁忌 氣滯內熱血瘀者慎用。

●乳香

形色 色灰黃。結晶。

性味 香溫微苦。