

浙江省温州专区(浙江南部)
有用野生植物参考資料

浙江省野生植物普查队

一九五八年十二月

前 言

这本小册子原系浙江省温州专区野生资源植物普查总结报告的一部分，由于篇幅较长，而且大部分材料是通过向有经验的老农、土医师访问所得，并经过整理写成，内容较为实际，有一定的参考价值，因此单独刊印，题为“浙江省温州专区（浙江南部）有用野生植物参考资料”。

文内共记载浙江南部有用野生植物626种；分属于150科，384属，其中包括裸子植物13属，被子植物339属，蕨类植物32属，并分别描述每种植物的各地土名、生态分布，特别着重于经济用途的记述，可供各地人民公社干部、商业部门、农林、医药卫生业务干部的参考，也可供给师范学院生物系以及农林院校编写资源植物教材时的参考。

由于编写时间仓促，尤其是负责整理的同志业务水平不高，错误之处一定很多，敬希各方不吝批评和指正。

浙江省野生植物普查队

目次

銀杏科	Ginkgoaceae	(1)
紫杉科	Taxaceae	(1)
粗榧科	Cephalotaxaceae	(2)
竹柏科	Podocarpaceae	(2)
松科	Pinaceae	(2)
杉科	Taxodiaceae	(3)
柏科	Cupressaceae	(3)
木蘭科	Magnoliaceae	(5)
八角茴香科	Illiciaceae	(6)
五味子科	Schisandraceae	(6)
番荔枝科	Annonaceae	(6)
蜡梅科	Calycanthaceae	(7)
樟科	Lauraceae	(7)
毛茛科	Ranunculaceae	(11)
小蘗科	Berberidaceae	(12)
木通科	Lardizabalaceae	(13)
大血藤科	Sargentodoxaceae	(13)
防己科	Menispermaceae	(13)
胡椒科	Piperaceae	(14)
金粟蘭科	Chloranthaceae	(14)
杜衡科	Asaraceae	(15)
獼猴桃科	Actinidiaceae	(15)
山茶科	Theaceae	(16)
金絲桃科	Hypericaceae	(19)
杜英科	Elaeocarpaceae	(19)
椴樹科	Tiliaceae	(20)
梧桐科	Sterculiaceae	(21)
錦葵科	Malvaceae	(21)
大风子科	Flacourtiaceae	(22)
旌節花科	Stachyuraceae	(23)
堇菜科	Violaceae	(23)
楊柳科	Salicaceae	(25)
葫蘆科	Cucurbitaceae	(24)
罌粟科	Papaveridaceae	(24)

馬齒莧科	Portulacaceae	(24)
藜科	Chenopodiaceae	(24)
莧科	Amaranthaceae	(25)
石竹科	Caryophyllaceae	(25)
蓼科	Polygonaceae	(25)
虎耳草科	Saxifragaceae	(27)
鼠刺科	Escalloniaceae	(27)
綉球花科	Hydrangeaceae	(27)
海桐科	Pittosporaceae	(28)
綉綫菊科	Spiraeaceae	(28)
薔薇科	Rosaceae	(28)
梨科	Pomaceae	(32)
桃科	Amygdalaceae	(32)
含羞草科	Mimosaceae	(33)
云實科	Caesalpiniaceae	(33)
豆科	Papilionaceae	(34)
桃金娘科	Myrtaceae	(37)
野牡丹科	Melastomataceae	(38)
紅樹科	Rhizophoraceae	(38)
瑞香科	Thymelaeaceae	(39)
胡頹子科	Elaeagnaceae	(40)
山龍眼科	Proteaceae	(40)
金縷梅科	Hamamelidaceae	(41)
榆科	Ulmaceae	(42)
桑科	Moraceae	(42)
蕁麻科	Urticaceae	(45)
楊梅科	Myricaceae	(45)
胡桃科	Juglanaceae	(46)
壳斗科	Fagaceae	(46)
酢醬草科	Oxalidaceae	(50)
風仙花科	Balsaminaceae	(50)
芸香科	Rutaceae	(51)
楝科	Meliaceae	(52)
伯樂樹科	Bretschneideraceae	(52)
槭樹科	Aceraceae	(52)
省沽油科	Staphyleaceae	(53)
漆樹科	Anacardiaceae	(53)
清風藤科	Sabiaceae	(54)
大戟科	Euphorbiaceae	(54)
交讓木科	Daphniphyllaceae	(57)

黃楊科	Buxaceae	(57)
冬青科	Aquifoliaceae	(58)
卫矛科	Celastraceae	(60)
桑寄生科	Loranthaceae	(62)
鼠李科	Rhamnaceae	(62)
葡萄科	Vitaceae	(63)
四照花科	Cornaceae	(64)
五加科	Araliaceae	(64)
八角楓科	Alangiaceae	(66)
繖形科	Umbelliferae	(66)
杜鵑科	Ericaceae	(67)
越橘科	Vacciniaceae	(68)
鹿蹄草科	Pyrolaceae	(68)
柿樹科	Ebenaceae	(68)
野茉莉科	Styracaceae	(69)
灰木科	Symplocaceae	(69)
紫金牛科	Myrsinaceae	(70)
報春花科	Primulaceae	(72)
木犀科	Oleaceae	(72)
馬錢科	Loganiaceae	(74)
夾竹桃科	Apocynaceae	(74)
龍胆科	Gentianaceae	(75)
旋花科	Convolvulaceae	(75)
茄科	Solanaceae	(76)
玄參科	Scrophulariaceae	(77)
苦苣苔科	Gesneriaceae	(78)
爵床科	Acanthaceae	(78)
馬鞭草科	Verbenaceae	(79)
唇形科	Labiatae	(81)
車前草科	Plantaginaceae	(82)
茜草科	Rubiaceae	(83)
忍冬科	Caprifoliaceae	(86)
敗醬科	Valeriaceae	(88)
桔梗科	Campanulaceae	(89)
山梗菜科	Lobeliaceae	(89)
菊科	Compositae	(90)
澤瀉科	Alismataceae	(95)
谷精草科	Eriocaulaceae	(95)
薑荷科	Zingiberaceae	(95)
雨久花科	Pontederiaceae	(95)

百合科	Liliaceae	(96)
葱 科	Alliaceae	(96)
日光蘭科	Asphodelaceae	(96)
天冬科	Asparagaceae	(97)
草玉鈴科	Convallariaceae	(97)
延齡草科	Trilliaceae	(97)
菝葜科	Smilacaceae	(97)
沿階草科	Ophiopogonaceae	(98)
石 蒜 科	Amaryllidaceae	(99)
薯 蕷 科	Dioscoreaceae	(99)
灯心草科	Juncaceae	(99)
鳶 尾 科	Iridaceae	(99)
蘭 科	Orchidaceae	(100)
棕 櫚 科	Palmae	(101)
天南星科	Araceae	(101)
莎 草 科	Cyperaceae	(102)
禾 本 科	Gramineae	(103)
石 松 科	Lycopodiaceae	(107)
卷 柏 科	Selaginellaceae	(108)
木 賊 科	Equisetaceae	(108)
瓶尔小草科	Ophioglossaceae	(108)
紫 箕 科	Osmundaceae	(109)
海金砂科	Schizaeaceae	(109)
里 白 科	Dicranopteridaceae	(109)
林 蕨 科	Lindsacaceae	(109)
鳳尾蕨科	Pteridaceae	(110)
裸子蕨科	Gymnogrammaceae	(110)
鉄角蕨科	Asplenaceae	(111)
蹄蓋蕨科	Athyriaceae	(111)
金星蕨科	Thelypteridaceae	(111)
烏毛蕨科	Blechnaceae	(112)
叉 蕨 科	Aspidiaceae	(112)
燕尾蕨科	Cheiropleuriaceae	(112)
水龙骨科	Polypodiaceae	(113)
槐叶萍科	Salvinaceae	(115)
滿江紅科	Azollaceae	(115)
附：藻類植物一種——馬尾藻		(115)

1. 銀杏科 Ginkgoaceae

植物名称 銀杏 *Ginkgo biloba* Linn.

土 名 白果(各地)。

生态分布 本种均系栽培，生長于房前屋后。

經濟用途 本种为現存裸子植物中最古老的植物。材質柔軟，紋理通直，不开裂，不反桥，色淡褐而有光澤，为大建筑和精美制作之良材，制測量图板尤为适宜；其碎材亦可作算盤珠、图章及其他小玩具。叶可为水田肥料和杀虫剂。种子即白果，除食用外，亦供藥用，有溫肺、益氣、定喘嗽、利小便等效。又菜油浸白果，对結核菌有抑制作用。

采集号碼 22833.

2. 紫杉科 Taxaceae

植物名称 美丽紅豆杉 *Taxus speciosa* Florin.

土 名 山赤榧(龙泉)；赤榧(景宁)。

生态分布 生長于溪谷及向阴山坡树叢內，呈零星散生。

經濟用途 果可生食，心材紅赤色，材質优良能耐水湿，可为水底工程用材。又树姿端正，枝叶濃綠，可作觀賞树种，入秋假种皮呈鮮紅色，頗为美丽。

采集号碼 22639

植物名称 白豆杉 *Pseudotaxus chienii* (Cheng) Cheng

土 名

生态分布 龙泉昂山和鳳阳山海拔1000公尺的阴湿山谷林下。

經濟用途 本种为我国特产，仅見于本省龙泉县，在分类研究上极有价值。

采集号碼 23117

植物名称 香榧 *Torreya grandis* Fort.

土 名 榧子、山赤榧(景宁)。

生态分布 分布于村舍附近，本区栽培不多，形成半野生状态。

經濟用途 果实可食又可榨油，树形优美，为良好的园林觀賞及工业用材树种。

采集号碼 24599

植物名称 長叶榧树 *Torreya jackii* Chun.

土 名 水竹(景宁)。

生态分布 生長在景宁县渤海区新泗乡山坡林中。

經濟用途 本种于1924年由秦仁昌氏首先在仙居发现，1939年章紹堯氏在縉云南溪繼續发现，1958年11月本省資源植物普查队又在景宁采得，为本省特有树种，分

布不普遍，对科学研究有一定的意义，希望加以保护。

采集号码 25127

3. 粗榧科 Cephalotaxaceae

植物名称 三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook.

土 名 水竹（景宁）；山榧（龙泉）；烏仔（泰順）。

生态分布 生長于各县山坡、淺谷阴湿处或什木林中，有时呈單生状态。

經濟用途 叶有香气，可試制芳香油。种子含丰富的脂肪，可榨油。木材坚韧，富于彈性，可做挑杠及农具柄等。

采集号码 22948

4. 罗汉松科 Podocarpaceae

植物名称 罗汉松 *Podocarpus macrophylla* D. Don

土 名 罗汉松（各地）；罗松（景宁）。

生态分布 本区房舍前后多零星生長。

經濟用途 为一庭园觀賞植物。木材白色，紋理通直，耐朽力强，質稍坚硬，可为建筑之用。

采集号码 24418

植物名称 竹柏 *Podocarpus nagi* Zoll. et Moriet.

土 名 挪树（平阳）。

生态分布 本区乐清、平阳、温州等地栽培。雁荡山有野生片林。

經濟用途 树形美丽，是一很好庭园觀賞树种。

采集号码 24947

5. 松 科 Pinaceae

植物名称 馬尾松 *Pinus massoniana* Lamb.

土 名 松树（各地）。

生态分布 普遍分布于本区各县700公尺以下的山地。

經濟用途 松針可提芳香油，出油率0.2—0.5%，并可制酒精和人造絲，还含有單宁，可提烤膠；嫩松果亦可提芳香油，出油率0.2—0.4%；树皮可提烤膠，含量8—14%。松脂是工业、藥用原料，松根也可提芳香油。松花粉可作藥用和食品工业原料。木材除供建筑、枕木外，因其耐水湿，可为堤岸等地打樁用。

采集号码 23336

植物名称 黃山松 *Pinus taiwanensis* var. *hwangshansis* cheng et Law

土 名 短叶松(各地)。

生态分布 本区800公尺以上的高山，生長較普遍。

經濟用途 用途与馬尾松同，惟本种适于高山造林。

采集号碼 23921

植物名称 油杉 *Keteleeria fortunei* Carr.

土 名 罗松(泰順)。

生态分布 本区仅見于龙泉、泰順，以泰順較多。

經濟用途 为一稀有經濟树种，需要加以保护。目前群众多挖取根皮出售用作造紙膠料，如此利用方式，损伤母树很重。

采集号碼 25410

植物名称 ~~鐵堅杉~~ ^{油杉} *Keteleeria chekiangensis* Cheng

土 名 罗松(本区各县)。

生态分布 生長于阳向山坡林中，龙泉、泰順、景宁等县均有零星分布。

經濟用途 树根及木材含有树脂，可作造紙膠料。木材坚硬中庸，树杆端直，能耐久，充建筑及桥梁用。

采集号碼 24476

6. 杉 科 Taxodiaceae

植物名称 杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.

土 名 杉树(各地)。

生态分布 为我国南方最重要之林木，又为本省的乡土树种，适潤之山谷山窪广泛分布和栽培。

經濟用途 树形端正，易于繁殖。木材紋理通直，易于加工，具抗病虫害和耐腐特性；木材供建筑用。树皮可提烤膠及人造纖維、盖房頂等，树叶可提芳香油。

采集号碼 24507

植物名称 柳杉 *Cryptomeria Fortunei* Hooibrenk

土 名 榧树(各地)；大杉(平阳)；榧杉(景宁)。

生态分布 本区各县普遍生長，尤以阴湿山窪較多。

經濟用途 为一阴性的速生树种，木理通直坚軟得宜，易以施工，宜作建筑器具、机械、桥梁、造船等用材。树皮可提烤膠，出膠率6%左右，且可提纖維，亦可作屋頂的遮盖物。

采集号碼 22845

7. 柏 科 Cupressaceae

植物名称 福建柏 *Fokienia hodginsii* Henry et Thomas.

土 名 扁柏(泰順)。

生态分布 生長于湿润山坡及溪谷边什木林內，本区龙泉、泰順部分山地均有分布，但不普遍。

经济用途 本种为本区的稀見树种，姿态优美，可为观赏树种；在科学研究上很有价值，宜予保护和栽培。

采集号碼 23984

植物名称 側柏 *Biota roientalis* Endl.

土 名 扁柏(景宁)。

生态分布 本区各地房舍前后，零星栽培。

经济用途 木材可提油，出油率4—7%，油为医藥仪器清淨剂。叶出油率0.2—0.3%，可作香料，除提油外，种子、叶、根、枝和皮均可入藥，叶为苦味健胃剂及清凉收斂藥，适用于各种出血，如咳血、吐血、鼻血及腸出血、尿血、子宫出血和赤痢等症，又为淋病利尿藥；子仁有滋养作用。木材坚重細緻，不桥不裂，耐朽力强，可为裝飾雕刻及土木工程用材。

采集号碼 24198

植物名称 园柏 *Juniperus chinensis* Linn.

土 名 山杉(平阳)。

生态分布 本区多系栽培，生長于屋舍前后。

经济用途 木材可提芳香油，出油率2—3%。植株为一美丽的庭园观赏树种。木材桃紅色，坚硬細緻，光澤美丽，耐朽力强，气味芳香，紋理通直，可为雕刻裝飾，器具用材。叶性凉，可止血，用叶与童便煎服。

采集号碼 22876

植物名称 垂条园柏 *Juniperus chinensis* var. *pendula* Franch.

土 名 山杉(平阳)。

生态分布 平阳莒溪房舍边栽培。

经济用途 平阳民間取叶用童便煎服，云可止血。木材坚重耐久，有香气，可作器具等用。植株可为观赏树种。叶可提芳香油。

采集号碼 24663

植物名称 刺柏 *Juniperus formosana* Hayata

土 名 柏香(龙泉)；柏树(景宁)；柏木(泰順)。

生态分布 本区高山地区生長較多，能耐瘠薄土壤，惟生長緩慢。

经济用途 木材、种子、叶均可提芳香油，木材出油率2—3%；叶出油率0.2—0.3%；子出油率0.1—0.3%；油可作香料。木材极耐水湿，可为樁柱船底等用材；植株可为庭园观赏树种。

采集号碼 23056

8. 木蘭科 Magnoliaceae

- 植物名称 廬山厚朴 *Magnolia biloba* Cheng
土 名 厚朴 (各地)。
生态分布 本区各县均有, 常和毛竹、杉木混生, 以西北坡向較多。
經濟用途 皮可提芳香油, 亦可入藥名厚朴, 其性質苦溫無毒, 有散氣、燥濕、化良積、消脹滿之效, 又可用作霍亂、中暑藥, 主治傷寒、中風、寒熱等症, 其花及果亦可入藥, 芽亦可为婦科藥。種子可榨脂肪油, 出油率25%。
采集號碼 22676
- 植物名称 木蓮 *Manglietia fordiana* Oliv.
土 名 白葉光 (泰順)。
生态分布 生長于山野溪谷叢邊什木內或分布600m以上的向陰山坡闊葉林中。
經濟用途 葉可試提芳香油, 種子可試榨脂肪油。本種樹姿端正枝葉濃密, 花色美麗, 为優良的觀賞植物。
采集號碼 22991
- 植物名称 含笑花, *Michelia figo* (Lour.) Spreng
土 名
生态分布 生長于溪谷兩傍什木間, 本區分布不多, 仅于龍泉、太順見之。
經濟用途 葉子及果皮有香氣, 可試提芳香油, 又樹姿端正, 可为觀賞樹木。
采集號碼 22938
- 植物名称 莫夫人含笑花 *Michelia maudiae* Dunn
土 名 判官筆, 泡花樹 (龍泉); 白臘柴 (平陽); 大號黃杆 (景寧)。
生态分布 龍泉、平陽、泰順、景寧等縣山谷地區均有分布, 与常綠闊葉樹混生。
經濟用途 植株可作名貴的庭園中心樹。果皮及葉可提芳香油, 根据初步試驗, 葉出油率0.4%, 油極芳香, 可作高級化粧品原料。花及根煎水服可治肺癰。龍泉城北群众用作染料, 据云不易退色。
采集號碼 22721
- 植物名称 白蘭 *Michelia champaca* Linn.
土 名 白蘭花 (平陽)。
生态分布 本種为平陽南雁栽培之種, 其他各地均未見到。
經濟用途 开花時濃香扑鼻, 多为茶葉熏香劑。葉色鮮綠, 終年蒼翠, 可为行道樹及庭園觀賞樹。
采集號碼 24938
- 植物名称 台灣含笑花 *Michelia formosana* Masanun.

土 名

生态分布 分布于海拔較高的山地，常和壳斗科、樟科、山茶科等植物混生，本种仅見于泰順。

經濟用途 为一优良的庭园觀賞树叶可試提芳香油。

采集号碼 23986

9. 八角茴香科 Illiciaceae

植物名称 莽草 *Illicium lanceolatum* A. C. Smith.

土 名 山木蟹（各县）。

生态分布 分布于本区 600 公尺以上阴湿山谷的什木林中，尤以泰順、龙泉、景宁一带較多。

經濟用途 为一价值較高的芳香油料植物，叶、果均可提油，油可作化粧品原料。果实有毒，不可誤食。植株可作庭园觀賞树种。

采集号碼 23380

10. 五味子科 Schizandraceae

植物名称 盤柱南五味子 *Kadsura peltigena* Rehd. et Wils.

土 名 南蒲（龙泉）；猴兒拳（景宁）；白山环藤（平阳）；冷飯团（泰順）。

生态分布 普遍分布于各县山坡山麓及山谷溪边、路傍什木叢內，纏繞于树木之上。

經濟用途 果实可提芳香油，出油率在 0.8—1%。莖皮可提纖維，并含粘液，可为制紙的糊料。种子供藥用，为滋养强壮藥和鎮咳藥。根也可做藥，名“紫荆皮”（龙泉）。平阳民間用根煎水服之可治心胃气痛；泰順民間用根治經痛及妇女产后各症；龙泉民間用根泡茶飲之有发散之效。

采集号碼 22602

植物名称 华中五味子 *Schizandra cf. spenanthera* Rehd. et Wils.

土 名

生态分布 本区800公尺以上高山什木林中。

經濟用途 莖皮可提纖維。果实可食，并可酿酒；子实可入藥，有斂肺、澀腎、固精、发汗之效。

采集号碼 22065

11. 番荔枝科 Annonaceae

植物名称 毛叶瓜馥木 *Fissistigma oldhami* (Hemsl.) Merr.

土 名 假魚骨（泰順）；鷄蛋子、烏柿子（平阳）。

生态分布 本区平阳、泰順、乐清等县山坡树林下有零星分布。

經濟用途 果实可以生食，群众多采而食之，可試酿酒。

采集号碼 24827

12. 蜡梅科 Calycanthaceae

植物名称 亮叶腊梅 *Chimononthus nitens*, Oliv.

土 名 食良餐（景宁、龙泉）。

生态分布 分布于山麓、山坡的岩石附近及溪边的灌木丛中，但不广泛，有则成片生长，本区以龙泉、景宁较多。

经济用途 叶可提芳香油，群众用叶泡茶，据云有消食作用。

采集号碼 22689

13. 樟 科 Lauraceae

植物名称 樟 *Cinnamomum camphora* Sieb.

土 名 樟树（各县通称）。

生态分布 生长在村落附近、山坡溪边和平原低地，各县均有分布。

经济用途 为制樟脑和樟油的原料，经济价值极高。枝、叶、木材、根部均含樟脑，尤以根部为多，樟叶、木材还可提芳香油，出油率自1%至3—4%，供香料、制胶片及医杀虫等原料；并可供药用，可治中风和霍乱等症。樟木又是极有经济价值的木材，木纹精致美丽，施工容易，有芳香能驱虫，供雕刻、造船、箱柜、乐器和美术品之用。

采集号碼 23082

植物名称 秦氏樟 *Cinnamomum chingii* Metacalf.

土 名 细叶月桂（龙泉）；香树皮（景宁）。

生态分布 生长于山坡、山谷什木林内，本区龙泉、景宁、泰顺部分山区分布颇为普遍。

经济用途 叶与树皮可提芳香油，叶出油率3—4%，皮2—4%，皮提出之油为出口物资。叶可供罐头食品工业的香料，代替月桂叶，使罐头经久不败，为本区重要的资源植物之一。

采集号碼 23440

植物名称 捷氏樟（新拟） *Cinnamomum jensenianum* Hand-Mzt.

土 名 土肉桂（各县）。

生态分布 本区阴湿的山谷林中。

经济用途 树形端正，木材可作建筑，植株可作庭园观赏。

采集号碼 22075

植物名称 天竺桂（土肉桂） *Cinnamomum japonicum* Sieb.

土 名 大叶香桂（景宁、龙泉）；柱香（泰顺）。

生态分布 分布于本区阴湿的山谷地带什木林中。

經濟用途 叶子可提芳香油；种子亦可榨油；并可供藥用。

采集号碼 24310

植物名称 黄樟 *Cinnamomum parthenoxylum* Meisn.

土 名

生态分布 本种仅在泰順見到，生長极少。

經濟用途 叶具濃香，可提芳香油。

采集号碼 23875

植物名称 紅楠 *Machilus thunbergii* S. et Z.

土 名 楠柴（平陽）；沙槳樟（景寧）；表樟（龍泉）。

生态分布 本区各县阴湿的山坡溝谷地带什木林內极普遍，尤以龍泉、景寧、泰順、平陽等县較多。

經濟用途 树干通直，可作栋梁及各种傢俱。叶可提芳香油，出油率0.21%，并可浸汁作膠料。树皮可提烤膠，含量6.6%。种子可榨脂肪油。植株可作行道树及庭园中心树。

采集号碼 22732

植物名称 絨楠 *Machilus velutina* Champ.

土 名 掠头柴（龍泉）。

生态分布 本种多見于山谷或西北坡的什木林內，平陽景寧等地多有分布。

經濟用途 为一优良的綠化觀賞树种，木材坚硬耐水湿，可作家具用材。

采集号碼 24015, 22722

植物名称 大叶楠 *Machilus leptophylla* H. — M.

土 名 大叶楠（平陽）。

生态分布 本种仅見于平陽莒溪石竹岙，他处尚未发見。

經濟用途 叶具芳香，可提取芳香油，树姿幽雅，可为珍貴的綠化觀賞用。

采集号碼 24869

植物名称 紫楠 *Phoebe sheareri* Gamble

土 名 山枇杷（龍泉、景寧等）。

生态分布 生長于山坡山麓及溪谷兩旁什木林內，有时散生于路边。

經濟用途 叶及木材可提芳香油，出油率0.6—0.7%。木材优良，供建筑及制傢俱，器具用。又此树树姿端正，也是优良的觀賞树。

采集号碼 22933

植物名称 雅楠 *Phoebe nanmu* Gamble

土 名 黄楠、金龙舌（平陽）。

生态分布 生長于阴湿的山谷地带、本区龍泉、泰順、平陽、景寧等县均有分布。

經濟用途 叶可提芳香油；种子可榨脂肪油。树杆端直，材質優良，胜于其他楠木。
采集号碼 22757

植物名称 毛柄楠木（新拟）*Phoebe blepharopus* H. — M.

土 名

生态分布 散生于景宁山谷的什木林內，本区其他地方分布較少。

經濟用途 种子有香气，可以榨油。木材美观，可以制作家具。

采集号碼 25126

植物名称 錢氏厚壳桂 *Cryptocarya chingii* Cheng

土 名 樟（平阳）。

生态分布 生長于較高山区的阴湿谷地，本区平阳分布較多。

經濟用途 植株可为庭园觀賞用。

采集号碼 24703

植物名称 山胡椒 *Lindera glauca* Bl.

土 名 吃风柴（龙泉）；吃风（景宁）；假死柴（龙泉、太順）。

生态分布 广泛分布在本区各县向阳的荒蕪山坡及稀疏的什木林內。

經濟用途 种子可榨油供制皂、燭用，出油率达41%；叶可提芳香油，又可試制土农藥。

采集号碼 22923

植物名称 釣樟 *Lindera umbellata* Thunb.

土 名

生态分布 分布于山坡溪谷林下或灌叢中，各县均有分布。

經濟用途 叶可提芳香油，名“釣樟油”或“烏樟油”。根皮供藥用，有敷金瘡、疗疥癬之效能，通常有为止血藥。

采集号碼 22040

植物名称 天台烏藥 *Lindera strychnifolia* (S. et Z.) Vill.

土 名 烏藥兒、斑皮叶（龙泉）；銅錢柴（平阳）；斑父柴（景宁）；斑皮柴（泰順）。

生态分布 广泛生長于山坡、山后、山麓、溪溝兩傍树林下阴湿地或灌叢中。

經濟用途 叶可提芳香油，出油率达0.4%。种子可榨脂肪油，出油率32%，可制肥皂。根供藥用为芳香性健胃藥，治胃痙攣、喘息、疝气、小兒腹中腸寄生虫等；对充血性头痛、夜尿症、腹痛、霍乱等有效，又为治猫狗疾病之要藥。平陽民間用根治气喘病。藥物以本省天台产者为佳。

采集号碼 22610

植物名称 香叶树 *Lindera communis* Hemsl.

土 名
生态分布 景宁、泰顺等县的阴坡什木林中均有生长。
经济用途 叶可提芳油，种子可榨脂肪油。
采集号碼 25123

植物名称 六驳 *Actinodaphne lancifolia* (S. et Z.) Meisn
土 名
生态分布 生长于山坡溪谷边的什木林内，本区各地星散分布。
经济用途 植株供观赏，种子及叶均可提芳香油。
采集号碼 24713

植物名称 山鸡椒 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers.
土 名 山苍子(各县)；山乌樟、典樟(平阳)；山苍柴(泰顺)。
生态分布 广泛分布于本区各地向阳荒山，及石质山地和溪谷、路边灌丛内。
经济用途 为我省重要芳香油料植物，从果实所提出的芳香油，属重要出口物资之一。
果皮中所提取的芳香油，出油率高达3—5%。叶也可提芳香油，出油率0.2—0.4%。
种子可榨脂肪油。平阳民间利用根煎水服，用治痧气，化气降逆。果实不可入药，名毕澄茄。
采集号碼 22890

植物名称 豹皮樟 *Litsea rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* All.
土 名 花理木(景宁)；豺皮樟(龙泉)。
生态分布 分布于本区各地山坡什木林内以及溪谷两旁。
经济用途 叶子可试提芳香油，种子可榨脂肪油。
采集号碼 22893

植物名称 圆叶豹皮樟 *Litsea rotundifolia* Hemsl.
土 名
生态分布 生长于向阳的山坡上，敖江一带林舍附近多见之，本区其他各地尚不普遍。
经济用途 叶可提芳香油，树形优美，可以观赏用。
采集号碼 24940

植物名称 木薑子一种 *Litsea* sp.
土 名
生态分布 生长于山坡及溪谷地带的什木林内，本区不多见。
经济用途 叶子芳香，可试提芳香油。木材割裂后亦香，挥发油亦多，可作试验。又为重要的工业用材。
采集号碼 23769

植物名称 長叶木薑子 *Litsea elongata* Hook.f.

土 名

生态分布 生長于山坡及山溝的什木林內，泰順、龙泉分布最多。

經濟用途 种子可提脂肪油，叶子芳香可試提芳香油。

采集号碼 23095

植物名称 狭叶六駿 *Actinodaphne angustifolia* Nees.

土 名

生态分布 多散生于山谷地区及西北坡的什木林內，本区各地均有分布。

經濟用途 叶可以提取芳香油，姿态优美可供觀賞用。

采集号碼 24013

植物名称 浙江新木薑子 *Neolitsea chekiangensis* Nakai

土 名 山肉桂（平阳）；月桂（龙泉泰順）；假香桂（景宁）。

生态分布 本区阴湿的山坡溪溝兩旁什木林下。

經濟用途 叶可以提芳香油。种子可以榨脂肪油。平阳民間用根入藥能通小便。

采集号碼 23021

14. 毛茛科 Ranunculaceae

植物名称 毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb.

土 名 狗脚跡（龙泉）。

生态分布 本区路边湿地、山間阴湿之处普遍生長。

經濟用途 全草供藥用。龙泉民間用根入藥，据云可去肚风。

采集号碼 22821

植物名称 山木通 *Clematis pavaliniana* Pamp.

土 名 老虎須、老虎毛（龙泉）。

生态分布 本种广泛散布在本区的山谷溝边灌木叢中，喜生于較庇阴处。

經濟用途 四川的草藥鋪把它的莖作利尿藥出售。花叶清丽，可作觀賞用。泰順民間用其根通五臟經絡。龙泉民間用根去热发散。

采集号碼 22646

植物名称 亨氏鉄綫蓮 *Clematis henryi* Oliv.

土 名 雪里开（各地）。

生态分布 生長于溝边林緣的阴湿地，本区分布較星散。

經濟用途 平阳民間用根、叶和猪腦髓煎水冲酒一杯服，主治头痛；又咽喉痛用根三錢米水磨含口，花和猪肺或羊肺煎，服能止咳清肺。全株又可做觀賞用。

采集号碼 21230