

● 王天益编著 刘振乾审校

中兽医牛病诊治医案选



封面设计：郑 正

统一书号：16204·197
定 价：0.95 元

中兽医牛病诊治医案选

湖南科学技术出版社

中兽医牛病诊治医案选

王天雄编著

湖南科学技术出版社

责任编辑：贺晓兴

湖南科学技术出版社出版

（长沙市展览馆路14号）

湖南省新华书店发行 衡阳印刷厂印刷

1985年9月第1版第1次印刷

开本，787×1092毫米 1/32 印张，6.75 字数，152,000

印数，1—7,400

统一书号：16204·197 定价：0.95 元

编写说明

据《周礼》一书记载，约公元前十一世纪时，我国已设有专职兽医，诊治兽病。但古代兽医医案几乎没有记载。现在仅存清代《牛医金鉴》中有三个牛病医案。1979年《新编中兽医学》中选用了八十七个医案。大量的医案则散见于一些专业杂志上。

作者从1972年开始收集老中兽医的验方和典型病例，不断总结验证，又从文献资料中学习摘抄，在十余年的教学、科研中积累了不少材料。本书是以自身实践验证的医案为主，补充了四川省和全国已经报道的成功经验所例举的典型医案。

中兽医治病特点是辨证论治。因此，体例上必须理、法、方、药完整统一。本书以牛的内科病、外科、伤科和胎产病为限，其他传染病、寄生虫病均从割爱。

医案之价值，固在用药之切合，及施治之效验。但按语之阐发病理，亦宜透辟精警。故本书所辑，理、法、方、药并重。凡医案观其变化处，最耐寻味。编著者尽力加按，勤求古训，博采众长。误治医案，也公诸于世，引以为戒。

由于个人学识有限，书中不当之处，尚希读者指正。

目 录

第一章 牛内科病证治医案选	(1)
第一节 脾胃疾病	(1)
一、脾胃气虚 (脾虚不磨、前胃弛缓)	(1)
二、气滞腹胀 (瘤胃臌气)	(10)
三、宿草不转 (瘤胃积食)	(21)
四、津枯胃结 (百叶干燥, 瓣胃阻塞)	(31)
五、翻胃吐草	(41)
六、泄泻 (拉稀)	(49)
七、便秘	(85)
第二节 肺的疾病	(88)
一、感冒 (伤风)	(88)
二、咳嗽	(103)
三、喘证	(113)
第三节 肝胆疾病	(123)
一、牛风火眼 (眼结膜炎)	(123)
二、白云遮睛	(128)
三、黄疸	(132)
第四节 肾的疾病	(135)
一、肾阳虚	(135)
二、肾阴虚	(140)
三、淋证	(141)

第五节 心的疾病 (149)

- 一、 心火上炎（口疮） (149)
- 二、 心火内盛（中暑） (150)
- 三、 痰火扰心（癫狂） (152)
- 四、 痰迷心窍（癫痫） (154)

第二章 牛胎产病证治医案选 (158)

- 一、 带下证 (158)
- 二、 垂脱症（阴道脱出、子宫脱出） (161)
- 三、 胎衣不下 (168)
- 四、 缺乳 (172)
- 五、 乳痈（乳房炎） (176)
- 六、 恶露不尽 (178)

第三章 牛的外科与伤科证治医案选 (180)

- 一、 疮癤 (180)
- 二、 外伤 (187)
- 三、 骨折 (204)

第一章 牛内科病证治医案选

第一节 脾胃疾病

一、脾胃气虚（脾虚不磨、前胃弛缓）

例一：1974年春，汉源县郝培光家有1水牯牛，6岁，因春耕农忙而过劳，不吃草。

【检查】瘤胃蠕动音弱而低沉，每4分钟2次，每个食团咀嚼8至15次。大便中夹有白色粘液，小便短少色黄。口色红，尾脉沉数。

【辨证】脾胃气虚，兼有湿热。

【治法】补益脾胃，清利湿热。

【选方】平胃散加减。

苍术60克 陈皮60克 甘草15克 木香30克 藿香30克
枳实60克 丑牛30克 当归45克 神曲60克 栀子30克 茯苓30克 木通30克

童便一碗为引，煎水分3次口服。

【效果】服药后两天，复诊，食欲好转，瘤胃蠕动音增强，咀嚼39次。

例二：1975年初春，汉源县李绍福家有1黄牛（公牛），11岁，不吃草，未经治疗。

【检查】瘤胃音弱，2分钟蠕动1次，蠕动波持续时间5

至8秒钟。口津滑利，口色淡白，脉沉迟无力。

【辨证】脾胃气虚，气血不足。

【治法】补益脾气。

【选方】楂曲平胃散与四君子汤加味。

苍术60克 陈皮30克 厚朴45克 甘草15克 党参30克
白术45克 茯苓45克 山楂30克 神曲60克 木香30克 青皮
24克 当归45克 黄芪60克 前仁30克

研末，加水灌服，两次服完。

【效果】三日后复诊，开始吃草，逐步好转，一周后痊愈。

例三：1976年夏天，会理县张连发家1驹牯牛，12岁，连续几天吃食很差，尿黄量少，排粪也少。

【检查】体温38.4℃，呼吸每分钟20次，脉搏每分钟50次。瘤胃蠕动每4分钟2次，蠕动音弱，持续10秒钟，口色淡红，脉沉数。

【辨证】脾胃气虚，兼食滞中焦。

【治法】补益脾气，行气消食。

【选方】曲麦散。

苍术24克 厚朴30克 陈皮24克 甘草15克 青皮24克
枳壳21克 山楂30克 神曲60克 麦芽30克 槟榔30克 莱菔子30克 白术30克

水煎半小时，连渣一起灌服，一次服用。

【效果】七天后随访，已愈。

例四：1976年6月4日，会理县杨朝禄家1头水牛，8岁，驹牯牛，吃草不香，有点拉稀。

【检查】眼结膜潮红，口津少，口色红，口温高，口臭。瘤胃蠕动无力，粪稀软。

【辨证】脾虚不磨

【治法】消积导滞

【选方】木香槟榔丸加减。

木香30克 槟榔30克 丑牛24克 青皮24克 陈皮24克
大黄24克 黄柏24克 梔子24克 厚朴24克 白术30克 茯苓
30克 甘草15克

煎水二次灌服，最后连药渣同服。

【效果】随访，已愈。

例五：1976年6月4日，会理县许维新家有1头水牛，10岁，骗牯牛，不大吃草，拉犁无力。

【检查】精神沉郁，四支无力，懒动。鼻镜上沿二指处无汗，下部鼻汗正常，口温高，口津少，舌筋乌红而肿胀，卧蚕偏红。瘤胃蠕动无力，尿黄而少。脉沉数无力。

【辨证】劳伤脾气。

【治法】补益脾气，行气消食。

【选方】养血健脾散加减。

党参45克 白术24克 茯苓30克 甘草15克 当归30克
白芍24克 苍术24克 陈皮21克 枳壳24克 山楂30克 麦芽
30克 神曲30克 补骨脂30克 车前子30克

煎水灌服，两次服，最后连药渣一起喂。

【效果】半月后，告知已愈。

例六：1976年6月7日，会理县张红举家有1头水牛，12岁，母牛，病牛长期吃草不佳，且拉稀。

【检查】粪稍稀，不臭。两眼流泪，眼结膜淡红。耳角、口鼻稍凉，口津多，口色青白。脉沉细无力。瘤胃蠕动音弱、无力。

【辨证】中气下陷，外感风寒。

【治法】升阳举陷，辛温解表。

【选方】补中益气汤加味。

黄芪30克 党参30克 白术30克 陈皮24克 青皮30克
升麻24克 柴胡24克 甘草15克 当归30克 枳壳30克 槟榔
30克 荆芥30克 防风30克

煎水2次服完。

【效果】随访，吃草增加，粪已成堆，已愈。

例七：1974年春，汉源县刘炳禄有1头黄牯牛，8岁，黑白花。吃草不好，瘦弱，拉稀。

【检查】体温39.2℃，心率每分钟66次，瘤胃蠕动无力。被毛干枯，营养不良，体弱。

【辨证】脾气虚弱，气血不足。

【治法】健脾消食，补益气血。

【选方】八珍汤加味。

党参30克 白术30克 茯苓24克 甘草15克 熟地24克
当归30克 白芍24克 川芎24克 山楂30克 神曲30克 苍术
24克 槟榔30克 柴胡24克 葛粉21克

煎水，分两次服。

【复诊】4月9日。病牛体温38.6℃，心率每分钟50次。卧地不起，强行起立，走路不稳。粪干量少。

【选方】改用补中益气汤加味。

黄芪60克 白术24克 陈皮30克 党参60克 升麻24克
柴胡30克 甘草15克 当归30克 神曲30克 山楂30克 木香
24克 草蔻24克 炮姜24克 山药30克 枸杞30克 菊花30克
大枣30克

煎水两次服用。

【三诊】4月12日。病牛体温38℃，心跳快，呼吸微弱。

鼻镜干燥。无汗。倒地不起，二便正常。

【选方】又恢复第一方，八珍汤加味。

党参30克 白术30克 茯苓24克 甘草15克 熟地30克
当归30克 白芍30克 川芎30克 山楂60克 大枣30克 沙参
30克 玄参30克 炮姜24克 肉桂15克，牡蛎30克 鹿角霜30
克

煎水两次服用。

【预后】4月15日下午1时死亡。

【按语】精气夺则虚，积虚成损，积损成劳。脾劳损食，
损脾胀泻，过脾则不治。诚以脾胃为精气生化之源，故治虚
劳，以能食为主。食减胀泄阳虚之症也。宜甘温益火之品，补
阳以配阴。阳虚不复，久则吸短偏卧，而治疗难矣！虚劳以受
补可治，不受补为不治。如用甘温大热可除，乃阳生阴长之
理。虚损转低热泄泻，脉短数者不治。此例虽死，证明前人论
说有理。虚不受补，多为不治之证。

例八：1976年6月6日，会理县毕国洪家有1头黄牛，8
岁，骗牯牛，吃玉米屑玉米，吃小麦屑小麦，胃口一直不好。

【检查】眼结膜淡白，口津滑利，口温低，舌筋不膨胀。
鼻汗成片状，口吐白沫。无食欲，不反刍，瘤胃蠕动音弱。粪
稀而无恶臭，粪渣粗糙，粪中有草节和完整玉米粒。

【辨证】脾虚胃弱，胃寒吐沫。

【治法】温中散寒。

【选方】理中汤加味。

党参30克 白术30克 干姜30克 甘草15克 陈皮30克
法夏30克 青皮21克 枳壳24克

煎水分两次服。

【效果】服一剂，随访已好转，又服一剂痊愈。

例九：1976年6月9日，会理县孙光富家有1头水牛，9岁，骗牯牛，食欲较差，粪便干少，小便黄色。

【检查】眼结膜潮红，鼻汗成片状，口温高，口津粘稠，舌面乳头刺手，舌筋肿胀，口臭，口色红，下齿龈红肿稍突起。尾脉洪数。

【辨证】胃中积热。

【治法】清胃火，便结。

【选方】白虎承气汤加味。

生石膏60克 知母30克 甘草15克 粳米60克 大黄30克（后下） 芒硝90克（另包） 枳壳30克 厚朴30克 青皮30克 栀子24克

煎水两次服。大黄不可久煎，芒硝随汤药冲服。

【效果】服药后次日下午排出大量干粪，开始吃草，服一剂见效。

例十：1964年，四川省荣昌畜牧兽医学校，郑动才报道：《耕牛脾虚不磨病诊治经验总结》，试治18例，均获痊愈。

例如，1963年3月22日，简阳县徐银前家有1头黄牛，9岁，母牛，两天前发病。

【检查】精神沉郁，喜卧懒动，被毛焦干，采食缓慢，食欲减退，暖气特臭。听诊瘤胃蠕动慢，叩诊呈鼓音，耳鼻有冷感，呼出气体有冷感，眼结膜苍白，流泪，小便少，色淡，口色淡白，口津滑利，脉沉细。

【辨证】脾虚胃实夹寒。

【治法】燥湿健脾，理气消食。

【选方】和胃消食汤加减（牛经备要医方）。

苍术60克 木香60克 二丑60克 神曲60克 山楂60克 麦芽60克 厚朴60克 陈皮60克 枳壳60克 槟榔60克 草蔻

60克 莱菔子60克 木通60克 滑石60克 甘草6克 藿香60克

煎水一日两次内服。

【效果】服药后3天检查，食欲恢复，临床症状消失而痊愈。

例十一：1964年6月，四川省荣昌畜牧兽医学校郑动才报道：《牛脾虚不磨的辨证论治》，自拟方——消食平胃散，试治25例，均获良效。如该校实习牧场305号乳牛，8岁，1964年1月31日午后饲养员报告病牛食欲不振，采食缓慢，次日报告，食欲更差。2月2日上午就诊。

【检查】精神不振，喜卧懒动，采食缓慢，不喜饮水，食量大减，精料及红薯均不食，青草和干草采食较少，耳角温和，心率每分钟50次，日产奶量已减少6斤，口色淡白，舌中部稍黄，口津不粘，瘤胃蠕动音弱而短，每分钟1次，尿稍黄，大便正常。

【辨证】脾虚不磨，湿困脾土。

【治法】健脾燥湿，理气消导。

【选方】消食平胃散

槟榔90克 山楂90克 苍术90克 陈皮90克 厚朴60克 甘草15克

煎水，分3次服。

【复诊】2月4日检查，食欲增加，但仍未恢复正常，瘤胃蠕动力弱。

【三诊】2月5日，食欲恢复，临床症状消失。

例十二：1977年7月，江西省清江县雷松林报道：牛患脾虚不磨（前胃弛缓），用五积散加减有效。如1975年清江县某农户有1头水牯牛，5岁，患脾虚不磨病已治月余无效。

【检查】食欲减退，反刍缓慢，瘤胃内容物不坚实，粪中有不消化的饲料。

【辨证】脾虚不磨。

【治法】健脾燥湿，消食和胃。

【选方】五积散加减。

白芷 陈皮 厚朴 桔梗 枳壳 川芎 当归 芍药 甘草 茯苓 苍术 法夏 桂枝 麻黄 生姜

煎水灌服。

【效果】7天后，食欲恢复正常，痊愈。

例十三：1977年河南省灵宝县兽医院报道：《党参、藜芦对牛前胃弛缓的治疗体会》，用反药治疗68例，治愈61例。

1972年2月11日，灵宝县有1头母黄牛就诊，已病7天，不吃食，反刍少。

【检查】体温 37.5°C ，心率每分钟54次，瘤胃蠕动每分钟10次，每个食团咀嚼30次，口腔发粘，粪便正常。

【辨证】脾虚不磨。

【治法】健脾益气。

【选方】自拟方，反药党参藜芦汤。

党参30克 藜芦15克

煎水灌服。

【复诊】次日检查，食欲增加，体温 37.5°C ，心率每分钟52次，瘤胃蠕动每3分钟5次，每个食团咀嚼42次，又服原方一剂。

【三诊】第三天检查，食欲正常，瘤胃蠕动3分钟5次，蠕动有力，每个食团咀嚼45至60次。

例十四：1972年5月2日，灵宝县张常智家有1头母黄牛，5天前发病，不大吃草、拉稀。

【检查】口腔湿滑，瘤胃蠕动每分钟1次，音弱而短，每个食团咀嚼15至17次，粪稀。

【辨证】脾虚不磨。

【治法】燥湿健脾。

【选方】党参藜芦汤加味。

党参30克 藜芦15克 苍术30克 白术60克 茯苓60克
2剂，煎水内服。

【复诊】5月6日检查，体温37.7℃，瘤胃蠕动3分钟5次，每次持续10至15秒钟，每个食团咀嚼45至55次，粪便正常。

【按语】《元亨疗马集》曰：“诸参辛芍叛藜芦”。但该书书中就有反药方甘草汤（藜芦配苦参）和《牛经大全》方（藜芦配细辛），《司牧安骥集》的吹鼻散（人参配藜芦）。1973年8月，河南省漯河市兽医院报道：用反药党参配藜芦治牛前胃弛缓。1981年中国农科院中兽医研究所等报道：用党参藜芦汤共治133头（次），治愈92头（次），好转25头（次），有效率88.1%，一般2至4剂治愈。病牛实验室化验，牛瘤胃弛缓，病情越重，纤毛虫数越少，治愈后，纤毛虫逐渐恢复。对瘤胃蠕动有促进作用，因为党参能补中益气，健脾和胃，藜芦能促进瘤胃蠕动，故能取效。每剂藜芦的全草用量以15克，茎叶用量15至30克为宜。由此可见反药用之得当，相反相成，不仅无妨，而且可治病。

例十五：1978年山东省畜牧兽医学校报道：《耳穴注射红花液治疗牛的初、中期前胃弛缓症》，共治34例，全部治愈，取得了满意的疗效。取耳后窝穴，在耳根部后方凹陷处的稍上方，每次用30毫升。红花液作煎剂，浓度10%。1971年3月12日，山东省潍坊市九龙山有1头公牛，曾用吐酒石、健胃

散、龙胆酊、陈皮酊治疗，均未见效。3月14日改用红花液耳穴注射治疗。

【检查】粪干尿黄少，瘤胃蠕动音消失，不吃不喝，不反刍，鼻镜微干。

【处理】3月14日10点30分耳穴注射红花液30毫升，12时瘤胃蠕动音仍无。1点半钟出现瘤胃蠕动音，两分钟1次，音短，两点半瘤胃蠕动两分钟一次，音弱，持续时间延长，3月15日反刍，食欲恢复正常。

【讨论分析】：

《诸病源候论》曰：“胃为水谷之海，主受盛饮食者也，脾气磨而消之，则能食。今脾胃二气俱虚弱，故不能饮食也。”《元亨疗马集》曰：“脾磨能消化五谷，阴盛阳衰脾不磨。”日本学者中村良一认为：“前胃弛缓症，与前胃刺激感受性和收缩力减弱，同时反刍机能减退，胃内容物后送迟滞，引起消化障碍。为慢性消化不良、慢性胃弱等。”此病症中兽医叫脾虚不磨，西兽医叫前胃弛缓。多由于饲养管理失调，运输中过劳，衰弱、精神紧张，热性病，传染病，妊娠子宫压迫前胃，第1至4胃的各种疾患等等原因而致病。日本强调作瘤胃按摩治疗。中兽医界直到七十年代全国才注意了本病的经验总结，选方多用补中益气汤、四君子汤、平胃散、理中汤等等。我们选的医案，除这些常用方以外，用了曲麦散、木香槟榔丸、养血健脾散和胃消食汤、消食平胃散、五积散、党参藜芦汤、耳穴注射红花液等。这为临床进一步治疗本病提供了较多的有效方剂。

二、气滞臌胀（瘤胃臌气）

例一：1974年春，汉源县九襄区袁国云家有1头母水牛，