

女 科 祕 方

竹林寺僧著

中醫書局出版



数据加载失败，请稍后重试！

女 科 祕 方

竹 林 寺 僧 著

周 岐 隱 校

上 海 中 醫 書 局 出 版

女 科 祕 方

開本：762X1057 1/32 印張：2 頁數：32 字數：21 千

著 作 者 竹 林 寺 僧

校 訂 者 周 岐 隱

出 版 者 中 醫 書 局

上海山東中路二六號

經 售 者 上 海 圖 書 發 行 公 司

上海山東中路一二八號

印 刷 者 天 星 久 記 印 刷 公 司

版權所有・不准翻印

1955年2月重1版—第1次印刷

1955年7月重1版—第2次印刷

定價：三角

製版：國光 裝釘：春申記 印數：1,001—3,000 冊

竹林寺女科祕方目次

第一症	經閉發熱	一
第二症	血虛發熱	二
第三症	經水或多或少	三
第四症	月水色黃	四
第五症	月水色黑	四
第六症	月水色如猪肝	五
第七症	經水如屋漏水	六
第八症	經水如菜汁	六
第九症	經血挾瘀	七
第一〇症	經水一月數行	八
第一一症	逆經	八
第一二症	陽觸經	九
第一三症	陰觸經	一〇

第一四症	經前氣痛	一〇
第一五症	月水前來	一一
第一六症	經後腹痛	一二
第一七症	帶如泔水	一二
第一八症	帶形似魚腦	一三
第一九症	帶下腹痛	一三
第二〇症	帶如涕水	一四
第二一症	白帶成膜	一四
第二二症	經水不止	一五
第二三症	臨期泄瀉	一五
第二四症	血淋	一六
第二五症	經行不止	一七
第二六症	經來挾帶	一七

竹林寺女科祕方 目次

第二七症	經來咳血	一八
第二八症	臍氣不消	一八
第二九症	蛇瘕	一九
第三〇症	龜瘕	二〇
第三一症	枕瘕	二〇
第三二症	血瘕	二〇
第三三症	氣瘕	二一
第三四症	水瘕	二二
第三五症	積瘕	二二
第三六症	蝦瘕	二三
第三七症	腫症	二四
第三八症	實浮	二四
第三九症	經不通	二五
第四〇症	痰核	二六
第四一症	痰惡	二七
第四二症	胎氣不和	二七

第四三症	胎前浮腫	二七
第四四症	胎前咳嗽	二八
第四五症	胎前吐血	二八
第四六症	吐血熱症	二九
第四七症	胎前衄血	二九
第四八症	子懸	二九
第四九症	胎前痢疾	三〇
第五〇症	胎前跌損動紅	三〇
第五一症	胎前流血	三一
第五二症	久病血漏	三一
第五三症	胎前白帶	三一
第五四症	胎前赤帶	三二
第五五症	胎前氣痛	三二
第五六症	胎前泄瀉	三二
第五七症	胎前感寒	三三
第五八症	胎前中風	三三

第五九症	胎前咽痛	三四
第六〇症	胎前發瘡	三五
第六一症	胎前漏紅	三五
第六二症	胎前發暈	三六
第六三症	胎前作渴	三六
第六四症	胎前損身	三七
第六五症	子癇	三七
第六六症	轉胞	三八
第六七症	氣閉	三八
第六八症	胎前精神困倦	三九
第六九症	胎前虛熱	三九
第七〇症	胎前盜汗	四〇
第七一症	胎前脇痛	四〇
第七二症	胎前痰氣多	四〇
第七三症	胎前內吹	四一
第七四症	胎前耳鳴	四一

第七五症	胎前頭風痛	四二
第七六症	胎前遍身生瘡	四二
第七七症	胎前大便數多	四三
第七八症	胎前腰痛	四三
第七九症	胎前裏急後重	四三
第八〇症	胎前咳嗽腹中有塊	四四
第八一症	胎前腳氣	四四
第八二症	新產昏迷	四四
第八三症	產後胎衣不下	四五
第八四症	產後惡血不盡	四五
第八五症	產後血盡虛痛	四六
第八六症	產後惡寒發熱	四六
第八七症	產後潮熱	四七
第八八症	產後泄痢	四七
第八九症	產後血氣痛	四七
第九〇症	產後氣緊	四八

竹林寺女科秘方 目次

第九一症	產後舌黑	四八
第九二症	產後浮腫	四八
第九三症	產後洩瀉譫語	四九
第九四症	產後中風	四九
第九五症	產後大便不通	四九
第九六症	產後蠱腫	五〇
第九七症	產後血來不止	五〇
第九八症	產後血流不止	五一
第九九症	產後子宮突出	五一
第一〇〇症	產後尿胞突出	五一
第一〇一症	產後咳嗽氣急	五一
第一〇二症	產後漏黃水	五二
第一〇三症	產後吐血	五二
第一〇四症	產後吐血不止	五二
第一〇五症	產後自泄	五三
第一〇六症	產後小便不利	五三

第一〇八症	產後頭痛	五四
第一〇九症	產後雙腳痛	五四
第一一〇症	產後咽痛	五四
第一一一症	產後腫痛	五五
第一一二症	產後耳鳴	五五
第一一三症	產後吐痰血絲	五六
第一一四症	產後臍下結塊	五六
第一一五症	產後血從大便出	五六
第一一六症	產後失音	五六
第一一七症	產後嚙語	五七
第一一八症	產後盜汗	五七
第一一九症	產後夜出冷汗	五八
第一二〇症	難產死胎不下	五八

浙江蕭山 竹林寺女科祕方

四明周岐隱重訂

【第一症】（經閉發熱）

婦人經閉發熱。此病何以得之。此症行經產後。餘血未淨。飲食生冷。或食水菓。血見水則滯。水遇血則凝。所以經閉不通。變身潮熱。頭眩目暈。口苦舌乾。飲食少思。腹內結塊如鷄卵。或左或右而動。此症初起時。卽至二三月易治。先將逍遙散加石蓮子。天花粉。龍胆草。退去潮熱。後用紫金丸。自然經血流通。萬無一失。若加咳嗽生痰。泄瀉不止。肌肉消瘦。此不治之症也。

▲逍遙散

白朮五分 甘草七分 茯苓一錢 蘇薄荷一錢 當歸一錢 白芍一錢
柴胡五分 水煎。不拘時服。

▲紫金丸

陳皮五錢 良姜 莪朮各八錢 檳榔 砂仁 紅豆各六錢 枳壳

烏藥各八錢 三稜一兩 米糊丸。飯後。米湯送百丸。

【第二症】（血虛發熱）

婦人血虛發熱。何以得之。此症怒氣傷肝。血積成塊。或左或右走動。面色青黃。飲食少思。五必煩熱。每月經來色淡。小腹作痛。先用逍遙散退其虛熱。後用調經丸生其新血。消其血塊。熱退經勻如舊。倘延日久。變成骨蒸。咳嗽。泄瀉。肌肉如柴。不可治矣。逍遙散方見上。

▲調經丸

川芎一兩 白芍一兩 熟地二兩 高良姜一兩 三稜一兩 檳榔一兩
烏藥二兩 玄胡索一兩 莪朮一兩 枳壳一兩 當歸二兩 小茴香一兩

右藥共研細末。早米糊爲丸。空心用酒送下。

【第三症】（經水或多或少）

婦人月水不調。陰血內衰。面色痿黃。五心發熱。臨經之際。小腹作痛。腹腿重痠。血來或多或少未定。頭目暈眩。飲食不思。先用清涼散退去煩熱。後用調經四物湯。一月有效。

▲清涼散

黃芩一錢 知母一錢 當歸一錢 丹皮二錢 白芍一錢 茯苓一錢

水煎。不拘時服。

▲調經四物湯

當歸一錢 生地一錢 丹皮一錢 白芍二錢 香附一錢 砂仁一錢

川芎五分 黃芩二錢 加生姜三片。水煎。空心服。

【第四症】（月水色黃）

婦人月水色如黃泥汁。肌肉消瘦。此症傷食。脾熱經燥。土不能生血。故成此症。先用黃芩湯。降去五心煩熱。後用理脾順氣丸。氣血調則經勻矣。

▲黃芩湯

蒼朮五分 川芎五分 當歸一錢 花粉二錢 甘草二分 黃芩一錢

白芍一錢 水煎服。

▲理脾順氣丸

沉香二兩 小茴香二兩 草菓二兩 砂仁三兩 三稜一兩 大茴香二兩
枳殼一兩 良姜一兩 莪朮一兩 白荳蔻一兩 烏藥二兩 陳皮一兩
共研細末。早米糊爲丸。每服五十粒。空心米湯送下。

【第五症】（月水色黑）

婦人月經如黑灰水者。此症虛弱。血衰微。面色青。嗜睡或臥不安。五心煩熱。口枯舌乾。頭眩目暈。小腹作痛。卽服調經丸。見上二症。

【第六症】（月水色如豬肝）

婦人月水如豬肝色。此症生產勞傷。氣血變壞。五心煩熱。頭目昏迷。遍身疼痛。飲食不思。惡心嘔逆。先用龍腦湯退其潮熱。後用內補當歸丸調其經水。次月經來卽愈。

■龍腦湯

薄荷一錢 茯苓五分 人參五分 地骨皮二錢 白芍一錢 川芎五分
水煎服。

■內補當歸丸

阿膠二兩 杜仲二兩 乾姜一兩 肉桂一兩 川斷二兩 當歸二兩

附子一兩 蒲黃一兩 白芍二兩 熟地二兩 茱萸五錢 甘草五錢
共研細末。米糊爲丸。每服一百丸。空心鹽酒湯送下。

【第七症】（經水如屋漏水）

婦人經來。如屋漏水者。此症元氣虛寒。子宮有瘀血不淨也。五心作熱。口苦舌乾。遍身疼痛。飲食少思。經盡之時。略兼白帶。當服溫經湯。生血補血立效。

■ 溫經湯

白朮五分 肉桂五分 乾姜七分 甘草二分 丹皮二錢 白芷五分
當歸一錢 熟地一錢 阿膠二錢 生姜三片 水煎。空心溫服。

【第八症】（經水如菜汁）

婦人月水。如菜汁。如銅綠水。此症子宮太冷。血大虛。人形如肥。體盛血衰。不可用涼藥。急用烏雞丸散。旬日或一月後。血盛。卽有孕矣。

■烏雞丸

天雄一兩 附子一兩 萸肉一兩 當歸二兩 白芍二兩 茯苓二兩
菴蓉二兩 熟地二兩 川芎八分 肉桂五分 甘草五分 鹿血片一錢
用白絲毛烏骨雞肉四兩。同藥末晒乾。共研細末。早米糊爲丸。每服一百丸。空心酒送下。

【第九症】（經血挾瘀）

婦人經血。來如猪血。或條或成塊。而小腹作痛。或不痛。面色青黃。不思飲食。此症宜用金狗丸。後月其形不見。經則勻矣。

■金狗丸

當歸二兩 金毛狗脊二兩 肉桂五錢 川芎二兩 熟地一兩 川續斷二兩
地榆二兩 阿膠一兩 茯苓一兩 右藥共研細末。米糊爲丸。空心酒送下。

【第十症】（經水一月數行）

婦人經水一月數行。此腎虛不能攝血所致。日久則精神困倦。面色痿黃。頭眩眼花。腰膝痠軟。宜用歸經湯。數劑自愈。

■歸經湯

大生地四錢

當歸三錢

白芍三錢

山萸肉三錢

續斷二錢

杜仲二錢

荊芥炭錢半

清水煎服。

【第十一症】（逆經）

婦人月水逆行。從口鼻而出。此症傷熱毒太過。血熱則亂行。頭痛口燥。宜清血不可補。宜用犀角黃芩湯。後服黃連丸神效。

■犀角黃芩湯

犀角一錢

枳殼五分

百草霜一錢

生地二錢

白芍五分

橘紅一錢

淡青芩二錢 甘草二分 丹皮一錢 桔梗五分 加生姜三片水煎服。

■黃連丸

川黃連去鬚微炒七錢五分 黃柏微炒七錢五分 厚朴去皮生薑汁塗炙令香七錢五分 當歸微炒五錢 乾姜炮製五錢

木香勿見火五錢 地榆五錢 阿膠一兩 研爲末。煉蜜和爲丸。每服二十九丸。

【第十二症】（陽燭經）

婦人月水。方行一半未盡。忽然作渴。飲食生冷。阻滯不行。變成潮熱。頭痛或痛。此乃大熱也。切不可用補劑。宜涼血爲先。用黃芩湯如神。後用血竭丸。退去積滯斷根矣。

■黃芩湯

黃芩一錢 白芍一錢 蒼朮五分 花粉一錢 當歸一錢 川芎五分

甘草二分 水煎。不拘時服。