

外科疾病用药



中成药家庭用药指南

主编

王伊光

陈可冀



主编 王伊光

副主编 张燕生 韩平

编者(按姓氏笔画排序) 王伊光 王志坚 代红雨 张燕生 韩平

人民卫生出版社

韩平

外科疾病用药

中成药家庭用药指南

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外科疾病用药 / 王伊光主编. —北京：人民卫生出版社，2004. 6

(中成药家庭用药指南)

ISBN 7-117-06249-5

I. 外… II. 王… III. 外科—疾病—中成药
IV. R287.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 051022 号

中成药家庭用药指南 外科疾病用药

主 编：王伊光

出版发行：人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址：(100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址：<http://www.pmph.com>

E-mail：pmph@pmph.com

印 刷：北京人卫印刷厂(尚艺)

经 销：新华书店

开 本：850×1168 1/32 印张：7.25

字 数：133 千字

版 次：2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号：ISBN 7-117-06249-5/R·6250

定 价：21.00 元

著作权所有，请勿擅自用本书制作各类出版物，违者必究
(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

《中成药家庭用药指南》编委会

总策划 田大方 殷顺海

总主编 陈可冀

副总主编 徐荣谦 郭世忠

主 审 方和谦 张炳厚 金世元 谢海洲

副主审 方明节 鲍志东

编委会成员 (以姓氏笔画为序)

王伊光	田瑞华	冯淬灵	刘士义	刘 岑	刘英杰
匡桂申	毕界平	何秀兰	宋秀江	张金杰	张京春
张萍菊	张 毅	张燕生	杨祖新	陆建国	孟 可
金永年	金霭英	俞兴源	胡美玉	赵爱民	郝 真
韩 平	郭宝玲	徐荣谦	顾海鸥	梅 群	蒯文润

序



中医药学是一个伟大的宝库，在长期的医疗实践中逐渐形成的具有固定处方和剂型的中成药是这个宝库中璀璨的明珠。中成药在中医药理论指导下配伍加工而成，具有组方严谨、疗效确切、携带和服用方便等特点，受到人们的普遍欢迎。为使广大群众和患者更好地了解和使用中成药，必须重视普及和推广中成药知识的工作，这是中医药工作者应该承担起来的任务。

同仁堂是中药名牌企业，历史悠久，拥有一批知名中成药品种，在群众中享有良好的信誉。今天，在其 335 周年堂庆之际，一部以同仁堂生产的中成药品种为主，兼以收录其他公司名特优新品种的《中成药家庭用药指南》丛书即将呈献给广大读者。丛书定位于科普作品，分外科疾病用药、妇科疾病用药、儿科疾病用药和五官科疾病用药等八个分册，每一分册中，在总论部分提纲携领地介绍中成药发展史、中医药基本理论和中成药常用剂型与使用方法等常识，随后以常见病、多发病为主线，分证型介绍适用的中成药。对每一种中成药则阐述其来源、组成、规格、应用要点、临床应用经验、使用方法、使用禁忌和使用注意事项等内容。丛书通俗易懂，深入浅出，科学性和实用

性较强,希望作为家庭用药的工具书,对指导广大群众和患者正确使用中成药能够起到积极的作用。

丛书由有丰富经验的临床医生为作者,由著名中医药专家担任总主编和主审,保证了丛书编写的质量。专业人员尤其是专家投入到中医药的科普工作中,编写满足群众医疗保健需要的书籍,这是值得称道和鼓励的,希望今后有更多的专家学者参与中医药科普工作,为更广大人民的健康服务。

余靖

二〇〇四年六月



前 言




随着人民群众生活水平的不断提高,保健意识的不断增强,广大人民群众对家庭用药知识的需求也越来越迫切,本套书旨在满足广大读者的需求,更好地普及家庭用药知识,指导消费者合理用药,提高人民群众的健康水平。为此,有着 335 年历史的中国北京同仁堂(集团)有限责任公司与国内卫生部直属的最权威的医药卫生出版社——人民卫生出版社合作出版《中成药家庭用药指南》系列科普丛书。

丛书中的外科用药分册以外科常见多门类病症为题,如:①各类外科浅表感染性疾病,②各种常见皮肤病,③常见甲状腺疾病,④各种乳房疾病,⑤淋巴结核,⑥痔,⑦各种周围血管疾病,⑧各种外伤,⑨烧伤等;谈读者如何根据自己的病情自我科学、正确、合理地选用中成药,特别是选择“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”的中国北京同仁堂(集团)有限责任公司及其他公司名特优新的中成药产品,以达到强身健体、抗衰防老、防病治病、养生康复的目的。

本书为谈病论药,编写方式为①先列出疾病名称,②简述西医疾病的概念及主要症状,③介绍中医分型及证型特点,④在每个病证项下列出适宜的中成药名称,⑤在每个病症后集中详细介绍所列中成药,





外科疾病用药

⑥所列中成药包括处方组成、功能主治、剂型规格、用法用量、注意事项、临床新用等方面的内容。

丛书中的外科用药分册具有①科学性：本套书所列药品均为名家名品，是根据所论及的病症，严格挑选，确保对症、高效、安全和便于服用。在介绍药品的同时也论及服用此药品需注意的问题。②实用性：本套书所选用的中成药均为便于购买、易于服用并有确切疗效的药品。（特别是在读者不便于或不适用于就医的情况下参考本书，并可自行上药店购买的处方中成药）。③通俗性：本书不同于一般的药物手册，尽可能的使用了简明、生动、形象的语言，并配以图表等群众喜爱和易于接受的方式编写，以便读者理解和应用。

编 者

2004年6月




目 录




第一部分 中成药概述	(1)
一、中成药发展史	(1)
二、中医药基本知识.....	(3)
三、中成药的常用剂型与使用方法.....	(10)
四、本书撰写的思路和方法	(21)
第二部分 外科用药	(23)
概述	(23)
外科浅表感染性疾病	(25)
疖	(26)
一、什么是疖	(26)
二、疖的中医分型	(26)
(一)热毒蕴结证	(26)
(好发于项后、背部、臀部。轻者疖肿只有一 二个,多则可散发全身)	
(二)暑热浸淫证	(27)
(局部皮肤红肿结块,灼热疼痛,范围局限,发 于夏秋季节,以小儿及产妇多见)	
(三)体虚毒恋证	(27)
(疖肿常此愈彼起,不断发生。疖肿较大,易 转变成有头疽)	







三、用药注意事项	(27)
四、治疗疖的常用中成药	(27)
(一)疖的常用内服中成药	(27)
1. 清血内消丸	(27)
2. 活血消炎丸	(28)
3. 小败毒膏	(29)
4. 连翘败毒丸	(30)
5. 西黄丸	(31)
(二)疖肿的外治中成药	(32)
1. 如意金黄散	(32)
2. 铁箍散	(34)
五、疖的家庭预防与调护	(34)
痛	(35)
一、什么是痛	(35)
二、痛的中医分型分期	(35)
(一)初期	(35)
(局部红肿坚硬,肿块上有粟粒状脓头,作痒作痛)		
(二)溃脓期	(36)
(疮面腐烂形似蜂窝,肿势范围大小不一,便秘小便黄)		
(三)收口期	(36)
(坏死组织脱落,新肉生长,肉色红活,逐渐收口而愈)		
三、用药注意事项	(36)
四、治疗痈的常用中成药	(37)
(一)痈的常用内服中成药	(37)
1. 活血解毒丸	(37)
2. 绿萼点舌丸	(38)





3. 清血内消丸	(39)
4. 活血消炎丸	(40)
5. 西黄丸	(40)
6. 小败毒膏	(40)
7. 连翘败毒丸	(42)
8. 醒消丸	(42)
9. 小金丸	(42)
(二) 痛的常用外治中成药	(43)
1. 如意金黄散	(43)
2. 铁箍散	(43)
3. 提毒散	(45)
4. 龟甲散	(45)
5. 生肌散	(46)
6. 珍珠散	(47)
7. 生肌玉红膏	(48)
五、痛的家庭预防与调护	(49)
丹毒(网状淋巴管炎)	(49)
一、什么是丹毒	(49)
二、丹毒的中医分型	(50)
(一)发于头面者为风热化火	(50)
(二)发生腰胯者为肝经火旺,脾经湿热相感 而成	(50)
(三)发于下肢者为湿热下注、化为火毒	(50)
(四)发于小儿者,则由于胎火胎毒所致	(50)
三、用药注意事项	(50)
四、治疗丹毒常用中成药	(50)
(一)丹毒内治中成药	(50)







1. 活血解毒丸	(50)
2. 清血内消丸	(51)
3. 连翘败毒丸	(52)
4. 小败毒膏	(53)
5. 活血消炎丸	(53)
6. 复方夏枯草膏	(53)
7. 绿萼点舌丸	(53)
8. 二妙丸	(53)
9. 西黄丸	(54)
(二)丹毒外治中成药	(54)
1. 如意金黄散	(54)
2. 赛金化毒散	(55)
五、丹毒的家庭预防与调护	(56)
急性淋巴管炎(红丝疔)	(56)
一、什么是急性淋巴管炎	(56)
二、急性淋巴管炎的中医分型	(57)
(一)火毒入络证	(57)
(患肢红丝较细,红肿疼痛;全身症状较轻)	
(二)火毒入营证	(57)
(患肢红丝粗肿明显,迅速向近端蔓延;并伴淋巴结肿大作痛;全身寒战高热)	
三、用药注意事项	(57)
四、治疗急性淋巴管炎的常用中成药	(57)
(一)急性淋巴管炎内服中成药	(57)
1. 绿萼点舌丸	(57)
2. 清血内消丸	(58)
3. 连翘败毒丸	(59)






(二)急性淋巴管炎外用中成药	(59)
1.如意金黄散或铁箍散	(59)
2.生肌散	(60)
五、急性淋巴管炎的家庭预防与调护	(60)
褥疮	(60)
一、什么是褥疮	(60)
二、褥疮的中医分型	(61)
(一)正盛邪实	(61)
(局部表现为脓液粘稠,腐肉易脱)	
(二)正气虚衰	(61)
(患者全身状况差,局部表现为脓液稀薄臭秽,腐肉色黑难脱,周边漫肿)	
三、用药注意事项	(61)
四、治疗褥疮常用中成药	(61)
(一)龟甲散	(61)
(二)生肌散	(62)
(三)珍珠散	(63)
五、褥疮的家庭预防与调护	(64)
小腿慢性溃疡	(64)
一、什么是小腿慢性溃疡	(64)
二、小腿慢性溃疡的中医分型	(65)
(一)湿热下注型	(65)
(起始多先痒后痛,或痛痒相兼,皮红漫肿,溃破后脓水淋漓,形成溃疡)	
(二)中气下陷型	(65)
(溃疡日久不愈,疮口下陷,边缘形如缸口,疮面肉色灰白或暗红或灰黄)	





三、用药注意事项	(65)
四、治疗小腿慢性溃疡的中成药	(65)
(一)治疗小腿慢性溃疡的内服中成药	(65)
1. 连翘败毒丸	(65)
2. 二妙丸	(65)
3. 补中益气丸	(66)
(二)治疗小腿慢性溃疡的外用中成药	(66)
1. 提毒散	(66)
2. 龟甲散	(67)
3. 生肌散	(67)
4. 珍珠散	(68)
五、小腿慢性溃疡的家庭预防与调护	(69)
外科浅表感染性疾病家庭选药指导	(69)
皮肤病	(70)
银屑病	(73)
一、什么是银屑病	(73)
二、银屑病的中医辨证	(74)
血热风燥	(74)
(皮疹颜色鲜红,多呈点滴状或钱币状浸润性斑 疹,新鲜皮疹不断出现,上覆较多白色鳞屑,刮之 可见薄膜现象及点状出血)		
三、用药注意事项	(74)
四、治疗银屑病常用中成药	(74)
克银丸	(74)
五、银屑病的家庭预防与调护	(75)
疥疮	(76)
一、什么是疥疮	(76)






二、疥疮的中医辨证	(77)
脏腑毒热, 血液不清	(77)
(皮损以水疱为多, 丘疱疹泛发)	
三、用药注意事项	(77)
四、治疗疥疮常用中成药	(78)
(一) 大败毒胶囊	(78)
(二) 润肌皮肤膏	(79)
五、疥疮的家庭预防与调护	(79)
荨麻疹	(80)
一、什么是荨麻疹	(80)
二、荨麻疹的中医分型	(81)
(一) 湿热蕴结、热毒壅盛	(81)
(局部风团片大、色红、瘙痒剧烈)	
(二) 脏腑积热, 风热湿毒	(81)
(风团鲜红, 灼热剧痒, 遇热加重, 得冷则减; 伴有 发热, 恶寒, 咽喉肿痛)	
(三) 经络不和, 湿热血燥	(81)
(身起风团, 时起时消, 散在大小不等红色水肿样 风团, 瘙痒剧烈)	
三、用药注意事项	(82)
四、治疗荨麻疹常用中成药	(82)
(一) 防风通圣丸	(82)
(二) 连翘败毒丸	(82)
(三) 小败毒膏	(83)
(四) 皮肤病血毒丸	(84)
五、荨麻疹的家庭预防与调护	(86)
脚癣	(86)



一、什么是脚癣	(86)
二、脚癣的中医分型	(86)
(一)湿热下注	(86)
(证见趾间,也见于足底糜烂,刺痒难忍。特征为 皮下水疱,浸渍糜烂,脱屑,瘙痒等)		
(二)血燥湿盛	(87)
(证见趾缝,也见于足底皮肤增厚,粗糙干裂,瘙不流水)		
三、用药注意事项	(87)
四、治疗脚癣常用中成药	(87)
(一)脚气散	(87)
(二)止痒酊	(89)
(三)润肌皮肤膏	(89)
(四)荆芥地肤止痒搽剂	(90)
(五)皮肤病血毒丸	(90)
五、脚癣的家庭预防与调护	(91)
痤疮	(92)
一、什么是痤疮	(92)
二、痤疮的中医分型	(93)
(一)血燥湿盛	(93)
(面部尤其是鼻唇沟,眉毛等处潮红,脱屑斑片,粟 粒至豆大红色或与皮肤色毛一致的丘疹)		
(二)血燥风盛	(93)
(多发于面部或胸背,为粟粒状豆大的毛囊一致性 丘疹)		
三、用药注意事项	(93)
四、治疗痤疮常用中成药	(93)
(一)润肌皮肤膏	(93)



(二)大枫子油	(94)
(三)皮肤病血毒丸	(95)
(四)当归苦参丸	(95)
(五)养荣祛斑膏	(96)
五、痤疮的家庭预防与调护	(97)
酒渣鼻	(97)
一、什么是酒渣鼻	(97)
二、酒渣鼻的中医分型	(98)
(一)血燥湿盛	(98)
(证见鼻准头及鼻两边皮肤潮红,伴发丘疹脓疱及毛细血管扩张)	
(二)血燥风盛	(99)
(证见面部五点分布,即鼻尖、两眉间、两颊部、下颌部、鼻唇沟等处,在潮红的基础上出现散在的粟粒大丘疹或掺杂小脓疱)	
三、用药注意事项	(99)
四、治疗酒渣鼻常用中成药	(99)
(一)润肌皮肤膏	(99)
(二)皮肤病血毒丸	(100)
(三)大枫子油	(101)
(四)防风通圣丸	(101)
五、酒渣鼻的家庭预防与调护	(101)
脓疱疮	(102)
一、什么是脓疱疮	(102)
二、脓疱疮的中医辨证	(103)
暑湿热蕴	(103)
(头面、四肢等暴露部位皮损初起为红斑,或为水	

