

国家执业医师资格考试丛书

最新

国家执业医师资格考试

2003 口腔助理医师考试 全真模拟及精解

(第二版)

《口腔助理医师考试全真模拟及精解》专家组 编

◎ 以国家口腔执业助理医师资格考试大纲为依据

◎ 内容涵盖资格考试的主要考点

◎ 专家出题 全真模拟

◎ 考前冲刺 实战训练



北京大学医学出版社

1 [A] [B] [C] [D] [E]
2 [A] [B] [C] [D] [E]
3 [A] [B] [C] [D] [E]
4 [A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]
[A] [B] [C] [D] [E]

国家执业医师资格考试

口腔助理医师考试全真模拟及精解

(第二版)

《口腔助理医师考试全真模拟及精解》专家组 编

编委名单

主编：刘宏伟

编委：(按姓氏笔画排序)

王伟健 刘宏伟 刘 林 李铁军

张 笋 张 豪 杨亚东 欧阳翔英

董艳梅 谭建国

秘书：吴 华

北京大学医学出版社

KOUQIANG ZHULI YISHI KAOSHI QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

口腔助理医师考试全真模拟及精解/《口腔助理医师
考试全真模拟及精解》专家组编.—2版.—北京:北
京大学医学出版社,2003.4

(国家执业医师资格考试丛书)

ISBN 7-81071-432-5

I.口… II.刘… III.口腔科学-医师-资格考
核-解题 IV.R78-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 015771 号

北京大学医学出版社出版发行

(100083 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内)

责任编辑:靳新强

责任校对:王怀玲

责任印制:郭桂兰

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:12.25 字数:294千字

2003年3月第2版 2003年3月第1次印刷 印数:1-6000册

定价:23.00元

版权所有 不得翻印

第二版前言

出版这套丛书的动机源自执业医师（助理医师）资格考试后的座谈会，与会的考生及有关人士一致认为执业医师资格考试是成功的，试题内容涉及作为合格医师必须掌握的基本理论、基本技能和相应的法规知识，对提高我国医师队伍的总体素质将起到积极的作用。但也有不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生对题意理解偏差而未能答对，尤其工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应考信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习，我们组编了这套试题精解及全真模拟丛书，包括临床、口腔、公卫医师及助理医师共6册，与医师资格考试的门类相一致。正式出版以来，深受广大考生的欢迎，予以好评。

国家医师资格考试委员会于2001年12月组织有关专家，对《国家执业医师（助理医师）资格考试大纲》进行了全面的修订，为了适应新《大纲》的要求，满足广大考生的需要，我们组织相关专家对这套丛书进行了相应的更新与修订，以使本套丛书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，达到全真模拟的效果。

每本书的主要内容：①国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；②三套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，按照以往考试的试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
口腔助理医师全真模拟试卷 (一)	(4)
第一单元	(4)
第二单元	(22)
答题卡	(41)
试卷 (一) 答案及试题分析	(45)
第一单元	(45)
第二单元	(55)
口腔助理医师全真模拟试卷 (二)	(65)
第一单元	(65)
第二单元	(83)
答题卡	(101)
试卷 (二) 答案及试题分析	(105)
第一单元	(105)
第二单元	(116)
口腔助理医师全真模拟试卷 (三)	(127)
第一单元	(127)
第二单元	(144)
答题卡	(163)
试卷 (三) 答案及试题分析	(167)
第一单元	(167)
第二单元	(178)

考试题型介绍与答题技巧

国家医师资格考试采用的题型有 A 型题和 B 型题。A 型题中, A1、A2、A3、A4 型题均出现了; B 型题中只出现了 B1 型题。现分别介绍于下(所列例题均选自历届口腔助理医师资格考试试卷):

一、A1 型题

A 型题属于最佳选择题类型。A1 型题为单个最佳选择题, 每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成(见例题 1)。要求应考者找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案, 此为正确答案, 其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义, 干扰答案或是完全不符合题干要求, 也可以是部分符合题干要求, 因此答题时应审慎选择, 以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”(见例题 2), 这有两种情况: ①“以上都不是”作为正确答案, 其他 4 个答案均是干扰答案, 而且是绝对不符合题干要求的, 真正的正确答案没有出现; ② 5 个备选答案中已含有正确答案, 而“以上都不是”只是 1 个干扰答案而已, 答题者应慎之! A1 型题中还有一种否定型形式, 试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式(见例题 3)。题干中有 1 个特别标注的(用黑体或加着重号标注)否定词(不、不是、不能、除外、错误、无关等), 要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案, 而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的, 或者是最不合适的, 或者是例外的, 或者是用得最少的。

例题 1 恒牙列中, 患龋率最高为

- A. 下颌第二磨牙
- B. 下颌第一磨牙
- C. 下颌前磨牙
- D. 上颌前磨牙
- E. 上颌第一磨牙

正确答案: B

例题 2 会引起翼静脉丛血肿的局麻方法有

- A. 上颌结节麻醉
- B. 腭大孔麻醉
- C. 鼻腭神经麻醉
- D. 颊长神经麻醉

E. 以上都不是

正确答案: A

例题 3 《医疗机构管理条例》规定, 医疗机构必须将有关文件悬挂于明显处所, 除了

- A. 医疗机构批准书
- B. 医疗机构执业许可证
- C. 诊疗科目
- D. 诊疗时间
- E. 收费标准

正确答案: A

二、A2 型题

A2 型题是病历摘要型最佳选择题, 多用于考查临床学科的知识与技能(见例题 4), 但基础医学与其他学科也常采用(见例题 5)。试题由一个叙述性的简要病历(或其他主体)

作为题干和 5 个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题 4 一成人患者，腮腺区反复肿胀、疼痛 2 年，腮腺导管口红肿，有脓性渗出物溢出。X 线造影检查显示主导管呈腊肠状，末梢导管无明显改变，拟诊断为

- A. 腮腺恶性肿瘤
- B. 腮腺良性肿瘤
- C. 慢性化脓性腮腺炎
- D. 腮性结核
- E. 良性腮腺肥大

正确答案：C

例题 5 某稳定型心绞痛病人，近期发生一过性脑缺血，在给予常规抗心绞痛

药物的同时，选用小剂量阿司匹林治疗，其理论依据是药物

- A. 抑制 PG 合成酶，使 PGI_2 合成减少
- B. 抑制 PG 合成酶，使 TXA_2 合成减少
- C. 抑制 PG 合成酶，使 PGE_2 合成减少
- D. 抑制 PG 合成酶，消除痛觉增敏效应
- E. 抑制 PG 合成酶，使致炎物质释放减少

正确答案：B

三、A3/A4 型题

A3 型题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床案例，然后在案例下提出若干道考题，每道考题均与案例有关，但测试点不同，各考题之间相互独立（见例题 6）。每道考题备有 5 个备选答案，要求选择 1 个最佳的答案，其余的答案可以是错误的，也可以是部分正确的，但只能有 1 个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3 型题和后面讲述的 A4 型题多用来考查临床学科的知识 and 技能，但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识 and 技能。

A4 型题为病历串型最佳选择题，试题的结构类似 A3 型题，也是先叙述 1 个临床案例，然后提出若干个相关的问题，与 A3 型题不同的是当病情逐渐展开时，可逐步增加新的信息（见例题 7）。每个问题均与开始叙述的临床案例有关，又与随后增加的信息有关，所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4 型题中的每个问题也有 5 个备选答案，要求找出 1 个最佳的答案，其余的备选答案可以是部分正确，也可以是错误的。A4 型题也有否定型形式，否定词下常用着重号标出以提醒应试者。

例题 6 （1~2 题共用题干）

女性，22 岁，去某医院行拔牙术，注射麻药时，患者出现头晕、恶心、胸闷、四肢无力。查：血压 90/60mmHg，脉搏 65 次/分，面部及口唇苍白。

1. 该患者的诊断是

- A. 中毒
- B. 过敏

- C. 晕厥
- D. 白血病
- E. 中风

2. 对该病人上述情况的正确处理是

- A. 立即送往急诊室
- B. 注射麻药完成后抢救
- C. 停止注药，立即抢救
- D. 继续注射，完成拔牙

E. 观察，暂不处理

正确答案：1.C 2.C

例题 7 (1~2 题共用题干)

某无牙颌患者，要求制作全口义齿修复。主诉：曾多次全口义齿修复，均不合适。检查发现：下颌牙槽嵴极度低平，口腔粘膜薄，舌体增大，下颌呈习惯性前伸，殆关系不稳定

1. 取印模时应注意

- A. 用解剖印模法
- B. 取功能性印模

C. 用石膏一次印模

D. 用有孔托盘

E. 舌侧托盘边缘加高

2. 确定殆关系时注意

- A. 采用患者的习惯位
- B. 利用旧义齿确定
- C. 帮助患者下颌后退
- D. 面下 1/3 的高度
- E. 殆骨的垂直关系

正确答案：1.B 2.C

四、B1 型题

B 型题为配伍题。B1 型题是标准配伍题，试题的形式为开始是 5 个备选答案，其后提出至少 2 道试题，要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案（见例题 8）。每个备选答案可以被选用 1 次、多次或不被选用。

例题 8 (1~5 题共用备选答案)

- A. 四环素牙
- B. 氟牙症
- C. 先天性梅毒牙
- D. 牙震荡
- E. 牙釉内陷

1. 微量元素摄入过多造成

2. 药物因素造成

3. 感染造成

4. 外伤造成

5. 牙发育异常造成

正确答案：1.B 2.A 3.C 4.D 5.E

口腔助理医师全真模拟试卷 (一)

第一单元

第一节

A1 型选择题 (1~49 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 欲使用 2% 碱性戊二醛杀灭手术器械上的乙型肝炎病毒，则至少应浸泡
 - A. 20 分钟以上
 - B. 15 分钟
 - C. 10 分钟
 - D. 2 分钟
 - E. 1 分钟
2. 用印模膏取印模时，浸泡并软化印模膏的水温为
 - A. 0℃
 - B. 30℃
 - C. 50℃
 - D. 70℃
 - E. 100℃
3. 关于口腔鳞状细胞癌，以下哪项是错误的
 - A. 是口腔中最常见的恶性肿瘤
 - B. 男性多于女性
 - C. 以口底鳞癌最多
 - D. 血道转移较少见
 - E. 口腔后部鳞癌较易转移
4. 具有高等学校医学专科学历，参加执业医师资格考试，应在医疗、预防、保健机构中试用期满
 - A. 6 个月
 - B. 18 个月
 - C. 一年
 - D. 二年
 - E. 三年
5. 正常人的开口度为
 - A. 3.7~4.5cm
 - B. 4.7~5.5cm
 - C. 2.7~3.5cm
 - D. 5.5~6.5cm
 - E. 1.5~2.5cm

6. 关于流行病学, 下列哪种说法是正确的

- A. 流行病学从基因水平认识疾病
- B. 流行病学从细胞水平认识疾病
- C. 流行病学从群体水平认识疾病
- D. 流行病学从个体水平认识疾病
- E. 流行病学从分子水平认识疾病

7. 检查邻面龋的可靠方法为

- A. 视诊
- B. 探诊
- C. 叩诊
- D. 温度测试
- E. X线片检查

8. 舌杆的宽度一般为

- A. 2mm
- B. 5mm
- C. 8mm
- D. 10mm
- E. 15mm

9. 牙石是

- A. 钙化的食物残渣
- B. 钙化的烟斑
- C. 钙化的脱落上皮细胞
- D. 钙化的菌斑
- E. 钙化的茶锈

10. 支托具有以下作用, 除了

- A. 抵抗龈向脱位
- B. 做间接固位体
- C. 抵抗殆向脱位
- D. 防止食物嵌塞
- E. 恢复咬合接触

11. 关于手术区的消毒和铺巾, 哪种说法是不正确的

- A. 消毒应从中心开始, 逐步向四周环绕涂布, 感染创口相反
- B. 与口腔相通的手术及多个术区可一并

消毒

C. 孔巾铺置法适用于门诊小手术

D. 三角形铺巾法适用于口腔、鼻、唇及颊部手术

E. 四边形铺巾法适用于腮腺区、颌下区、面部及涉及多部位的大型手术

12. 最早萌出的恒牙是

- A. 第一磨牙
- B. 第二双尖牙
- C. 侧切牙
- D. 尖牙
- E. 第一双尖牙

13. 卡环的支持作用是防止义齿

- A. 龈向脱位
- B. 侧向脱位
- C. 殆向脱位
- D. 颊舌向脱位
- E. 近远中间脱位

14. 制备窝洞中, 接近牙龈的部分称为

- A. 切壁
- B. 龈壁
- C. 近中壁
- D. 远中壁
- E. 颊侧壁

15. 成釉细胞瘤有以下临床表现, 除了

- A. 男性患者占绝大多数
- B. 渐进性颌骨膨大
- C. 按之有乒乓感
- D. X线可为单囊或多囊性透射影
- E. 肿瘤区牙齿移位、松动

16. 与牙周炎发生有关的修复体是

- A. 固定桥
- B. 充填体悬突
- C. 桩冠
- D. 全冠

E. 桩核冠

17. 牙髓电活力测验可以判断牙髓的

- A. 活力情况
- B. 病变性质
- C. 炎症程度
- D. 病变范围
- E. 病变预后

18. 乳牙患龋的高峰时期是

- A. 半岁 ~ 2.5 岁
- B. 3 ~ 4 岁
- C. 5 ~ 6 岁
- D. 7 ~ 8 岁
- E. 9 ~ 10 岁

19. 舌杆上缘应至少离开下颌前牙舌侧龈缘

- A. 1 ~ 2mm
- B. 3 ~ 4mm
- C. 5 ~ 6mm
- D. 7 ~ 8mm
- E. 9 ~ 10mm

20. 右侧上颌第二前磨牙的记录方式为

- A. 5
- B. V
- C. 5
- D. 35
- E. 5

21. WHO 制定的 2010 年口腔健康目标中 12 岁儿童恒牙龋均不超过

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5
- E. 3

22. 口干症状见于

- A. 白斑

B. 复发性口腔溃疡

C. 白色念珠菌病

D. 球菌性口炎

E. 扁平苔藓

23. 为了牙龈的健康, 全冠龈边缘最基本的要求是

- A. 应位于龈上
- B. 应位于龈沟内
- C. 应平齐牙龈
- D. 边缘要密合
- E. 选用凹形边缘

24. 下面有一项初级预防的概念是不对的

- A. 三级预防是修复治疗
- B. 二级预防包括恢复口腔功能
- C. 二级预防是“干预”性治疗
- D. 初级预防又称一级预防
- E. 窝沟封闭属于初级预防

25. 利多卡因一次最大用量为

- A. 5 ~ 10mg
- B. 50 ~ 100mg
- C. 300 ~ 400mg
- D. 800 ~ 1000mg
- E. 1500mg

26. 玻璃离子粘固粉充填时, 洞型要求除外

- A. 窝洞要有一定深度
- B. 洞缘可保留无基釉
- C. 洞缘要求做洞斜面
- D. 不必要求固位洞形
- E. 窝洞底可呈圆弧形

27. 含牙囊肿衬里上皮发生于

- A. 牙板上皮
- B. 缩余釉上皮
- C. 上皮根鞘剩余
- D. 沟内上皮
- E. 结合上皮

28. WHO 口腔健康目标 2010 年 65 ~ 74 岁的老年人无牙骀不超过

- A. 25%
- B. 20%
- C. 15%
- D. 10%
- E. 5%

29. 普鲁卡因过敏延迟反应常见的是

- A. 哮喘
- B. 荨麻疹
- C. 过敏性紫癜
- D. 血管神经性水肿
- E. 药疹

30. 义齿制作时, 填胶应在材料调和后的

- A. 湿砂期
- B. 粥样期
- C. 胶粘期
- D. 面团期
- E. 橡皮期

31. 口腔颌面外科手术止血方法中, 最基本、最常用的方法是

- A. 压迫止血
- B. 阻断止血
- C. 热凝止血
- D. 降压止血
- E. 钳夹、结扎止血

32. 原发性咬合创伤的形成是因为

- A. 牙周支持力不足
- B. 骀力过大
- C. 牙槽骨吸收
- D. 牙龈炎症
- E. 牙周袋形成

33. 患有下列疾病的患者在拔牙前后应给予抗生素以预防并发症, 但不包括

- A. 糖尿病

B. 先天性心脏病

C. 慢性肝炎

D. 风湿性心脏病

E. 曾做过房间隔缺损修补术的患者

34. 产生药物副作用是由于

- A. 剂量过大
- B. 用药时间过久
- C. 药物在体内蓄积
- D. 药物作用的选择性低
- E. 机体对药物的敏感性高

35. 新斯的明最强的作用是

- A. 兴奋胃肠道平滑肌
- B. 兴奋膀胱平滑肌
- C. 兴奋骨骼肌
- D. 缩小瞳孔
- E. 增加腺体分泌

36. 窝洞制备的原则如下, 除外

- A. 保护牙髓
- B. 制备固位形
- C. 去净龋坏组织
- D. 保留健康组织
- E. 不考虑抗力形

37. 局麻注射过程中, 为避免血肿, 下列措施中哪项是错误的

- A. 注射麻药时缓慢推注
- B. 针头不应有倒钩
- C. 深部注射时, 避免进针过深
- D. 尽量使用低浓度的局麻药
- E. 避免反复多方向穿刺

38. 恒牙最易发生龋齿的部位是

- A. 咬合面点隙和裂沟
- B. 牙齿邻面和牙颈部
- C. 扭转和重叠的牙面
- D. 釉质发育缺陷牙面
- E. 不易被清洁的牙面

39. 以下何种情况不属于拔牙适应证
- A. 恶性肿瘤放射治疗前口内的残根
 - B. 腭侧错位牙, 食物嵌塞, 形成深龋
 - C. 滞留乳牙, 无松动, 恒牙先天缺失
 - D. 下磨牙远中、合面、颊面大面积龋坏达龈下 2mm
 - E. 上前冠折 1/3 合并根折

40. 关于酶活性中心的叙述, 正确的是
- A. 所有的酶都有活性中心
 - B. 所有酶的活性中心都有辅酶
 - C. 所有酶的活性中心都有金属离子
 - D. 酶的必需基团都位于活性中心之内
 - E. 所有的抑制剂都是作用于活性中心

41. 下列关于医师的良心中, 错误的是
- A. 是一种道德责任感和自我评价能力
 - B. 是对他人医疗行为的评价能力
 - C. 是医德情感的深化
 - D. 是对履行道德义务的满足和欣慰
 - E. 是对没有履行道德义务的惭愧和悔恨

42. 关于创口的愈合过程, 哪种说法是错误的
- A. 手术后的创口, 在其两缘的缝隙间, 首先出现炎症反应
 - B. 组织细胞和成纤维细胞渗出血凝块, 连接两侧创缘
 - C. 增生的毛细血管长入血凝块, 供应所需营养
 - D. 瘢痕由结缔组织和上皮组成
 - E. 上皮组织既有基底膜和上皮细胞, 也有真皮结构和皮肤附件

43. 龋齿按病变程度的分类为
- A. 开放龋和隐匿龋
 - B. 浅龋、中龋和深龋
 - C. 咬合面龋和邻面龋
 - D. 原发性龋和继发性龋
 - E. 急性、慢性和静止性龋

44. 下面关于审慎的说法中, 错误的是
- A. 它是一种道德品质
 - B. 它是一种处事态度, 由个人的性格特点决定
 - C. 有利于医疗质量的提高, 并防止医疗差错事故
 - D. 有利于良好职业道德的培养
 - E. 可促使业务能力和技术水平提高

45. 形成垂直食物嵌塞最常见的原因是
- A. 邻面接触点不正常
 - B. 殆面均匀磨损
 - C. 食物溢出沟加深
 - D. 牙有畸形舌侧沟
 - E. 牙龈退缩

46. 一侧舌神经阻滞麻醉后所麻醉的区域是
- A. 同侧舌后 1/3
 - B. 整个舌体
 - C. 同侧舌前 2/3
 - D. 对侧舌前 2/3
 - E. 舌前 2/3

47. 钉洞固位形不可设计在
- A. 后牙牙尖处
 - B. 前牙舌面窝近舌隆突处
 - C. 前牙舌面切嵴与近远中边缘嵴交界处
 - D. 后牙牙尖间的沟窝处
 - E. 死髓牙的面

48. 人体活动主要的直接供能物质是
- A. GTP
 - B. ATP
 - C. 葡萄糖
 - D. 脂肪酸
 - E. 磷酸肌酸

49. 普鲁卡因的特点中哪项是错误的
- A. 一次最大用量 1g
 - B. 毒性和副作用小

- C. 偶尔发生过敏反应
- D. 表面渗透性很强

E. 麻醉持续时间很长

A2 型选择题 (50 ~ 60 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

50. 患者 6 个月前,上前牙小洞在外院复合树脂充填后一直有冷热疼。近一周疼痛加重,不敢咬合。查:右上中切牙近中舌侧充填体完好,叩诊(++),扪痛(+),牙髓无活力。该患者牙的诊断是
- A. 牙髓坏死
 - B. 急性牙髓炎
 - C. 慢性牙髓炎
 - D. 急性根尖炎
 - E. 可复性牙髓炎
51. 患儿,男性,8 个月,舌系带溃烂 1 个月,查 I—I 萌出,舌系带两侧可见 1.0cm×0.8cm 大小的溃疡,溃疡增殖,边缘高起外翻,有灰白色伪膜。触较硬。此患儿可能诊断为
- A. 李-弗病
 - B. 贝氏口疮
 - C. 腺周口疮
 - D. 褥疮性溃疡
 - E. 鹅口疮
52. 一个 7 岁的女孩,口内检查发现下颌后部牙槽骨上有两个形态似磨牙的牙齿存在:为鉴别是否有恒磨牙,正确的说法是
- A. 恒牙的牙颈嵴突出,与牙根分界清楚
 - B. 恒牙牙冠颜色偏白
 - C. 下颌第二乳磨牙的近中颊尖,远中颊尖及远中尖的大小基本相等
 - D. 下颌第一恒磨牙的外形呈斜方形
 - E. 暂时第一恒磨牙是否有恒牙,要到一定年龄后才能分出区别。
53. 男性 65 岁,7 残根,有冠心病史,近两年来未发作,测血压 21.3/12.1kPa (160/90mmHg),在拔 7 时麻醉首选药是
- A. 1%地卡因
 - B. 2%地卡因
 - C. 2%利多卡因
 - D. 2%含肾普鲁卡因
 - E. 1%含肾普鲁卡因
54. 某男性病人,40 岁。患病后去医院检查,被诊断患了性传播疾病。接受治疗后病情好转。医生将此事告诉给病人单位的同事,同事知道此事后断绝了和该病人的许多来往。此现象表明病人的哪项权利受到侵犯
- A. 免除健康时的社会责任
 - B. 病人的经济利益
 - C. 享受医疗服务
 - D. 被尊重和保护个人隐私的权利
 - E. 被尊重和被理解的权利
55. 李某为某医学院专科毕业生,他可以
- A. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业医师资格考试
 - B. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年,参加执业助理医师资格考试
 - C. 在医疗、预防、保健机构中试用期满

- 二年，参加执业助理医师资格考试
- D. 取得执业助理医师执业证书后，在医疗、预防、保健机构中工作满一年，参加执业医师资格考试
- E. 取得执业助理医师执业证书后，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业医师资格考试

56. 5岁男孩右上乳中切牙冠折露髓2小时就诊。叩(+)，松动1度。治疗方法是

- A. 直接盖髓
- B. 冠髓切断
- C. 根管治疗
- D. 干髓术
- E. 拔除

57. 86521|14568 缺失，余留牙正常。可摘局部义齿基牙应选择

- A. 43|37
- B. 4|7
- C. 74|7
- D. 74|37
- E. 73|3

58. 孕妇感染风疹后引起胎儿畸形，这种传

播病原体的方式被称为

- A. 水平传播
- B. 家庭传播
- C. 血源性传播
- D. 垂直传播
- E. 间接传播

59. 某小学有12岁学生120人，根据WHO的2010年口腔健康目标，龋齿总数不应超过

- A. 100颗
- B. 120颗
- C. 140颗
- D. 160颗
- E. 180颗

60. 患者男19岁，颞部外伤9小时，急诊时拍曲面断层发现下颌正中及双侧髁状突骨折，如欲进一步观察髁状突骨折内外方向移位情况，应投照

- A. 许勒位
- B. 经咽侧位
- C. 下颌骨开口后前位
- D. 曲面体层
- E. 下颌骨侧位

B1型选择题 (61~73题)

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(61~62题共用备选答案)

- A. 描述性研究
- B. 队列研究
- C. 病例对照研究
- D. 实验性研究

E. 理论性研究

61. 主要根据暴露状况来抽取样本的研究方法是

62. 能随机分配受试者进入研究组的研究方法是

(63~66 题共用备选答案)

- A. 口腔健康咨询
- B. 捷径调查
- C. 问卷调查
- D. 制定口腔保健计划
- E. 口腔预防保健措施

63. 开展社区口腔保健应首先

64. 为了解口腔健康状况应进行

65. 社区卫生宣传活动可通过

66. 了解人群口腔卫生习惯可通过

(67~69 共用备选答案)

- A. 上颌中切牙
- B. 上颌前磨牙
- C. 上颌第一恒磨牙
- D. 下颌中切牙

E. 下颌近中阻生智齿

67. 拔除过程中可使用旋转力的牙齿是

68. 需要纵劈牙冠才能顺利拔除的牙齿是

69. 如为残根残冠常需分根后拔除的牙齿是

(70~73 题共用备选答案)

- A. 刃状边缘
- B. 凿状边缘
- C. 凹形边缘
- D. 肩台形边缘
- E. 斜面形边缘

70. 锤造全冠一般为

71. 铸造金属全冠一般为

72. 金属烤瓷冠的唇侧一般为

73. 金属烤瓷冠的舌侧一般为

A3/A4 型选择题 (74~80 题)

答题说明

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(74~76 题共用题干)

患者，男，36 岁，因半年来右下第一磨牙咬合面深龋洞不能咬物而就诊。已做一次垫底银汞充填后一周，一天前出现自发痛，冷热痛持续，不能咬物。查：右下第一磨牙咬合面充填体完整，叩痛 (+)，冷测引起剧痛。

74. 该患牙充填后出现的问题是

- A. 牙本质过敏症
- B. 可复性牙髓炎
- C. 急性牙髓炎
- D. 慢性牙髓炎急性发作
- E. 急性根尖炎

75. 其原因最可能为

- A. 备洞对牙髓刺激
- B. 充填时垫底不良

- C. 充填后流电作用
- D. 充填前诊断错误
- E. 充填材料的刺激

76. 该患牙的处理应为

- A. 调磨后观察
- B. 改垫底材料
- C. 改充填材料
- D. 做安抚治疗
- E. 行牙髓治疗

(77~78 题共用题干)

患儿 6 岁, 右下后牙肿痛两日。检查:

D 远中殆面龋洞较深, 叩 (+), 松动 2 度, 颊侧牙龈处有 $0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm}$ 脓肿。X 线示根吸收 1/3, 根分歧有低密度影。

77. 本病例 D 诊断是

- A. 深龋
- B. 慢性牙髓炎急性发作
- C. 牙周脓肿
- D. 慢性根尖炎急性发作
- E. 根吸收

78. D 的初诊治疗方案是

- A. 切开引流置引流条
- B. 拔除, 口服消炎药
- C. 开髓封失活剂做根管治疗
- D. 开髓开放脓肿切开
- E. 拔髓根管开放, 脓肿切开

(79~80 题共用题干)

患者女性 52 岁, 拟一次性拔除口内多个残冠残根, 注射局麻药后患者出现全身麻木、心悸、胸闷, 表情肌及全身抽搐, 随即出现脉细而弱、血压下降、神志模糊。

79. 上述症状可诊断为

- A. 医源性感染
- B. 癔病
- C. 肾上腺素反应
- D. 局麻药物中毒
- E. 晕厥

80. 针对上述情况采取的抢救原则中, 哪项是错误的

- A. 降压
- B. 给氧
- C. 输液
- D. 镇静
- E. 应用激素

第二节

A1 型选择题 (81~129 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

81. 颌面部危险三角区的化脓性感染处理不当最易引起的并发症是

- A. 颌面部多间隙感染
- B. 海绵窦血栓性静脉炎

- C. 肝脓肿
- D. 上颌骨髓炎
- E. 唇坏死缺损