

新撰處方

41062

版權所有 ★ 不准翻印

學方處撰新

精裝本定價 16,000 元

普及本定價 10,000 元

原著者 日本 黑田昌惠
本 多芳太郎

翻譯者 牟鴻彝醫師

出版者 北新書局
上海復興中路五四一號

發行者 通聯書店
上海九江路二九五號

印刷者 大新印刷廠

分銷處 北京 北新書局
開封

★ 一九五一年一月增訂一版
一九五三年九月六版 ★

例 言

- 一 本書是臨床醫家處方之南針，又是一小藥治學、專供日常座右便覽之用，故以實地應用及簡便爲旨，選錄各種藥劑都是常用的有效藥品，各處方例，完全根據吾人實際上的經驗。
- 一 摘錄有各藥劑的藥理，醫治效用，副作用，適應症，禁忌症，及調劑法等的大意。以備忘記時參考應用，又於各劑之末設有注意欄及備考欄，詳記緊要的事項。
- 一 各處方例只揭其主要的，但附有應有配合藥品和禁忌，可隨機配合。又在各劑之後，均附註原文，以期處方、藥名、及用量的正確，而便覽者對照，至於略省的原文，用有略點（・）標明之。
- 一 劇藥及毒藥名一一記入極量，更爲便利記憶起見，特反覆記載，又在主要藥品的後面，揭有小兒用量。
- 一 藥品數量等皆根據普通處方例，皆用米突法。
- 一 卷末揭載有第四改正日本藥局方毒藥劇藥極量

表、藥室常備藥品表、及藥品貯藏法注意表、

編者識。

增訂弁言

本書初版是在民國十八年發行，當時印行五千本，不久就售完了，繼因一二八滬戰爆發，不幸本書紙版毀滅，以致不能重版，雖有很多的臨床醫家來函訊問，但那時因北新書局偏重於教科書，未加重視，有負函訊者的雅意，這是編譯者十分抱歉的！

至解放以來，應用技術科學書籍，需要切迫，北新書局李經理小峯，囑我將本書增訂。不過近十幾年以來，醫學進步，尤以新藥層出不窮，從前認為豐富的，現在若不加以澈底的增補，決不適於今日的需要。所以將新藥新方盡量增入，俾本書內容能與時代並進，不致落伍，茲將增訂的情形列舉如下：

1. 原書四十一章，增補後加入『化學治療劑』、『維生素』、『抗生素』、『菌苗及血清製劑』、『急性中毒的處置』五章，共計四十六章。
2. 其他各章亦個別增入新藥；又在附錄中增加『處方及處方箋』、『處方箋中服法說明』

『處方應用拉丁略語註解』『計算及記法』等項。

3. 初版係用文言，增訂後全用語體文，以便廣大的醫務工作人員普遍採用。
4. 初版時因為藥名未經審定，大多採用日本藥名；增訂本改用審訂名稱，以資統一。
5. 排印清楚經我校對數次，但遺漏仍難避免，尚望讀者指教，我願虛心接受批評。

一九五〇年十一月廿三日

編譯者於診所

二次增訂版前言

前月接到一位讀者來信說：本書內容適於臨床應用，但是遺漏‘菌苗及血清製劑’一章，要求補編排入，我十分感謝他的意見，所以趁第五版即將付印時，特補編‘疫苗、菌苗、類毒素及抗毒素的應用’，同時又加入‘臨床對症特效藥’表格一章，並將治療結核病新藥異菸肼劑插入第六章肺癆劑之末。以後仍請讀者多加批評，以便隨時增刪。

不過本書是一本手冊，因篇幅所限，不能將新藥盡量加入，可參閱本版‘最新實用藥物學’。

編譯者於上海

1952, 12。

目 次

一	清涼劑 (Temperantia).....	1
二	飽和劑 (Saturationes)	5
三	解熱劑 (Antipyretica)	9
	(附記)瘧疾新藥.....	34
四	強心劑 (Cardiotonica)	35
五	祛痰劑 (Expectorantia)	50
六	肺癆劑 (Antiphthisica)	60
	(附)派斯 P · A · S	68
	鏈黴素 (Streptomycin)	
	異菸酸醯肼 (Isonicotin Acid Hydrazide)	
七	吸入劑 (Inhalans).....	72
八	含嗽劑 (Gurgelwasser, Gargarisma.)	75
九	鎮痛劑 (Anodyna, Analgetica)	77
一〇	鎮靜劑 (Sedativa)	90
一一	催眠劑 (Hypnotica, Schlafmittel.)	96
一二	吸入麻醉劑、Inhalations-Anaesthetica, Narcotica. ;	104
一三	局部麻醉劑 (Lokalanaesthetica.)	107
一四	注射劑 (Injektiones)	114

一五	興奮劑(Analeptica, Excitantia.)	121
一六	吐劑(Emetica, Brechmittel.)	124
一七	下劑(Cathartica, Abführmittel.)	129
一八	利尿劑(Diuretica, Harntreibendes Mittel.)	150
一九	尿防腐劑(Harn-Antseptica)	163
	(附)尿防腐消毒新藥處方	168
二〇	發汗劑(Diaphoretica)	174
二一	止汗劑(Anidrotica)	177
二二	鎮吐劑(Antiemetica)	180
二三	止痢劑(Antidiarrhoeica, Obstipantia)	184
二四	止血劑(Haemostyptica, Blutstillendes Mittel.)	195
二五	健胃劑(Stomachica)	205
二六	強壯劑(Roborantia)	221
二七	驅梅毒劑(Antisyphilitica)	233
二八	驅蟲劑(Anthelminthica, Wurmbtreibendes Mittel.)	248
二九	通利灌腸劑(Eröffnende oder Entleerende klystiere, Clysmata evacuantia)	259
三〇	腸洗劑(Enteroklyse, Mittel zur Darmspülung)	261
三一	滋養灌腸劑(Clysmata nutritiva,	

	Narkytische.)	262
三二	膀胱洗滌劑 (Lotiones vesic. urin., Mittel zur Blasenspülung.)	266
三三	眼科用藥 (Ophthalmica, Augenmittel.)	268
三四	婦科用藥 (Gynaekologisches Mittel.)	274
三五	外科用藥 (Chirurgisches Mittel.)	280
三六	膏藥 (Unguenta, Salbenmittel.)	282
三七	撒布藥 (Pulvis adpersorii s. crinalis, Streupulver.)	289
三八	塗布藥 (Bepinselungsmittel, Guttac Pro usum externum)	290
三九	粘膜塗布藥 (Bepinselungsmittel der Schleimhäute, Frictiones mucosae)	292
四〇	坐藥 (Suppositoria)	294
四一	尿道洗滌藥 (Mittel zur Urethralspülung, Lotiones urethrales)	297
四二	青黴素 (Penicillin)	298
四三	化學治療劑	300
四四	腺體製劑	320
四五	維生素劑	326
四六	急性中毒的處置	338
四七	疫苗、菌苗、類毒素及抗毒素的應用	358
四八	臨床對症特效藥表	367

附錄一

小兒藥物用量算出表	376
-----------------	-----

附錄二

毒劇藥極量表	377
藥局常應貯藏的藥品表	384
藥品貯藏法注意表	386
倍與%	390
配合禁忌一覽表	391

附錄三

(一)處方及處方箋	402
(二)處方箋中服法用語	404
(三)處方箋用語略語註解	407
計量及記法	412

索引	415
----------	-----

一 清涼劑 (Temperantia)

○清涼劑有清涼，止渴，消化的作用。

第一方 (鹽酸清涼水) (稀鹽酸清涼水)

稀鹽酸	Acidi hydrochlorici diluti	0.8
純糖漿	Sirupi simplici	10.0
溜水	Aquae destillatae	100.0

上爲一日量，三回分服。S. Täglich 3 mal zu nehmen.

○此處方如稀鹽酸爲1.0。則酸性過強。(藥局方爲0.5)。

○稀鹽酸爲鹽酸一分，蒸溜水二分和成。

○稀鹽酸使用豫先製成十倍用者爲便。

○所謂清涼水 (Limonade) 者，即含有糖分的酸性飲料的通稱。

○純糖漿即六五分的白糖，溶解於三五分的熱蒸溜水內而成。

○純糖漿先加蒸溜水稀釋後使用，較爲經濟。(通

常一比糖漿內，加入溜水 100.0) (夏季注意)

第二方 ($\frac{1}{2}$ 鹽酸清涼水) ($\frac{1}{2}$ 稀鹽酸清涼水)

稀鹽酸 Acid. hydrochlorici diluti	0.4
純糖漿 Sirup simpl.	10.0
溜水 Aq. destillat.	100.0

○主用於小兒，視年齡的大小，而用適當的分量。

【應用配合藥品】 (第一方)

- 苦味酊 (Tinctura amara)
- 胃液素 (Pepsinum)
- 含糖胃液素 (Pepsinum saccharatum)
- 梔那酊 (Tinctura chinae) (梔那劑與醋酸鉀液，硫酸鎂，法列水兒，禁忌配合。亦與赤酒禁忌，但配以酸質，則無妨害。)

●杏仁水 (極量一回 2.0 一日 6.0) 。 (Aq. pruni armeniaca) (Aqua Lauro-Cerasi)

●莨菪酊 (極量一回 1.0, 一日 3.0) 。 (Tinctura Scopoliae)

●莨菪浸膏 (Extractum Scopoliae) (極量一回 0.05, 一日 0.15) (使用豫製成五倍用至十倍用的乾燥膏，較為便利) 。

●硫酸鎂 (Magnesium sulfurium) (硫酸鎂與梔那劑禁忌)

●赤酒 (Vinum rubrum) (赤酒與梔那劑禁忌)

但加酸配合，即無妨害。）

●毒毛旋花酊 (Tinctura Strophanthi) (極量一回 0.5, 一日 1.5)

●狄茄林 (Digalen)

●龐吉他耳 (pangital)

●狄吉他民 (Digi'amin)

●番木鱧酊 (極量一回 1.0, 一日 2.0) (Tinctura Strychni)

●桂皮酊 (Tinctura Cinnamomi)

●橙皮酊 (Tinctura Aurantii Corticis)

●芳香酊 (Tinctura aromatica)

●薄荷水 (Aqua Menthae)

●間苯二酚 (Resorcinum)

●美鼠李皮浸膏 (Extractum Cascarae Segradae fluidum)

●麥角流浸膏 (極量一回 0.3, 一日 1.0) (Extractum Secalis cornuti)

●阿片酊 (極量一回 1.5, 一日 5.0) (Tinctura Opii)

●治癰莖皮流浸膏 (Extractum Condurango fluidum)

●覆盆子糖漿 (Sirupus Rubi Ideai)

●安替正林 (Antipyrinum) (極量一回 1.0, 一日

3.9)

● 正拉米董 (極量一回 0.3, 一日 1.0) (Pyramidonum)

● 阿斯尼林 (Aspirin)

● 俄波尼林 (Opopirin)

● 鱗片醋基水楊酸 (Acidum acetylsalicylicum)

● 鹽酸規寧 (Chininum hydrochloricum) (須多加純糖漿)

備考

△ 碘化鉀, 溴化鉀, 醋酸鉀, 水楊酸鈉, Brocin, 大黃浸及大黃酊等, 均與酸性配合禁忌。

▲ 消化不良的時候多用稀鹽酸, 一歲以下的乳兒, 不宜飲用這種酸味飲料, 普通乳兒胃酸充足者, 亦不宜與以酸性劑, 且須要時常投以重碳酸鈉水, (重碳酸鈉水以 0.5 至 1.0% 為適量)

△ 其他各種清涼水 (Limonade)

▲ 0.5% 枸橼酸清涼水

▲ 0.5% 酒石酸清涼水

▲ 1% 稀磷酸清涼水

▲ 0.5% 稀硫酸清涼水 (有止血作用)

▲ 1% 乳酸清涼水 (對於下痢有制瀉作用)

△ 稀磷酸 (磷酸 1 ·· 蒸溜水 1)

△ 稀硫酸 (硫酸 1 ·· 蒸溜水 9)

○次列處方亦可作清涼劑用。

重酒石酸鉀 <i>Cremor Tartari</i>	1.5—5.0
純糖漿 <i>Sirup simplicis</i>	10.0
溜水 <i>Aq. destillatae</i>	100.0

右一日量，三回分服，(用時振盪) *S. Taglich*
3 mal zu nehmen.

【應用配合藥品】

- 苦味酊 (*Tinctura amara*)
- 洋地黄劑 (洋地黄酊 (*Tinctura Digitalis*) (極量一回1.5, 一日5.0))
- 醋酸鉀液 (*Liquor kalii acetici*)
- 芳香酊 (*Tinctura aromatica*)
- 橙皮酊 (*Tinctura Aurantii corticis*)
- 薄荷水 (*Aqua Menthae*)
- 毒毛旋花酊 (*Tinctura Strophanthi*) (極量一回0.5, 一日1.5)

二 飽 和 劑 (*Saturationes*)

○飽和劑有矯味，鎮吐，和利尿的作用。

第一方 (攝爾特水 Selterswasser)

酒石酸 <i>Acidi Tartarici</i>	1.5
重碳酸鈉 <i>Natrii bicarbonici</i>	2.0
純糖漿 <i>Sirup. simplicis</i>	10.0
溜水 <i>Aquae destillatae</i>	100.0

上爲一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

第二方 (無糖漿 Selterswasser)

酒石酸 <i>Acidi tartarici</i>	1.5
重碳酸鈉 <i>Natrii bicarbonici</i>	2.0
溜水 <i>Aq. destillatae</i>	100.0

上爲一日量,三回分服 S. Täglich 3 mal zu nehmen.

第三方 (美味 Selterswasser)

枸橼酸 <i>Acidi citrici</i>	1.8
重碳酸鈉 <i>Natrii bicarbonici</i>	2.0
純糖漿 <i>Sirup. simplicis</i>	10.0
溜水 <i>Aq. destillatae</i>	100.0

上爲一日量,三回分服, S. Täglich 3 mal zu nehmen.

各種 Selterswasser 對於小兒的用量,隨年齡大小而用適量。(重碳酸鈉多係結晶,可細挫後使用)

【應用配合藥品】(第一方)