

卫生部部属高等医学院校暨科研机构

研究生入学考试试题汇编

第十分册

(临床医学四)

THE ENTRANCE
EXAMINATION
QUESTIONS FOR
GRADUATE STUDENTS

1979—1984

中华人民共和国卫生部科学教育司编

卫生部部属高等医学院校暨科研机构
研究生入学考试试题汇编

(第十册)

卫生部科学教育司 编
卫生部科学教育司 出版
中国医科大学研究生处 发行
沈阳市第十印刷厂 印刷

787×1092毫米16开本 8.5印张 418千字
1985年10月 第1版 第1次印刷
印数：1~15,000

编 辑 说 明

为了交流经验，积累资料，促进医学门类研究生教育研究工作的开展，我们编辑了这套《研究生入学考试试题汇编》，本汇编收集了卫生部所属四川医学院、西安医学院、武汉医学院、湖南医学院、中山医学院、上海第一医学院、山东医学院、中国医学科学院中国首都医科大学、北京医学院、中国医科大学、白求恩医科大学、广州中医学院、北京中医学院、中医研究院共十四所高等医学院校和医学科学研究所自1979年以来的研究生入学考试试题。内容包括政治理论、外语、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、综合知识及医预知识等共十五个分册。供各医学教育研究单位和研究生招生机构的教学人员、科学研究人员、各高等医学院校的师生和有关医务人员查阅参考。

本书目录按单位和年份顺序排列，各分册内容见后。除个别错漏字符外，一般未作改动，以保持历史原貌。由于水平有限，不当之处，欢迎指正。

本书的编辑工作得到卫生部直属医学院校、科研机构及有关方面的大力支持，中国医科大学研究生处为本书的编辑出版作了大量工作。谨此致谢。

编 者

一九八四年十二月于北京

研究生入学考试试题汇编各分册内容

第一分册：政治理论、外语（英、日）、综合试题

第二分册：基础医学一：医学生物学、医学遗传学

第三分册：基础医学二：人体解剖学、组织学与胚胎学

第四分册：基础医学三：生理学、生物化学、生物物理学、药理学

第五分册：基础医学四：微生物学与免疫学、寄生虫学

第六分册：基础医学五：病理生理学、病理解剖学、法医学、医学史、放射医学

第七分册：临床医学一：内科学、神经病学、精神病学、传染病学、临床检验与诊断学

第八分册：临床医学二：外科学、麻醉学、肿瘤学

第九分册：临床医学三：妇产科学、儿科学、围产医学、计划生育医学

第十分册：临床医学四：眼科学、耳鼻咽喉科学、口腔科学、皮肤病学、放射诊断学、放射治疗学、核医学、理疗学、运动医学

第十一分册：公共卫生与预防医学、流行病学、环境卫生学（含卫生工程学）、营养学、食品卫生学、儿少卫生学、卫生统计学、劳动卫生与职业病学、卫生化学、卫生微生物学、毒理学、社会医学与卫生事业管理

第十二分册：中医和中西医结合：中医基础理论、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匮要略、温病、各家学说、中医诊断学、中医内科学、中医外科学（含皮肤、肛肠）、中医妇科学、中医儿科学、中医眼科学、中医耳鼻咽喉科学、中医骨伤科学（含推拿）、针灸学、中医文献、医古文、中医学史、中西医结合基础、中西医结合临床

第十三分册：药学：药物化学、药剂学、药理学、中药学、生药学、药物分析学、生物药物学（含生物及生化制品）、微生物药物学、制药工程学

第十四分册：医预学科一：无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、医用化学

第十五分册：医预学科二：初等数学、高等数学、数学分析、概率论与数理统计学、物理学、原子核物理学基础、医用物理学、电路原理、电子学（含医用及工业电子）、模拟数字电路、数字信号处理、计算机基础、心理学及心理基础、动物学与植物学、汉语

目 录

四川医学院

1980年	耳鼻咽喉科学试题	1	口腔科学试题	1
	皮肤病学试题	8	放射诊断学试题	9
1981年	口腔科学试题	10		
1982年	眼科学试题	15	耳鼻咽喉科学试题	15
	口腔科学试题	15	皮肤病学试题	18
	核医学试题	19		
1983年	眼科学试题	19	耳鼻咽喉科学试题	19
	口腔科学试题	21	皮肤病学试题	26
	放射诊断学试题	28	核医学试题	35
1984年	眼科学试题	35	耳鼻咽喉科学试题	35
	口腔科学试题	36	皮肤病学试题	41
	放射诊断学试题	43	核医学试题	50

西安医学院

1982年	口腔科学试题	54	皮肤病学试题	54
	放射诊断学试题	54	核医学试题	55
1983年	眼科学试题	55	耳鼻咽喉科学试题	56
	口腔科学试题	56	皮肤病学试题	57
	放射诊断学试题	57	核医学试题	57
1984年	眼科学试题	59	耳鼻咽喉科学试题	59
	口腔科学试题	60	皮肤病学试题	61
	放射诊断学试题	61	核医学试题	61

武汉医学院

1982年	眼科学试题	63	耳鼻咽喉科学试题	65
	放射诊断学试题	66	核医学试题	67
	理疗学试题	68		
1983年	眼科学试题	68	耳鼻咽喉科学试题	69
	皮肤病学试题	71	放射诊断学试题	71
	核医学试题	72		
1984年	眼科学试题	74	耳鼻咽喉科学试题	75
	皮肤病学试题	76	放射诊断学试题	76
	核医学试题	77	理疗学试题	77

湖南医学院

1982年	耳鼻咽喉科学试题	78	放射诊断学试题	82
1983年	眼科学试题	83	耳鼻咽喉科学试题	85
	口腔科学试题	93	皮肤病学试题	94
	放射诊断学试题	94		

1984年	眼科学试题	96	耳鼻咽喉科学试题	99
	皮肤病学试题	107	放射诊断学试题	109
中山医学院				
1982年	眼科学试题	112	口腔科学试题	112
	皮肤病学试题	118		
1983年	眼科学试题	119	口腔科学试题	119
	皮肤病学试题	120		
1984年	口腔科学试题	121	皮肤病学试题	121
	核医学试题	124		
上海第一医学院				
1982年	眼科学试题	125	耳鼻咽喉科学试题	126
	皮肤病学试题	126	放射诊断学试题	126
	核医学试题	126		
1983年	眼科学试题	127	皮肤病学试题	127
	放射诊断学试题	127	核医学试题	128
1984年	眼科学试题	129	耳鼻咽喉科学试题	130
	皮肤病学试题	131	放射诊断学试题	131
	核医学试题	133		
山东医学院				
1982年	眼科学试题	137	口腔科学试题	137
	放射诊断学试题	138	核医学试题	139
1983年	眼科学试题	139	耳鼻咽喉科学试题	139
	口腔科学试题	140	放射诊断学试题	141
	核医学试题	141		
1984年	眼科学试题	143	耳鼻咽喉科学试题	143
	口腔科学试题	144	放射诊断学试题	144
	核医学试题	145		
中国医学科学院中国首都医科大学				
1979年	眼科学试题	146	耳鼻咽喉科学试题	146
	口腔科学试题	146	皮肤病学试题	147
	放射诊断学试题	147	核医学试题	148
1981年	耳鼻咽喉科学试题	148	口腔科学试题	149
	皮肤病学试题	149	放射治疗学试题	150
1982年	眼科学试题	151	耳鼻咽喉科学试题	151
	口腔科学试题	151	放射诊断学试题	152
	核医学试题	152		
1983年	眼科学试题	153	口腔科学试题	153
	放射诊断学试题	154		
1984年	眼科学试题	155	耳鼻咽喉科学试题	155

口腔科学试题	156
放射诊断学试题	164
核医学试题	165

北京医学院

1982年	眼科学试题	167
	口腔科学试题	168
	放射诊断学试题	172
1983年	眼科学试题	174
	放射诊断学试题	180
1984年	眼科学试题	181
	口腔科学试题	183
	放射诊断学试题	196

皮肤病学试题	159
放射治疗学试题	164
理疗学超声试题	166

中国医科大学

1982年	眼科学试题	198
	放射诊断学试题	198
1983年	眼科学试题	199
	皮肤病学试题	201
	放射治疗学试题	206
1984年	耳鼻咽喉科学试题	206
	皮肤病学试题	210
	放射治疗学试题	216
	放射物理学试题	218

耳鼻咽喉科学试题	181
皮肤病学试题	191
核医学试题	197

耳鼻咽喉科学试题	198
----------	-----

耳鼻咽喉科学试题	200
放射诊断学试题	204

口腔科学试题	207
放射诊断学试题	213
放射防护学试题	217
放射生物学试题	219

白求恩医科大学

1982年	放射损伤基础试题	221
1983年	眼科学试题	221
	放射损伤学试题	222
	放射医学专业试题	223
1984年	眼科学试题	224
	口腔科学试题	238
	放射诊断学试题	248
	放射毒理学试题	255

放射损伤学试题	221
放射诊断学试题	222
放射生物学试题	223

耳鼻咽喉科学试题	228
皮肤病学试题	242
放射损伤学试题	252
放射生物学试题	258

中医研究院

1982年	眼科学试题	261
附：	多选题说明	261

四川医学院

一九八〇年耳鼻咽喉科学试题

- 一、试述鼻阻塞的病因与诊断 (10分)
- 二、简要介绍支气管镜检术的指征及反指征 (10分)
- 三、试述耳聋的病因及其鉴别诊断 (20分)
- 四、简述常用听力检查方法及其意义 (15分)
- 五、试述喉癌的诊断及治疗 (15分)
- 六、试述颈部包块的鉴别诊断 (15分)
- 七、名词解释: (15分)

1. 美尼尔氏病 (Meniere's disease) 2. 盖来氏试验 (Gelle's test)
3. 哮喘鸣 4. 中线肉芽肿 5. Lermoyez's Syndrome

一九八〇年口腔内科学专业试题

- 一、龋病如何预防？从哪几方面入手？与龋病发病因素有什么联系？
- 二、制备洞形的基本原则是什么？根据这些原则如何制备一后牙邻髓洞？
- 三、什么是创伤殆？如何治疗？
- 四、试列举常见的几种牙周病的鉴别诊断。
- 五、牙髓炎的发展过程及其临床表现如何？
- 六、常见的口腔粘膜斑纹病变有哪些？如何鉴别？

考《龋病学》研究生三、四题中选作一题，共五题，每题20分，共计100分。

考《牙周病学》研究生，一、二题中选作一题，共五题，每题20分，共计100分。

一九八〇年口腔内科学试题

(供口矫专业用)

- A 选择题：以下各题，在正确的答案号码前划一圆圈。
- 一、龋病发病的年龄规律是： 1. 乳牙期高于恒牙期， 2. 乳牙期上升，混合牙期平稳，恒牙期下降， 3. 乳牙期上升，混合牙期下降，恒牙期又上升。
 - 二、龋病发病主要与下列因素有关： 1. 遗传， 2. 全身抵抗力衰减， 3. 营养不良， 4. 细菌， 5. 菌斑， 6. 食物，特别是糖， 7. 牙齿发育不良， 8. 牙龄排列紊乱， 9. 唾液分泌增加， 10. 唾液分泌减少， 11. 全身烧热病。
 - 三、龋病病变的破坏方向一般是： 1. 由牙冠开始向牙根方向扩展， 2. 由牙釉质开始向牙本质方向扩展， 3. 由牙骨质开始向牙根方向扩展。
 - 四、龋病过程中发生的再矿化是： 1. 修复现象， 2. 破坏现象， 3. 破坏大于修复的现象

象，4. 修复大于破坏的现象。

五、龋病在牙面上的好发部位是：1. 龈面，2. 牙尖的斜面，3. 舌面，4. 切缘，5. 邻接面，6. 颊面，7. 牙颈部。

六、银汞合金的组成是：1. 银、锡、铜、锌，2. 银、锡、铜、汞，3. 银、锡、铜、锌、汞4. 银、铜、锌、铁、汞。

七、自凝充填塑胶的组成是：1. 甲基丙烯酸甲基酯的单体和聚合体，2. 甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸，3. 聚氯乙烯和甲基丙烯酸。

八、复合树脂中的填料起着：1. 减少体积变化，2. 提高韧性，3. 增加密度，4. 增加硬度，5. 提高抗压性能的作用。

九、磷酸锌粘固粉的主要成分有：1. 三氧化二铝，2. 氧化锌，3. 硫酸钙，4. 正磷酸5. 焦磷酸。

十、丁香油氧化锌粘固粉的用途是：1. 封洞，2. 永久充填，3. 双层垫底，4. 安抚镇痛。

十一、充填时垫底的用意是：1. 增强抗力，2. 保护牙髓，3. 隔绝外界刺激，4. 节约原材料。

十二、治疗深龋时应注意：1. 根尖周情况，2. 保护牙龈，3. 保护牙髓，4. 牙髓状态及其反应。

十三、急性浆液性牙髓炎的疼痛特点是：1. 早上痛晚上不痛，2. 晚上痛加剧，3. 热刺激痛，4. 冷刺激痛。

十四、慢性牙髓炎有：1. 剧烈镇压痛，2. 轻微钝痛，3. 搏动性痛。

十五、牙齿变色一般是：1. 可治疗的，2. 不可治疗的，3. 部分可治疗的。

十六、作完干髓术后牙齿仍然痛，是因为：1. 治疗不彻底，2. 牙周围神经敏感，3. 残髓炎。

十七、保留活牙髓的优点是：1. 牙齿有活力，可以担负正常功能，不易破裂，2. 牙齿稳固性好，3. 不易产生继发龋。

十八、亚砷酸作牙髓的失活剂，其优点是：1. 安全，2. 失活快，3. 无夹杂症。

十九、用亚砷酸失活牙髓时，一般需要1. 一星期，2. 两星期，3. 四、五天，4. 一、二天才能完全失活。

二十、三聚甲醛失活剂的优点是：1. 较安全，2. 可用于邻殆洞，3. 止痛，4. 不使牙变色。

B 填充题：

一、牙本质龋的病变分做以下几层，由外向内是：_____，_____，_____，
和_____。

二、龋病在恒牙列中的好发牙不同于乳牙列者是_____，共同点是_____。

三、静止龋常发生在下列情况：_____，_____。

四、继发龋产生的原因有：_____，_____，_____。

五、在临幊上区别中龋和深龋的要点是：_____，_____。

六、一个咬合面洞的固位形要求是：_____，_____。

七、一个咬合面洞的抗力形要求是：_____，_____。

- 八、一个邻猞洞的固位形要求是：_____，_____，_____，_____。
- 九、一个邻猞洞的抗力形要求是：_____，_____，_____，_____，_____。
- 十、造成斑釉的原因是_____。
- 十一、牙齿变色的原因是_____，_____，_____，_____，_____。
- 十二、去髓术与根管治疗术的区别是：_____，_____。
- 十三、急性根尖周炎的应急处理是：_____，_____，_____，_____。
- 十四、根尖切除术适用于：_____，_____。
- 十五、引起垂直性食物嵌塞的原因是：_____，_____，_____，_____。
- 十六、点磨法的三原则是：_____，_____，_____。
- 十七、引起缘龈尖的原因是：_____，_____，_____，_____。
- 十八、牙周变性的临床特点是：_____，_____，_____。
- 十九、牙周萎缩的类型有：_____，_____，_____，_____。
- 二十、作刮治术时，使用器械的注意要点是：_____，_____。

C 解释：

- 一、酸蚀 二、透明牙本质 三、抗力形 四、斑釉 五、楔状缺损
六、牙石 七、早接触点 八、沟纹舌 九、雪口 十、科周袋

以上各题每题2分，共计50题，100分。

一九八〇年口腔矫形学专业试题

- 一、铸造3/4冠与铸造全冠修复体的固位力依靠些什么？（20分）
- 二、试述固定义齿修复的适应症。（20分）
- 三、试述牙列缺失后的组织改变。（20分）
- 四、错猞畸形矫治后为什么需要保持？（20分）
- 五、病员×××，女性，25岁， $\frac{1|12}{}$ 缺失，下前牙切缘与上颌前牙腭侧粘膜间约有1mm间隙。余留牙正常，全身健康良好。可以用哪些修复方法？如何设计？（20分）
- 六、解释下列名词：（10分）
(1) 3/4冠 (2) 壳冠 (3) 半固定桥 (4) 垂直距离 (5) 息止殆间隙
- 七、填空白：（30分）
(1) 甲基丙烯酸甲酯塑料聚合时的分期为_____，_____。
(2) 功能性矫正器的主要部份为_____，_____。
(3) 引起错猞畸形的后天局部因素，是_____，_____，_____。
(4) 嵌体邻面预备的形式有_____，_____。
(5) 制作嵌体蜡型的方法有_____，_____，_____。
(6) 前牙3/4冠邻轴沟的方向为_____，后牙3/4冠邻轴沟的方向为_____。
(7) 桩冠的桩长为_____。
(8) 全冠的类型有_____，_____，_____，_____。
(9) 观测器分析杆与牙冠长轴平行时，在牙冠上划出的线为_____，当其与牙冠长

轴不平行时所划出的线为_____。

(10) 第二型观测线为基牙近缺隙侧到凹区_____，远离缺隙侧的倒凹区_____。

(11) 支点线或卡环线为_____的连线。

(12) Kennedy (肯氏) 对牙列缺损的分类是根据_____，_____。

(13) 后腭杆应位于_____。 (14) 下颌隆突多见于_____。

(15) 颞下颌关节功能障碍综合症的主要症状是_____，_____，_____，_____等。

说明：1. 从1—5题选作3题。 2. 报考正畸的考生第4题必作。

3. 报考修复(固定、活动)及颞颌关节的考生第5题必作。

4. 第6、7题全作。

一九八〇年口腔颌面外科学试题

一、请填写空白：(每个空白0.5分)

1. 的卡因的毒性比普鲁卡因大_____倍，它的麻醉作用、穿透力比普鲁卡因_____。

2. 普鲁卡因溶液作为局部麻醉，浸润麻醉时的浓度是_____，一次最大剂量是_____克。

3. 局麻药液中的血管收缩药物，常用的是肾上腺素，在浸润麻醉中其安全有效浓度是每_____毫升麻醉药液中加入肾上腺素_____毫克，对于有严重心脏病人应_____。

4. 在_____的部位进行麻醉药物注射，称为中枢性阻滞麻醉，在_____部位进行注射称为周围性阻滞麻醉。

5. 皮肤温度骤然降到_____度C时，局部感觉，首先是痛觉消失，从而达到暂时麻醉效果，常用药物是_____。

6. 枕下神经阻滞麻醉，可得到的麻醉区域是：同侧_____、_____、_____、_____、_____、_____，包括_____、_____。

7. 卵圆孔麻醉注射标志：以耳屏前约_____厘米，注射针与皮肤成_____度角度进针，深达_____厘米左右，针尖即触及_____。

8. 下牙槽神经阻滞麻醉，系将局麻药液注射于_____以麻醉下牙槽神经，因而又称_____麻醉。

9. 下牙槽神经麻醉法有时会发生麻醉失败，其原因大致为_____、_____、_____不正确。

10. 硫喷妥钠作为基础麻醉，对于婴儿用量是肌肉注射每公斤体重_____毫克硫喷妥钠，使用浓度应在_____以下。

11. 氯胺酮肌肉注射时可用_____浓度，按每公斤体重_____毫克给药，注射后_____分钟出现麻醉效果，一般可维持_____分钟。

12. 全身麻醉前用药，成人术前一小时皮下注射阿托品_____毫克或莨菪碱_____毫克，_____病人忌用。

13. 利多卡因(赛洛卡因)的毒性比普鲁卡因大_____倍，出现麻醉作用较普鲁卡因_____，麻醉效力较普鲁卡因大_____倍。

14. 局部麻醉药首先麻醉_____神经，其次_____神经，这是由于_____。

15. 局部麻醉药的麻醉作用主要决定于其_____。
16. 拔牙后继发性出血是因为_____、_____等局部因素引起的。
17. 干槽症的主要症状是_____、_____、_____。
18. 植牙术有_____，_____，_____三种。
19. 再植牙成功的主要条件是_____，_____，_____，_____。
20. 颌骨隆突多见于_____及_____。
21. 治疗颌骨骨折的基本要求是_____。
22. 颌面外伤引起窒息的原因是_____、_____、_____、_____。
23. 窒息时出现的“三凹”体征是_____、_____、_____吸气时出现明显凹陷。
24. 气管切开术的切口应由_____至_____。
25. 切开气管的位置应在气管_____。
26. 常规结扎颈外动脉的部位是在_____与_____之间。
27. 颅脑损伤的病员禁用吗啡，以免_____、_____、_____、_____。
28. 颌面部伤员急救时采用包扎有下列作用_____、_____、_____。
29. 颌面部挫伤的主要临床症状是_____、_____、_____、_____。
30. 颌骨骨折的复位方法有三种即_____、_____、与_____。
31. 牙脱位及牙槽骨骨折常采用_____固定。
32. 颞乳突区皮下淤血及咽粘膜下淤斑，外耳道有脑脊液流出，应考虑有_____骨折。
33. 颌面部火器伤引起继发性出血的常见原因是_____与_____。
34. 口底腐败坏死性蜂窝织炎的主要病原菌是_____。
35. 急性化脓性腮腺炎常由于严重的全身性疾病降低口腔_____，同时因高热、失水、_____、因而导管内_____作用降低，发生_____感染。
36. 涎石主要由_____和_____等无机盐构成，而以_____的含量最多。
37. 腺样囊性癌切除后常易复发，其主要原因是此癌瘤常_____扩散。
38. 鼻颈位X线片主要用以观察_____、_____、_____、_____、_____、_____和_____。
39. 急性化脓性腮腺炎的脓肿最常穿破_____。
40. 涎石病的主要症状是涎腺_____、_____、_____、_____、_____。
41. 腺淋巴上皮病是一种不多见的涎腺疾病，常发生在_____腺，其临床特征是涎腺与_____、_____。
42. 舌下腺囊肿根治的手术原则是切除_____。
43. 舌下腺囊肿的囊液含有_____，而不同于囊状水瘤等其他囊液。
44. 腮腺切除后最常见的并发症是_____。
45. 腮腺恶性肿瘤的造影X线片表现_____、_____、_____。
46. 常用抗肿瘤药物按其化学性质与作用分为（1）_____，（2）_____，（3）_____，（4）_____，（5）_____。
47. 抗癌药物对细胞周期的作用的不同而分为（1）_____，（2）_____。
48. 保证皮片存活必须使皮片_____，不能有_____。
49. 皮瓣移植数小时后如发现皮瓣发绀、充血，可能为_____或_____。

50. 唇缺损整复的原则是(1)_____ (2)_____ (3)_____。
51. 颞下颌关节脱位后采用口内手法复位的力量应使下颌后份向_____，颈部_____使髁状突滑向_____再往_____滑入关节凹。

二、是非题：请在每题后面括弧内注明“+”或“-”，题意正确者写“+”，不正确者写“-”。每题0.5分，回答错误者扣0.5分。

1. 拔牙时为了保持牙槽脊的高度，以利于以后托牙修复的固位，高出子牙槽窝的牙槽中隔或骨脊应尽量保留。 ()
2. 牛角钳主要用于拔除下颌磨牙。 ()
3. 拔除下颌切牙时主要使用旋转力。 ()
4. 为了预防冠周炎及其并发症，阻生牙均应拔除。 ()
5. 阻生下颌第三磨牙在冠周炎急性期一般不宜拔牙。 ()
6. 已发生纵折的上颌第一磨牙，应分别拔除。 ()
7. 采用劈牙法拔除阻生牙时，选用双面骨凿较单面骨凿更好，因双面骨凿的长轴方向与劈开的方向是一致的。 ()
8. 口腔颌面部创口的初期清创缝合时间不应超过伤后24小时。 ()
9. 在颌面骨骼损伤中，上颌骨骨折的发生率最高，是由于骨质薄弱与周围骨相连形成骨缝多，且骨内有腔窦。 ()
10. 上颌骨骨折时骨折片常向前下方移位，使面形变长。 ()
11. 下颌双侧颏孔区骨折时，后骨折片向后上方移位，前骨折片向前下方移位。 ()
12. 上颌磨牙引起的牙槽脓肿，形成颊侧骨膜下脓肿后，在颊肌附着以下破溃则在面部形成脓肿。 ()
13. 下颌切牙所引起的牙槽脓肿形成舌侧骨膜下脓肿，常在下颌舌骨肌以下破溃进入颏下间隙。 ()
14. 下颌支骨髓炎是嚼肌间隙感染的主要来源。 ()
15. 慢性边缘性骨髓炎，死骨刮除术应在急性炎症控制后2~4周进行。 ()
16. 放射性骨髓炎因死骨分离缓慢，周界不清楚，不必等待死骨分离，即应以健康骨质为界，及早切除死骨以求根治。 ()
17. 根据病原菌的特性，颜面疖痈的治疗应以青霉素为首选药物。 ()
18. 小儿所患颌下间隙脓肿的主要来源是牙源性炎性病灶。 ()
19. 面颈部结核性淋巴结炎的主要病灶是肺结核。 ()
20. 颌面部放线菌病是从事农业或畜牧业工作者特有的感染。 ()
21. 颌面部放线菌病同时发生于颜面软组织及颌骨的占80%。 ()
22. 颌面部放线菌病发生于软组织者多见于腮腺嚼肌区。 ()
23. 放线菌病是厌氧菌感染，可以采用高压氧治疗。 ()
24. X线摄片对放线菌病有肯定的诊断意义。 ()
25. 急性涎腺炎需作X线摄片以便作鉴别诊断。 ()
26. 涎石是引起急性涎腺炎的主要原因。 ()
27. 涎石都可以在X线片上见到，易于诊断。 ()
28. 慢性颌下腺炎皆需要摘除颌下腺。 ()

29. 颌下腺切除术中由于舌神经紧靠颌下腺导管因而易被切断。 ()
30. 急性流行性腮腺炎血液中淀粉酶可升高。 ()
31. 急性化脓性腮腺炎的治疗也和一般化脓性感染一样在扪得波动后即可作切开引流术。 ()
32. 埋伏牙定位摄片，对比两张X线片移动幅度比较小的点，距X线光源远，距胶片近。 ()
33. 活动、体积小、生长不很快的腮腺部肿瘤都是良性瘤。 ()
34. 囊肿见于舌下区的是舌下腺囊肿，见于颌下区的是颌下腺囊肿。 ()
35. 人胚胎发育中上唇是由球状突与上颌突形成。 ()
36. 人胚胎发育中硬腭及软腭由中腭突和侧腭突发育而成。 ()
37. 全厚皮片游离移植后收缩小、色泽变化大。 ()
38. 表层皮片切下后收缩大，移植于创面后挛缩重，质地脆弱，不耐受外力摩擦和负重。 ()
39. 皮管形成4、5天后在皮管中新生成血管网，并不断壮大。 ()
40. 皮管整复缺损后约4—6周感觉恢复从边缘向中央逐渐开始，首先恢复痛觉，最后恢复温度觉。 ()

三、选择题：请将正确答案的数字填写在题的前面括弧内。每题只选一个正确答案，如多选，该题不给分。（每题0.5分）

1. () 腮腺淋巴瘤为腮腺的良性肿瘤常发生在腮腺的：(1)上极部位，(2)前缘的浅面，(3)下极部位，(4)深分，(5)峡部。
2. () 腮腺区囊肿多数是：(1)导管阻塞所致，(2)外伤原因引起，(3)先天性，(4)都不是。
3. () 颞下颌关节盘穿孔、破裂后，主要症状之一是：(1)开闭口有破碎声，(2)前伸运动时有破裂声，(3)侧向运动时有破裂声，(4)三种运动的任何阶段都有破碎声。
4. () 颞下颌关节功能紊乱综合征的后期可能出现髁状突破坏，用听诊器在：(1)开、闭口运动时，(2)前伸运动时，(3)侧向运动时，(4)三者皆能听到磨擦音。
5. () 腹腔手术后并发急性化脓性腮腺炎是由于：(1)高热，(2)全身衰竭，(3)腮腺反射性功能降低，(4)代谢紊乱而发生。
6. () 六岁小男孩从一米高左右地方跌下，二小时后到医院检查，发现颏部偏右皮肤有擦伤，局部肿胀，近下缘有一裂口约二厘米长深达骨面，局部稍有肿胀，左下颌枝上方稍肿左耳前区有压痛，一年后发现口张度受限，估计会有：(1)右颏部骨折；(2)右髁状突颈骨折，(3)左髁状突颈骨折，(4)双侧髁状突颈骨折，(5)无骨折。
7. () 舌根部的癌可以转移到：(1)颌下淋巴结，(2)颈深淋巴结，(3)茎突后淋巴结，(4)咽后淋巴结，(5)都有可能。
8. () 拔牙创口的血凝块一般经过：(1)3分钟，(2)5分钟，(3)15分钟，(4)半小时，(5)1小时即可形成。
9. () 拔牙术后：(1)半个月，(2)1个月，(3)2个月，(4)3个

月，（5）半年，牙槽窝方能完全为骨组织所代替。

10.（ ）舌系带过短，应在儿童（1）刚出生时，（2）3个月，（3）6个月，（4）1—2岁（5）6岁以后进行手术矫正。

11.（ ）颌骨骨折临床愈合的标准是：（1）局部无压痛，（2）局部无异常活动，（3）拆除外固定后骨折处不变形，（4）X线片上骨折线仍存在，（5）都有。

12.（ ）上颌双侧横断骨折，骨折片上牙齿情况良好者，应采用：（1）领间8字栓丝，（2）外固定，（3）单颌固定，（4）颅颌固定，（5）手术切开复位。

13.（ ）边缘性颌骨骨髓炎是继发于：（1）根尖脓肿，（2）牙槽脓肿，（3）化脓性上颌窦炎，（4）中央性颌骨骨髓炎，（5）颌周间隙脓肿的感染。

14.（ ）边缘性颌骨骨髓炎的病变常发生于：（1）牙槽脊，（2）下颌体下缘，（3）下颌枝及下颌角，（4）上颌骨，（5）下颌喙突。

15.（ ）皮片移植到创面后的初期，由血浆供应皮片营养而创面毛细血管与皮片毛细血管发生吻合是在：（1）数小时后，（2）18小时后，（3）24小时后，（4）36小时后，（5）48小时后。

16.（ ）皮片移植后：（1）数月，（2）半年，（3）一年，（4）两年后痛觉，温度与触觉完全恢复正常。

17.（ ）表层皮片包括：（1）表皮层，（2）表皮层及乳突层，（3）表皮层及真皮，（4）厚度在成人约0.35毫米。（5）约为皮肤全厚的1/3。

18.（ ）对偶三角交叉皮瓣中两瓣尖端的角度：（1）可以是90°以内的任何角度，（2）20°—80°都可以，（3）一般以60°为宜，（4）45°—90°之间，（5）可以超过90°。

19.（ ）皮管的血管供应网主要在：（1）脂肪组织内，（2）皮肤内，（3）真皮内，（4）乳突层，真皮与脂肪间，（5）皮管中心。

20.（ ）软骨移植后：（1）被结缔组织包绕，（2）结缔组织长入其中，（3）与周围组织成有机联系，（4）有血管及纤维组织长入其中，（5）都将被吸收。

一九八〇年皮肤病学试题

一、解释：（15分）

- （1）结节 （2）鳞屑 （3）萎缩 （4）糜烂 （5）淤点
（6）苔藓样变 （7）黑头 （8）棘层松解 (acantholysis)
（9）半抗元 （10）基底细胞液化变性(hydropic degeneration of basal cells)

二、试述我国头癣的常见病原菌及其临床表现（15分）

三、试述单纯疱疹和带状疱疹的发病原因和诊断要点（10分）

四、试述药物性皮炎的临床症状和治疗（10分）

五、试述表皮的组织结构（10分）

六、试述糊剂和软膏的区别和应用指征（10分）

七、试述红斑性狼疮与红斑性天疱疮的鉴别（10分）

八、试述麻风菌素试验的临床意义（10分）

九、试述寻常性与落叶性天疱疮的鉴别 (10分)

一九八〇年放射诊断学试题

(放射解剖学)

- 一、说明成人膝关节(包括关节及其毗邻)的解剖结构及其在平片检查和关节腔造影中的表现。(20分)**
- 二、说明成人环椎、枢椎、第七颈椎椎体和附件的解剖结构。(20分)**
- 三、绘图说明右肺下叶、左肺上叶肺叶和支气管肺段解剖。(15分)**
- 四、绘图说明心脏大血管平片检查右前斜位和左前斜位的解剖投影。(15分)**
- 五、试述盲肠、结肠、直肠的大体解剖特点(包括位置、形态、大小及其系膜的附着情况)。(20分)**
- 六、试述胆道的大体解剖。(10分)**

一九八〇年放射诊断学试题

- 一、试述佝偻病的临床特点和X线表现特点。(18分)**
- 二、说明后前位和侧位投照的正常胸片标准。(16分)**
- 三、说明法洛氏四联症在心脏常规三位(后前位、右前斜位和左前斜位)摄片上的X线表现。(16分)**
- 四、说明胃和十二指肠溃疡的X线征象。(16分)**
- 五、病员于夜间被汽车撞伤头部，次晨被人发现时已处于昏迷状态。查体发现右顶后有一颅皮血肿。说明应采取的X线检查程序和在X线检查中可能出现的X线征象。(16分)**
- 六、是非题：以下各题，如认为正确，可填以(+)；如认为不正确，则填以(-)。每题1.5分，答错扣0.5分。**

1. X线影像都大于被照体的实际大小 ()
2. 筛窦病变宜采用华氏位投照，不宜采用柯氏投照 ()
3. 两长骨端关节面间属于中等密度间隙，即是解剖学上的关节间隙 ()
4. 正常骨外膜可呈位于骨皮质外，与它相平行的致密的X线投影 ()
5. 位于正位胸片膈顶下方约2厘米处的致密投影(大小约 $1 \pm \text{厘米}^2$)，可肯定它位于膈下 ()
6. 患者持续高热10天，摄胸部正位照片，未见粟粒结节影，可以排除急性粟粒型肺结核 ()
7. 为了确定有无少量气胸，透视和摄片，都宜采用深吸气而不宜采用深呼气 ()
8. 正位胸片上，右肺下叶完全实变时，右心缘应当完全不显示 ()
9. 心胸横径比率如大于0.5，即诊断心脏有增大 ()
10. 十二指肠球部后壁穿孔，不应产生小网膜积气征象 ()
11. 站立和卧位，胃小弯缘均位于胃的上方，胃大弯缘均位于胃的下方 ()
12. 十二指肠球部溃疡穿孔可能显示肝边缘影象 ()

一九八一年口腔科学试题

(供口腔矫形学专业用)

(每题20分)

- 一、试述治疗龋病时，预备洞的基本原则与步骤。
- 二、试述根管治疗的目的、适应征与基本步骤。
- 三、牙齿松动有哪些原因？试一一举例说明。
- 四、试述最常见牙周病的治疗。
- 五、在矫形科的临床观察中，可能见到哪些有关口腔粘膜病？试说明之。

一九八一年口腔内科学专业试题

- 一、试阐述龋病的发病原因。
- 二、试述龋病预防的方向及其具体措施。
- 三、试述牙周炎症的病因。
- 四、在临幊上如何区别牙周炎症，牙周创伤，牙周变性，试列举之。
- 五、复发性口疮与白塞氏综合征有何不同？如何鉴别？如何治疗？
- 六、试作出白斑病，扁平苔藓，慢性盘状红斑狼疮的鉴别诊断。
- 七、临幊上常见的引起急性牙痛的原因有什么？如何鉴别？

答題说明：

- 1、考题共七题，各个方向的研究生共答五题即必答三题，选答二题。（共五题，每20题分）
- 2、第七题为三个方向的必答题。
- 3、报考龋病方向者第一、第二两题必答。
- 4、报考牙周病方向者第三、第四、两题必答。
- 5、报考口腔粘膜病者第五、第六、两题必答。
- 6、除必答题外，各再选答二题；如报考龋病方向者还须在牙周病和口腔粘膜病的考题中（即三、四、五、六题）各选一题。

一九八一年口腔矫形学专业试题

- 一、试述全口牙缺失对口腔功能及口腔颌面部组织的影响。（18分）
- 二、简述Kennedy牙列缺损分类及其评价，并说明第一类缺失的修复设计原则。（16分）
- 三、试述制作铸造全冠与锤造全冠的异同及其优缺点。（16分）
- 四、选择固定义齿的基牙应注意哪些问题，为什么？（18分）
- 五、口呼吸与舌的不良习惯，为什么会引起牙颌畸形？（16分）
- 六、乳牙早失与滞留的处理原则和常用方法。（16分）