

重慶草藥

第三集

重慶人民出版社

重 庆 草 藥 第 三 集

重 庆 市 卫 生 局 編

重 庆 人 民 出 版 社 出 版 (重 庆 嘉 陵 路 344 号)

重 庆 市 书 刊 出 版 业 营 业 許 可 証 出 字 第 1 号

重 庆 新 华 印 刷 厂 印 刷 四 川 省 新 华 书 店 重 庆 发 行 所 发 行

开 本: 850×1168 1/32 印 张: 8 $\frac{1}{2}$ 字 数: 217 千

1962 年 4 月 第 1 版

1962 年 4 月 第 1 次 印 刷

统 一 书 号: 14114·25 印 数: 1—4,000 册 定 价: 1.07 元

全 書 目 次

一	分部目录.....	(1)
二	正文.....	(1)
三	疗效索引.....	(251)
四	注释.....	(256)
五	中名索引.....	(258)
六	拉丁名索引.....	(262)

目 录

蔬果粮谷部

1. 大刀豆..... (1)	26. 红苕..... (66)
2. 大蒜..... (5)	27. 红牛皮菜..... (68)
3. 小麦..... (8)	28. 茄子..... (70)
4. 火葱..... (10)	29. 苦瓜..... (72)
5. 无花果..... (13)	30. 苦蕒..... (75)
6. 白果..... (16)	31. 胡豆..... (78)
7. 冬苋菜..... (19)	32. 柿子..... (81)
8. 冬瓜皮..... (21)	33. 柚子..... (84)
9. 石榴皮..... (23)	34. 香橼果..... (86)
10. 包谷..... (26)	35. 观音苋..... (89)
11. 生姜..... (29)	36. 南瓜..... (91)
12. 向日葵..... (32)	37. 韭菜..... (93)
13. 西瓜皮..... (34)	38. 荔枝核..... (95)
14. 芋头..... (36)	39. 豇豆..... (98)
15. 李子..... (38)	40. 海椒梗..... (101)
16. 佛手柑..... (40)	41. 橘柑..... (103)
17. 茭实..... (43)	42. 核桃..... (106)
18. 茭菱..... (46)	43. 高粱..... (109)
19. 芝麻..... (49)	44. 荞子..... (111)
20. 油菜..... (51)	45. 苋菜..... (113)
21. 拐枣..... (53)	46. 梨..... (116)
22. 板栗..... (56)	47. 黄瓜藤..... (119)
23. 青果..... (59)	48. 萝卜..... (121)
24. 青菜子..... (61)	49. 丝瓜..... (124)
25. 枇杷叶..... (63)	50. 莲..... (127)
	51. 磨芋..... (130)
	52. 藤藤菜..... (132)

53. 櫻桃..... (134) 17. 刺梨根..... (187)
54. 鶴血李..... (136) 18. 刺楸根..... (190)

根 部

1. 八月瓜根..... (138) 21. 紅子根..... (199)
2. 三月泡根..... (141) 22. 苦芥头..... (202)
3. 三白根..... (144) 23. 南天竹根..... (205)
4. 大烏泡根..... (147) 24. 扁竹根..... (208)
5. 小烏泡根..... (150) 25. 通花根..... (212)
6. 小芭蕉头..... (153) 26. 臭黄荆根..... (215)
7. 牛奶子根..... (156) 27. 粉子头..... (218)
8. 牛耳大黄根..... (160) 28. 甜葛根..... (221)
9. 牛蒡子根..... (164) 29. 野棉花根..... (225)
10. 石竹根..... (167) 30. 野葡萄根..... (229)
11. 打碗子根..... (170) 31. 枣子根..... (233)
12. 百部根..... (173) 32. 黑塌子根..... (236)
13. 臭莫根..... (176) 33. 葦根..... (239)
14. 金剛藤头..... (179) 34. 糖果根..... (242)
15. 昏鷄头..... (182) 35. 藕秧泡根..... (245)
16. 刺老包根..... (184) 36. 閩主刺根..... (248)

蔬果粮谷部

1. 大刀豆

附：大刀豆壳

概述：本品系蝶形花科刀豆属植物，在重庆常见的有两种：

1. 洋刀豆 (*Canavallia ensiformis* DC.)；2. 刀豆 (*Canavallia gladiata* Jacq DC.)，即食用的刀豆。同等入药，常用。

形态：1. 洋刀豆——一年生直立或半直立草本，高60—100厘米；植株各部均无毛。小叶三片，从卵矩形到椭圆形，长8—19厘米，阔7—9厘米，顶端急尖或渐尖，并有细尖头。花紫色，长25毫米，排列为下垂的总状花序；花序长25—38厘米。荚果长20—25厘米，阔2.5厘米，通常是平的，有种子十至十四颗，种子扁，长29毫米，阔约13毫米。（图197）

2. 刀豆——一年生攀援草本。小叶三片；阔卵形，顶端渐尖，侧生二小叶稍斜，长8—15厘米。花数朵，淡紫红色，长3—3.5厘米，排列为总状花序。荚果大，带形，长15—30厘米，阔5厘米，有扁平种子十至十四颗。（图198）

产地：各地均有栽培。

采集时期：8—9月采集成熟的荚果。

药用部分：成熟的种子、荚壳及根。

性味：味淡，性平，无毒。

效用：行气，活血。刀豆壳用于散瘀活血，治腰痛、血气痛。刀豆米治肾虚腰痛、疝气、心气痛。刀豆根治跌打损伤腰痛。

用法：治气血不和腰痛，用刀豆子二粒煨酒服。肾虚腰痛，用

刀豆子二粒包子猪腰子内，外裹叶，烧熟食。一般多配方用。

附方：

1. 大刀豆壳、丝瓜壳，烧灰兑酒服，治血气痛；冲粳糟服，治乳痛。

2. 大刀豆子一对，小茴香二钱，吴茱萸一钱，破故纸一钱，青盐二钱，打成粉，蒸猪腰子吃，治肾虚腰痛。

3. 大刀豆根、火麻梗各等量，烧灰泡酒，每次服一杯，内服外搽，治跌打损伤。

4. 大刀豆根二两，糯米半合，黑豆一酒杯，芝麻半抄，白果（去心）四两，装小肚子内炖服，治阴囊疝气。



图197. 大刀豆之一 (洋刀豆 *Canavalia ensiformis* DC.)

1.花枝 2.荚果 3.花




图198. 大刀豆之二 (刀豆 *Canavalia gladiata* 《Jacq》 DC.)

1.花枝 2.荚果 3.种子

2. 大 蒜

附：大蒜梗

别名：蒜。

概述：本品系百合科葱属植物大蒜(*Allium sativum* Linn.)。其鳞茎及鞘状叶包裹的花葶(通称蒜梗)均供药用,为较常用药。草药医认为独大蒜疗效较高。

形态：为多年生草本，有强烈的辛辣气味。一般具多数小鳞茎，外包灰白色带淡褐色的皮膜。叶实心，扁平，呈广线形。花葶长，圆柱形，高约60厘米，顶端多为伞形花序，花小密集，常为珠芽所代替，具长膜质包片；花被六片，披针形；雄蕊六枚；子房长圆状卵形，先端凹入。果实为蒴果，背开裂；种子扁，黑色。
(图199)

经验鉴别：独蒜为圆球形或倒纺锤形，一般较小，不分瓣(鳞茎单一)，皮薄而肥嫩。

产地：重庆市各地均有栽培。

采集时期：4—5月采收。

药用部分：蒜及蒜梗。

性味：味辛，性热，有毒。

效用：除寒，解毒。治毒疮、蛇咬、肺癆、虫牙等症。

用法：民间常用本品作解毒药。磨水塗一切热毒疮疽、脓疮、湿毒痒疮。黄水疮、湿疹、漆疮等非热毒疮不能用。合雄黄及酒磨(或捣合)敷，治蛇咬伤及无名肿毒，阴阳症均可用。行旅途中携带本品，除外用外，兼可内服，除寒解毒。渴饮冷水，以本品生嚼嚙，可防生水中的虫蛇毒。大蒜梗煎水(或配合其他药物)洗冻疮。

附方：

1. 制灸用藥綫：独蒜四兩，雄黃二兩，皂角筋二兩，苧麻四兩，以适量酒泡，然后取皂角筋及苧麻撚为綫，与泡过之蒜及余留之雄黃（已阴干者）装入瓶中密閉，貯存备用。用以灸头痛、火眼、牙痛、紅絲疔、纏蛇丹（注1）、縮阴症、暈死等症。

2. 大蒜梗、千里光、野花椒刺、麻柳皮、苦楝叶、黄桷树叶、野烟叶、蛇牙草、蒼耳草各五錢，煎水洗，治皮肤搔痒、湿熱疮毒。

3. 独蒜一个，輕粉五錢，搗絨，治手指肿痛。左手指痛，包右手拇指外側；右手指痛，包左手拇指外側。包起泡时挑破，以愈为度。治風火虫牙痛，敷包痛处外面腮頰上。

禁忌：生食損目，应慎用。




图199. 大蒜 (*Allium sativum* Linn.)

1. 植株 2. 花序 3. 花被及雄蕊 4. 子房 5. 花苞及珠芽

3. 小 麦

附：浮小麦、陈麦面、麦脚叶

别名：麦子。

概述：本品系禾本科小麦属植物小麦 (*Triticum aestivum* Linn.)，是栽培的主要粮食作物。在选种时浮在水面的种子称浮小麦，可留作药用，放置久年者药效更好，称陈浮麦；久年面粉称陈麦面；将枯的基生叶称麦脚叶；均可作药用，但少用。

形态：为一年生草本，秆高60—120厘米，节上光滑或被毛。叶鞘光滑或略被短柔毛；叶舌很短，叶片扁平，长20—38厘米，闊約14毫米。花序圓筒状，强健，长4—10厘米，闊約1厘米；穎片比外稃短，具芒或无芒。(图200)

經驗鉴别：麦脚叶是小麦初生时所发之叶，抽茎后即逐渐枯萎。农民多捞去脚叶使麦株通风，可取之作药用。

产地：各地均栽培。

采集时期：麦脚叶在小麦抽茎后，基生叶逐渐枯黄时采收。

药用部分：种子、年久麦面及将枯的茎生叶。

性味：麦脚叶味辛，性微寒。浮小麦味甘咸，性寒。陈麦面味甘，性平。

效用：麦脚叶除邪热，用治麦風疮(注2)。浮小麦敛汗，除热，治盗汗、潮热。陈麦面作外科敷料用。

用法：麦脚叶煎水洗，治小儿麦風疮。浮小麦煎水服，止虚汗盗汗。民间单用，中医配方用。陈麦面用于外科，调和包敷药。



图200. 小麦 (*Triticum aestivum* Linn.)

1.植株 2.小穗 3.小花 4.具长芒的穗 5.长芒小花

4. 火 葱

概述：本品系百合科葱屬植物細香葱（*Allium schoenoprasum* Linn.），为栽培的蔬菜作物。民間作药用。另有一种四季葱，香味药效较差，在不产火葱的季节，以之代用。

形态：为多年生簇生植物，根坚韧。花葶长15—16厘米，具皮，鳞茎繁茂。叶圆筒状，中空，与花葶相等长或长过花葶。呈头状花序，花多数，粉红至紫色，花被裂片长尖，6月开花。（图201）

产地：各地均有栽培。

采集时期：3—4月。

药用部分：全株或单用葱头。

性味：味辛，性温，无毒。

效用：通气，发汗，除寒，解表。民間常用以治風寒感冒头痛，外用作寒湿、紅肿、痛風、疮瘍的包敷药。

用法：風寒感冒头痛，将葱切細，拌挂面湯中，乘热食之，微微出汗而愈，或加少量生姜、辣椒发汗。感冒初起，头痛、鼻塞，畏寒身热，服之极效。

附方：

1. 火葱头七个，面粉四两，黄梔子三錢，土地榆二两，馬蹄草二两，小血藤二两，混合捣絨，用酒熏七次，退火后，用黄表紙貼敷，治扭伤肿胀不消。

2. 火葱头、魚鳅串、六月雪、地榆、金腰带各一至二两，捣絨酒炒，退火后外包（紅肿者不用酒炒），治无名肿毒、扭伤。

3. 火葱头四两，老姜一两，捣烂外用（紅肿加酒炒，夏天不炒），治关节炎、扭伤。

4. 火葱头三两，和蜂糖共同捣絨，包无名肿毒。

5. 火葱头二两，僵蚕一两，泡酒备用，治感冒头痛流涕、咳嗽。

6. 火葱二至三根，老姜一片，五匹風(嫩尖)三至七个，煎水，乘熱服，治小孩感冒風寒。




图201. 火葱 (細香葱 *Allium schoenoprasum* Linn.).

1. 植物全株 2. 花 3. 雄蕊及花被的一部分 4. 雌蕊