



农业生产经验丛书

番薯产量大跃进的经验

中共广东省委办公厅编

广东人民出版社

农业生产經驗叢書

中共广东省委办公厅編

水稻产量大跃进的經驗

番薯 木薯 馬鈴薯 玉米

增产經驗

发展生猪生产的經驗

兴修水利, 消灭水旱灾

发展黄麻、苧麻生产

积极发展油料作物

提高甘蔗單位面积产量

开发山区 綠化全省

除四害 講卫生 人寿年丰

发展漁业生产的經驗

政治思想工作也要大跃进

发展蚕桑生产的經驗

耕牛的管养与繁殖的經驗

低产变高产 坏地变良田

广辟肥源, 保证农业丰收

做好水土保持, 全面发展生产

向农具改革大进军

果树上山和栽培管理的經驗

做好工程管养, 提高水利效益

番薯产量大跃进的經驗

全面、广泛、系統地利用废物

番薯产量大跃进的經驗

中共广东省委办公厅編

广东人民出版社出版 (广州大南路43号)

广东省書刊出版業營業許可証粵版字第1号

新华書店广东分店發行

广东人民印刷厂印刷

書号: 1213·787×1092 1/32·1 1/2 印張·34,000字

1958年5月第1版

1958年5月第1次印刷

印数: 1-150,120

統一書号: T 16111·44

定 价: (5)一角二分

編者的話

农业合作化以来，~~本省~~各地农业生产，取得了很大成績，有很多农业合作社获得了显著增产，創造了许多丰产纪录和先进經驗。为~~了~~使这些經驗得到推广，以促进全省农业生产大跃进，提前实现全国农业发展纲要40条，我們將材料收集起来，編成一套“农业生产經驗叢書”。这套書内容很丰富，有水稻、杂粮、甘蔗、黃麻、油料等作物的高产經驗；有兴修水利、消灭水旱灾害的經驗；有制造肥料、积肥、种植綠肥的經驗；有发展养猪、耕牛、漁业、养蚕生产的經驗；有改良农具和运输工具的經驗；有开发山区經濟、造林綠化、水土保持的經驗；有开展爱国卫生运动、消灭四害的經驗；还有关于政治思想工作大跃进，以及全面广泛系統地利用废物的經驗等等。这些經驗介紹得很具体，很切合实际，值得大家学习。但应该說明，各地在农业生产和全面工作大跃进的浪涛中，后浪推前浪，先进更先进，新生事物、先进經驗不断出现；在这套書里面，一定还有许多新的經驗未及編进去。为了补足这个缺陷，我們將繼續收集更丰富、更生动的材料，編出更多更好的書。

目前，全省各地正在贯彻党中央提出的“鼓足干劲，力争上游，多快好省”的社会主义建設方針，掀起了比先进、学先进、赶先进的生产高潮，争取提前五年实现农业发展纲要40条。在这个高潮当中，我們出版这套書，希望能起到鼓舞和推动作用，通过大家的努力，讓这些先进經驗在全省各地普遍地开花、結果！

1958年4月

目 录

海康县海田社番薯生产在繼續跃进中.....	杨华汉 (1)
罗定县1957年冬薯产量跃进了一大步	
.....中共罗定县委员会	(5)
.....罗定县人民委员会	
海丰县五爱社番薯亩产16,222斤.....	(11)
化县長岐社秋薯亩产20,075斤	
.....中共化县南安乡委员会	(17)
徐闻县南安社秋薯丰收.....	唐炳揮 (19)
澄迈县仁丁社番薯获得大面积丰产	
.....澄迈县人民委员会农业科	(21)
高山上的番薯万斤亩.....	陈宗荣 (24)
澄海县冠山社稻底薯丰产經驗.....	余昌丰 (26)
博美乡春收稻底薯大面积增产	
.....陆丰县人民委员会	(30)
試种早造稻底薯获得成功.....	广东省农业厅 (37)
临高县中林社薯块育苗經驗	
.....海南行署农业处	(41)
.....临高县农技站	
广东省的主要番薯良种.....	广东省农业厅 (43)
火土貯藏番薯經驗.....	胡桥养 (45)

海康县海田社番薯生产在繼續跃进中

- 杨华汉

爭取亩产61,000斤

海康县海田社，在雷州半島的西側海滨，全社共有137戶，565人，土地共有755.92亩，其中有467亩左右适宜种植番薯，絕大部分耕地为沙質土壤，很少受旱。

这里的群众一向都有种植番薯的习惯。根据最近三年情况来看，冬薯种植面积和亩产量逐年增加。1956年种植面积145亩，1957年种植面积285亩，今年390亩；1956年出现1.7亩产13,617斤，1957年因受灾全县大减产，但該社仍有12亩丰产田平均每亩6,000斤，其中有的亩产达8,000斤。今年有64亩丰产田要求平均亩产达18,468斤多，其中有3.5亩田亩产保証达到55,000斤，爭取61,000斤；8.5亩田平均亩产41,000斤；52亩平均亩产10,000斤。总面积平均亩产8,000斤，爭取达到10,000斤。以每亩平均达8,000斤計，即冬薯一造可收成3,124万斤，全社人口平均，每人可分得5,522斤，折谷1,380.5斤。这个社敢于訂出番薯产量大跃进的計划，是由于在过去的生产实践中，取得了一系列的經驗，給他們壯了胆。

丰产的經驗

海田社几年来創造番薯丰产的經驗主要有下面几条：

一 选好良种

1952年，邓世候（现在社的副主任）試用薯块育苗获得成功，往后逐年推广这个育苗法，直至今年該社用薯块育苗較多。育苗的过程：

（1）选好薯块。在番薯已成熟可收成时，选择薯条生得較多、皮光滑、无虫害、薯身略長、勾头圓底、尾根独一的薯块。

（2）选好薯块后，把薯藏在阴凉的地方，底鋪一层沙，上面也用一层沙稍盖过面，待出芽2—3寸，即取出切取头段約2—3寸長薯块，薯块切断面蘸上草木灰，以免薯块液体損失和腐爛，后移植較好的土地，育苗地要做成3.5尺的畦，每畦种双行，每行距6—7寸，按薯块的需要挖5寸深的穴，每亩下牛欄糞水、人糞水5担，待苗長五、六寸后須抓紧追肥一次，往后根据需需要繼續追肥，以便保持苗長青。

（3）待苗長一尺多后，又將苗藤切取5寸移植另地，植地起成畦形，种法和平常的差不多。待苗長大后（時間一般是一个多月），便可选取薯苗种。为了防止不取假种，应在中午太阳較好的時間，选择被太阳晒后叶子向下垂、苗身不生毛、苗頂三片叶稍齐、节稍密的苗，每条茎藤取两段，每段5寸为宜，太老对生薯是有影响的。

二 下足基肥

根据不同的时期，分层、分位追足各种适合的肥料。海田社冬薯全部下有基肥，追肥五次，现时全部已追三次肥，丰产薯已追六次肥。

丰产田基肥分三层：第一层是500斤花生藤、300斤海欖叶（以一亩計，以下同）；第二层是用26担牛欄肥和26斤过磷酸

鈣，混合后經七天即可用；第三层是用15担草灰和20斤花生麸，混合后經五天即可用。

三 提早种植

該社冬薯在晚造稻一开始收割便接着进行冬种，做到边割稻、边送肥、边种薯，割完一块稻即种下一块。去年冬薯在小雪后十天即全部种完，至小寒一个多月的時間薯苗即長得很茂盛，开始結下小薯，这样能增强番薯的抗寒能力，增加生長期間，使其得到充分发育，而提高产量。三月薯是谷雨后十天才收成，四月薯可留至6月上旬芒种才收成（6月6日是芒种）。

四 勤培土，勤除草，适时提蔓， 并注意消灭虫害

薯的整个生产过程中要保持畦土疏松，特别是在結薯时更要做好这个工作，保証做到沒有一层硬土皮。海田社每下雨后土稍干即进行松土，以便空气滲入，使畦內的土易起分解作用，有利于薯的生長。培土也是一个重要的工作，多培土可以使薯块不会露出土面，避免虫害，也是松土的一种作法，如果薯块露出土面会被虫蛀，在日光太热时也会晒伤，影响薯块的生長。

提蔓也是有关番薯增产一个很重要的环节，适时提蔓可防止薯藤节部生根爭夺养分，以集中养分供应薯的生長。海田社一般做到提蔓多次：（1）雨后一次，（2）每次追肥、培土松土前提一次，（3）苗到溝底时即要提。在提蔓时亦应强调技术，不宜用力过大，必須順着薯苗生長的方向輕輕提起，拉断假根，然后順序的放在畦上；在旱或太阳最猛时一般不提，因这时提蔓会损伤茎苗。同时提蔓是帶有技术性的工作，海田社一般不讓技术不熟練的社員来搞这个工作，这些工作多为队

長或某些專人負責。

虫害：主要有兩種蟲，一種是薯頭蟲；一種是象鼻子蟲。此兩種蟲多生長在薯頭基內和薯塊上，對薯生長危害很大。除蟲、防蟲的辦法：第一是在種植後二十天左右第一次培土前，用“六六六”粉混合石灰撒在薯頭（1斤“六六六”粉混合50斤石灰可撒一畝薯）；其次是多培土，不讓薯塊在長大時突出土面。

五 採取各種辦法戰勝寒冷

這也是番薯增產的一個重要工作，特別是初種期一個月左右時間更為重要，因這時長得幼短，對寒冷的抵抗力較差。海田社防寒措施是採取按人分任務，每個人按自己分得任務，把破草席或各種草類同竹子扎成一塊一塊，插在畦上薯苗北邊。其次，起薯畦宜頭東尾北，薯苗向南，這樣也可防寒。

六 專人專管

海田社由七人組織成一個小組，專門研究番薯豐產有關事宜。社由一副主任專抓，生產隊也有一個隊長或副隊長專管番薯。除了專管番薯的幹部經常深入田間檢查外，每到一個重要增產環節，均召開專業會議研究，採取可行的措施。因該社薯田水位較低，當下雨較多時即組織專人排水，保證在雨後做到畦溝沒有水，這些都是關鍵的措施，要有專人管理。

其次是技術站同志指導思想較明確，每推廣一種先進技術措施，首先抓住思想教育和做好典型示範，然後才推廣技術。因此，該社進行各種先進技術是順利的，群眾是樂意接受的，因而取得效果。

七 大畦、高畦、密植

大畦、高畦、密植，也是获得增产的一个重要措施。該社薯田水位低，64亩丰产田畦整成宽5.3尺，高2尺，可使上层土壤加厚，土质疏松，有利薯块伸展、長大，防止水浸。每株距离一般为7.5—8寸，每亩种1,300条苗，高田畦每亩种1,600—1,800条苗。

罗定县1957年冬薯产量跃进了一大步

中共罗定县委会

罗定县人民委员会

产量跃进数倍

罗定县农民种植冬薯有六七十年的习惯，合作化后，面积不断扩大，每年种植10万亩左右，占冬种面积40%以上，年产量达30—45万担。

1958年春收的冬薯，普遍生长良好，大的每株有两斤多，小的也有半斤以上，是史无前例的一次大丰收。全县68,771亩冬薯，估产排队平均亩产达2,818斤，比一般年成(1953年)亩产424斤增产六倍，比丰收的1956年亩产560斤增产四倍，比歉收的1957年亩产100斤增产二十八倍。其中谷雨前收获的29,055亩，亩产平均达1,770斤，立夏收获的22,010亩亩产平均达3,000斤，留作晚造秧地的冬薯田17,706亩，亩产平均达4,256斤。以乡排队，平均亩产3,000斤以上的有12个乡，1,500—2,900斤有13个乡，最高的新谷乡亩产达3,830斤，最低的围底乡也

达1,581斤，到处传来丰收的喜讯。

种植冬薯好处多

今年春收冬薯丰收的范例，给广大群众一个极大的鼓舞，从实践中证明了冬薯具有巨大的增产潜力，是一项前途大，产量高的生产，对增加粮食，改善社员生活，安渡春夏荒，发展畜牧业，提高田土肥力，有着极其重大的作用。船步乡金步社算了一笔这样的账：全社冬薯177亩，每亩产薯3,000斤，总产量达531,000斤，平均每人可分350斤，足够两个半月的口粮；薯藤53万多斤，除供社集体养猪263头半年的饲料外，还有40万斤，可以多养猪或作肥料；而且经过轮作冬薯的稻田，提高了土壤肥力，每亩比非冬薯田可增产稻谷30—40斤。

革新技术，实现“七改”

今年春收冬薯获得大面积丰收，我们认为，除了县委已把冬薯与稻谷列入同等重要的位置，从上而下反掉右倾保守思想，从县到社圈定专人加强具体领导，并贯彻了“三包”和一系列经营管理措施之外，主要是大胆革新，打破常规，以革命精神，跃过技术关，实现“七改”而取得的。

一 改迟种，提早植，适当延长冬薯生长期

冬薯的正常生长期，需要160—180天，而我县晚稻收获至早稻插秧的冬闲期仅有130—140天，因此，抢季节提早植期延迟收获，满足冬薯生长期，就成为我县冬薯增产的首要关

鍵。去年打破常規，冬薯提早七、八天種植，做法是採取密切配合的綜合措施：（1）貫徹“一造早、三造早”，從早晚造水稻的播種、插秧至收穫均比1956年提早5—7天；（2）種冬薯的田，插晚稻時，70%左右採用早熟品種，以提早熟期半月，有利早植冬薯與勞力安排；（3）冬種期間，集中勞動力突擊搶種，即“邊割、邊犁、邊種”“搶火色”的生產。去冬最早的冬薯在10月6日（寒露前二天），已開始種植，立冬前後大忙，11月23日（小雪）已種完。早植的結果，不僅延長了生長期，而且薯苗在前期氣溫較高的條件下，生長很快，大大增強抗寒能力，春暖後生長快，結薯早，產量比遲植的顯著提高。如沙溝鄉沙頭社田間實測估產，第一批10月6—9日種的46畝，目前平均每株薯塊重量為1.05斤，折畝產5,050斤；第二批10月11—15日種的27畝，平均每株薯塊重量為10.8兩，折畝產3,375斤，比第一批畝產少1,675斤；第三批10月18—25日種的，平均每畝產為1,666斤，比第一批低3,384斤，比第二批低1,709斤。可見，搶季節，提早種植，是冬薯增產的一項重要關鍵。

為了解決滿足冬薯生長期與插秧季節的矛盾，我縣今年首次推行大面積寄秧。全縣稻田冬薯68,771畝，除早收穫的29,055畝和準備留作晚稻秧田的17,706畝外，其餘22,010畝全部實行寄秧，使番薯延長到谷雨後立夏前收穫，延長生長期15—20天。4月上旬已開始寄秧，主要是採用2×3寸的大田寄秧與禾行間拔寄秧兩種。大田寄秧一畝可供應4×4×6寸的雙行密植插3畝或5×6寸小科密植插5畝的秧苗，禾行間拔寄秧也可以解決2畝左右。寄秧田選擇深軟肥田，施足基肥，精耕細作，寄秧後追肥一次不中耕，以保證秧苗有足夠養分和良好的土壤條件生長，立夏前四、五天挖薯，移植寄秧。這是增產的重要保證。

二 改良田土，选择适宜土壤

去年的冬薯田，大部分都选择“潮沙田”、“沙質田”等較松疏的沙壤土田种植。这些田，在晚稻成熟抽穗时，則排干田水，使田土干湿适度，割禾后可即犁耙碎土起畦种薯。船步乡梓崗社不同土質，相同条件的冬薯，从現在生势看来，沙質壤土的比粘土的亩产高300—500斤。同时由于我县1956—1957年大规模改良低产田64,000亩，为冬薯生長創造了土壤适宜，排灌便利、耕作容易的土壤条件。如素龙区1956—1957年改良一部分低产田后，1957年冬薯面积由前一年的19,000亩扩大到26,326亩，而且初步改良过的田土种薯，普遍生長迅速，結薯早而快長大，群众反映比过去“大土泥”（粘土）种薯增产20%。

三 改劣种，选良种

我县过去番薯品种繁多，优劣混杂，約有50多个品种，产量悬殊很大。1957年冬种时特別提出大力选用良种，淘汰劣种，80%都选用了阳江白、香港藤、青藤仔、六十日、打爛錢、梅菪薯等本地良种，部分地区还引种禺北白，选外地一等良种，这样使品种一般上能初步适应罗定地区冬期不長，常受低溫侵袭、田土肥力不高的特点，达到早熟、生長快、結薯早、抗寒力較强、提高产量的目的。特别是去冬大力推广的高产、早熟、抗寒力較强的阳江白良种，亩产一般都在2,000斤以上，比过去“紅薯”等劣种亩产600—700斤增加一两倍。如沙蒨乡沙头社1956年冬薯品种复杂，“紅薯”等劣种多，全社127亩冬薯，平均亩产仅639斤；1957年冬种全部选用阳江白良种后加上早植密植、增施肥料，加强管理等措施，全社107亩冬薯，預計平均亩产可达4,862斤，比往年增产五至七倍。

四 改变少施肥、迟施肥习惯， 推广适时、多施、合理施肥

我县农民过去种薯大部分是粗放的，特别是黎少、素龙等区，只施追肥一次，甚至有的地区只施基肥不追肥的，施肥也迟，一般迟到春节后才进行，致产量很低。去冬今春，大规模积肥运动的结果，加上批判了重稻谷轻薯类的思想后，已基本上改变了这种习惯，全县冬薯普遍施肥三次，多的达四至五次，每亩施肥量达到100—150担，比过去增加两倍，施用期也较过去提早。其中基肥每亩牛栏粪、粪水达30—50担，追肥第一次在春节前就结束了。3月县委提出冬薯亩产3,000斤、争取4,000斤、向10,000斤跃进的口号后，出现了空前未有的抢季节增施肥料、提蔓的群众性生产行动，到现在止，再施肥二次的有58,700亩，施第三次的有39,900亩。如潭开社120多个女社员在清明前后一连几晚利用月色提蔓施肥，到天亮才回家。在施法上也有很大的改进。一般施第一次肥于种后一个月才薄施粪水，促使植株在转冷前生长茂盛，打好基础过冬，增强抗寒能力；第二次在立春后天气转暖，刚结薯仔时大量施粪尿一次，大量供应养分，促使薯块长大；以后隔半月又施一次肥，部分地区以硫酸钾作追肥，供应大量钾素。以供应冬薯对养分的需要。如船步乡梓岗社的冬薯，普遍施肥五次，平均每亩施土杂肥100—150担，硫酸钾20斤，比过去增加两倍，从现在长势来看，大面积平均亩产可达3,000斤以上。

五 改疏植为密植

1957年冬薯普遍采用“小畦密植”，部分株距疏的地方，在原株距6—8寸的基础上，再适当密植至5—6寸，做到在

保証冬薯正常生長的前提下，从各方面充分利用土地和空間，增加植株面提高产量。做法是起成畦寬1.8—2.2尺，畦高8寸至1尺，畦坑8寸的龟背形薯畦，株距5—6寸，这样每亩植株达到3,300—4,000株，比过去每亩增加700—1,000株，每亩可增产300—600斤。在插植法上，綜合起来，有两种：（1）橫藤法——用長达1.5—1.6尺的薯苗橫鋪畦面，兩端伸出畦外3寸，然后放“糞”（肥料）复土，其特点是埋藏薯节較多，結薯也多，但薯块細小，产量不显著。（按：采用短藤而节密的薯苗，在水利解决的条件下水平插法一般是較先進的。薯苗以5—7寸为好，1.5—1.6尺的藤太長了。）（2）插藤法——把6—7寸長的薯苗，頂端向南，斜插畦中央，露出薯尾3—4寸，其特点是結薯数量适中，薯块較粗大。这种植法产量較高，是我們今后推广的方向。

六 改善田間管理，战胜自然灾害

冬薯田間管理的整套工作是很多的，每个环节自始至終認真抓好才能最后达到增产。根据罗定情况，霜冻是冬薯的最大威胁，如1954年冬遭奇寒侵袭，在小农經濟力量單薄的情況下，抗拒不了，平均亩产112.8斤。在去冬今春吸取了教訓，全面采取綜合防寒措施：（1）提早种植，早施追肥，使薯苗前期生長茂盛健壯，提高抗寒能力；（2）开地时起成橫貫东西的薯畦，种薯时，薯苗向南或东南方向，使薯苗背风避寒減輕冻害；（3）晚稻收获时，儲备稻草堆放于薯田附近，每亩約300—500斤，凡傍晚西边“天脚”紅，有下霜預兆时，即全民出动，进行盖草护薯，全县先后出动了25万人次，在具备柴草水利条件地区，采用烧火熏烟，放水浸田，战胜了三次寒潮霜冻的侵袭。

此外，田間管理还注意抓好三条措施：（1）提早中耕除

草、培土、松土；（2）多次提蔓，减少养分浪费，一般都进行过三、四次，单是夜战突击提蔓的就有29,000多亩；（3）防旱和排积水，保证了田土湿润。由于做好以上工作，有效地保证了增产计划的实现。

七 改变地藤共生，推行“番薯搭架”

恒丰社老农陈积文，采用番薯搭架的培植方法，产量比普通（不搭架）的提高三倍。在0.04亩田搭架150株，收获650斤，即每亩产16,250斤，其做法是在冬薯种后15—20天当薯苗长达6尺左右，于畦坑搭起竹架，让薯藤攀登生长，这样做，有几个好处：一、番薯茎叶往上生长，减少畦面复盖，提高地温，阳光直接照射土壤，提早结薯；二、减少松根生长和养分消耗，组织较坚固，抗病力也强，而且还可增加茎叶产量，增加饲料，节约经常提蔓的劳力消耗。全县已有石围、加益、罗坎、梓岗、金步等社，积极进行这样培植经验。这是增产的好方向，今后必须继续大力推广。

海丰县五爱社番薯亩产16,222斤

海丰县捷胜乡五爱农业社，1957年夏种番薯20.5亩，在经受三次水灾袭击的情况下，平均每亩仍获得8,744斤大面积的丰产，较之1956年平均亩产4,500斤增产94%；其中有1,625亩仅受一次水灾，亩产量竟达到16,222斤。

该社番薯能获得这样的高额产量，主要是在党的正确领导下，发挥了农业合作化的优越性，大力改良土壤，为番薯创造了良好的栽培环境，同时受到了五一社番薯（1956年亩产16,200

斤)丰产經驗的启发,对番薯栽培經驗不断总结提高,并结合本地区的特点,实行了一系列的先进耕作技术。其栽培經驗如下:

深耕入泥,改良土壤

五爰社是滨海半丘陵地带,耕地多属沙质和沙壤土,且含粗沙较多,保水保肥力不强。种植番薯容易受晒,同时沿海台风大,暴雨多,薯畦极易沉实和崩溃,或畦身受雨水冲刷表土流失,使薯根外露,影响结薯,造成产量很低。合作化后,发挥了集体生产优越性,大力进行改良土壤。对含沙较多的田地,在春耕前实行客土入田,每亩挑入沟肥泥二百多担;较瘦的田,增施八担豆苗作绿肥,结合深耕,犁深4—5寸以上,增厚土层。经过二至三年改良后,土壤中腐植质增加,结构变好,成为深软肥沃的沙质壤土,改变了栽培环境,适宜番薯的生长,利于薯块形成和长大,薯身光滑,病虫害亦随之减少,番薯品质和产量则大大提高。

选用丰产良种,培育壮苗

该社的番薯丰产品种,首先是根据地势低洼的特点,选择耐湿、耐肥、生势旺、生长期长、抗病虫力强的丰产良种“白叶仔”作种;其次是培育壮苗,抓住“三选、三注意、三适”的主要关键。

三选:(1)选育苗地,必须选择肥力强、背风向阳、空气充足、排灌水良好的沙质壤土,最好是菜园地。(2)选薯块或藤头作种。薯块选种,每隔三年一次,于农历正月下旬番薯收获时,在田间选薯形正常与原种相同,薯身光滑而薄皮,结薯集中而近地面,蒂头短小而平底,无病虫害和人畜伤损的作种。第二年为了容易管理,薯苗长得多而快,可实行藤头选

种，选择生長茂盛而粗壯，发育良好而无虫病的植株，剪去薯苗和薯块，留下6—7寸長的藤头育苗，但不能連續二年，以免品种退化。（3）选苗，选苗心粗壯，三叶或五叶齐，叶色深綠，节密而无病虫害的第一段頂苗。种后快开根，迅速生長，产量較高，不易变种。

三注意：（1）注意育苗密度和剪苗次数。苗地要平整細碎，起5寸高4尺闊6寸溝的平畦，一畦育苗四行，采用斜插法，行距7.5寸，株距8.5寸，每亩6,000千株，过密有碍薯苗生長，不能育出壯苗，过疏薯苗不够，这样一亩剪一次有20,000条，剪三次为宜。（2）注意施薯苗肥，基肥要足，每亩要有机質土肥25担，成活后施豆餅40斤，摘苗后两次施厩肥60担（但切忌施田料）。（3）注意淋水和摘心，种后未成活前早晚要淋水两次，干旱时要經常淋水。假植苗20天即薯苗長1尺長时，摘去苗心1寸，促进分枝多生薯苗。

三适：（1）适期育苗。根据早稻收获和番薯种植期間的迟早决定育苗期。一般薯块育苗要在雨水节前后进行，苗期70天（藤头育苗50天），在谷雨节前后，剪苗假植，假植苗期50天左右，再剪苗种植本田，最为适宜，否則育苗期过長，則薯苗不壯，过短則薯苗不足，剪苗有困难。（2）适長剪苗，剪苗長度約7—8寸，种后易于成活和結薯块。（3）适时插苗，剪苗插植，最好在下午三时以后，日弱气凉的时候进行，随剪随种，避免强烈太阳晒軟薯苗，减少养分水分蒸发，以免种后黃叶，回青慢，苗头腐爛，滋生病虫害等现象，而叶經過当晚露凉湿润，成活率高，快开根生長。

爭取早植，高畦浅种

番薯性喜湿润高气候，耐寒性不强，本地4—9月間高温