

全国玉米种质资源目录

中国农业科学院作物品种资源研究所
山东省农业科学院玉米研究所

主编



农业出版社

全国玉米种质资源目录

中国农业科学院作物品种资源研究所 主编
山东省农业科学院玉米研究所

全国玉米种质资源目录

中国农业科学院作物品种资源研究所
山东省农业科学院玉米研究所 主编

• • •
责任编辑 张兴瓚

农业出版社出版 (北京朝阳区东直门内大街)
新华书店北京发行所发行 通县向阳印刷厂印刷

787×1092毫米16开本 27.5印张 608千字

1985年8月第1版 1985年8月北京第1次印刷

印数 1—43,920册 定价 7.90 元

ISBN 7-109-00396-5/S·292

主编单位：

中国农业科学院作物品种资源研究所

山东省农业科学院玉米研究所

供稿单位（以提供材料多少为序）：

云南、广西、四川、吉林、山东、北京、山西、湖北、贵州、陕西、河北、河南、辽宁、内蒙古、黑龙江、浙江、甘肃、江苏、新疆、安徽、天津、上海、湖南、宁夏等省（市、自治区）农业科研单位

编写人（以姓氏笔画为序）：

王长明、王来翁、王志广、王志范、王克伦、卢志豪、兰仲模、朱良骅*、朱蘊中*、孙建英、李惠文、吴耀先、张兰荣*、张丽薇、张燕*、陈玉洁、郑遂义、赵述、贺大容、郜淑青、段永钊*、徐兴昌、高楷*、郭兰葵、曹镇北*、雷元珍、裴英杰、滕跃聪*、潘桂娣

（带*者为兼审阅者）

前 言

玉米是天然异花授粉作物，遗传基础非常丰富。玉米引入我国虽只有四百余年的历史，但在自然和人工栽培条件的影响下，经过长期的驯化和选择，形成了极其丰富而各具特点的种质资源。这些种质资源是发展玉米科研和生产的极为宝贵的物质财富。

建国以来，党和政府十分重视玉米种质资源的研究利用工作。五十年代中期，全国范围内进行了一次群众性的品种搜集工作，共搜集玉米地方品种11400多份。同时，有关科研单位都相继开展了对玉米品种的整理和鉴定研究，从中选择和培育了大量的优良品种和杂交种，对发展我国玉米遗传育种科学，提高玉米产量，作出了一定贡献。此后二十年，各地还零星搜集地方品种和从国外引进一批种质。据1979年全国农作物品种资源科研工作会议统计，全国共保存玉米种质资源10573份。近三年来，各地又进行了大规模的品种考察和补充搜集工作，搜集玉米品种数千份，为今后种质资源的研究和利用进一步提供了雄厚的物质基础。

根据全国农作物品种资源科研工作会议精神，为进一步做好玉米种质资源的研究利用工作，促进玉米遗传育种科学和生产的加速发展，由中国农业科学院作物品种资源研究所和山东省农业科学院玉米研究所主持，各省、市、自治区农业科学院有关单位参加，自1979年5月开始，在分别整理编写各省、市、自治区玉米品种资源目录初稿的基础上，于1982年2月在北京召开了全国玉米种质资源编目定稿会议，由河北、吉林、江苏、河南、四川、陕西省农业科学院和广西壮族自治区农业科学院玉米研究所，共同汇编了《全国玉米种质资源目录》。其中，编入的国内品种7277份，国外引进品种（包括没有亲本种子的少数杂交种）398份，国内优良（或具有特殊性状）自交系185份和国外引进自交系104份，合计7964份。种子丧失发芽力、观察记载项目大部残缺和有误的种质，以及玉米的近缘野生植物，均未编入《目录》。一部分地区拥有的同一重复品种和自交系，则编在育成、最初引入或种植面积最大的省、市、自治区内。外地引进而在当地种植达二十年以上的品种，则作为当地品种编入了《目录》。

《全国玉米种质资源目录》，汇集了我国各省、市、自治区已整理较完备的、绝大部分的玉米种质资源。确定了统一编号，以便交流和研究利用。

本集是全国各省（市、自治区）许多同志集体劳动的结晶，编写人仅是编写资源数达总数的百分之一以上或在组织编写中做工作较多者。其它尚有许多人在资料调查、编写、修改等方面做了不少工作，限于篇幅，不能一一列出，在此表示感谢。

《全国玉米种质资源目录》的编写，由于缺乏经验，难免有不妥之处，请读者批评指正。

编辑说明

1. 《目录》编辑顺序, 国内资源以省、市、自治区为单元, 国外引进资源, 则按来源(国家或地区)为单元。其顺序, 国内的按国务院批准从1981年1月1日起实行的全国各省、市、自治区的统一标准排列顺序(附录2), 国外的按《世界地图集》(统一书号12014·714)各大洲内国家的次序(附录3)编排。各省、市、自治区内的品种, 按地区、州、盟和各自所辖县、旗为单位, 依次排列。从国外引进的品种和自交系按原名的字母顺序排列, 无原名的按译名的汉语拼音字母顺序排列。

2. 《目录》编号, 分统一编号和保存单位编号两类。统一编号均为六位数。国内品种前二位数代表省、市、自治区, 后四位数为品种号。各省市区的品种号均从0001顺次编码。国外品种, 第一位数为洲号: 亚洲及大洋洲为4, 欧洲、非洲和美洲, 分别为5、6、7。第二、三位数代表国家或地区, 后三位数为品种号。自交系编号与品种相同, 只在编号前冠以英文字母L。

3. 当一个品种有两个以上名称时, 选用在当地通用的名称。

4. 因篇幅所限, 保存单位名称一般用简称, 如中国农业科学院作物品种资源研究所简称中国农科院品资所; 产地或来源不列省、市、自治区和乡、村名, 只列县(区)、市名。

5. 播种期有的不列月、日, 只列春、夏、秋, 春播指2月中旬至5月上旬播, 夏播为5月中旬至7月下旬播, 秋播指8月至10月播。

6. 目录表其它病害栏, 所填“粗”代表粗缩病, “矮”代表矮花叶病, “青”代表青枯病, “锈”代表锈病, 其中阿拉伯数字系病株百分率。

7. 由于玉米种植较少和其它原因, 本目录未编入福建、广东和台湾省的资源。

目 录

前言

编辑说明

玉米种质资源目录表	1
(一) 国内品种	2
北京市	2
天津市	8
河北省	10
山西省	26
内蒙古自治区	42
辽宁省	52
吉林省	64
黑龙江省	90
上海市	100
江苏省	102
浙江省	108
安徽省	113
江西省	120
山东省	122
河南省	146
湖北省	160
湖南省	180
广西壮族自治区	182
四川省	216
贵州省	250
云南省	270
西藏自治区	354
陕西省	356
甘肃省	372
青海省	380
新疆维吾尔自治区	380
(二) 国外引进品种	384
(三) 国内自交系	408
(四) 国外引进自交系	422
附录 1 《目录》中玉米品种、自交系特殊性状索引表	428
附录 2 全国各省、市、自治区的统一标准排列顺序	432
附录 3 世界各大洲国家代号和排列顺序	433

玉米种质资源目录表

(一) 国

北京市

统一 编号	保存单位及编号		品 种 名 称	产地或来源	播 种 期	株高 (cm)	穗位高 (cm)	主茎叶 片数	双穗率 (%)	生育 日数
	保 存 单 位	编 号								
010001	中国农科院品资所	14	华农 1 号	海 淀 区	春	265	118	21		124
010002	中国农科院品资所	34	蜡细黄	海 淀 区	春	205	99	24		128
010003	中国农科院品资所	3130	小白磁	海 淀 区	春	220	89	18	2.4	99
010004	中国农科院品资所	3126	百日熟	海 淀 区	春	200	72	17	7.5	101
010005	中国农科院品资所	152	大洋白玉米	海 淀 区	春	285	134	23	9.0	131
010006	中国农科院品资所	230	华农 2 号	海 淀 区	春	167	57	17		108
010007	中国农科院品资所	3133	建明白	朝 阳 区	春	260	127	22		120
010008	中国农科院品资所	205	小玉米	丰 台 区	春	195	65	18	4.1	106
010009	中国农科院品资所	1086	海粒黄	丰 台 区	春	223	104	20	2.4	107
010010	中国农科院品资所	3132	白马牙	丰 台 区	春	281	134	23	7.0	124
010011	中国农科院品资所	3223	二黄棒子	门头沟区	春	232	110	21	2.5	109
010012	中国农科院品资所	3224	二黄棒子	门头沟区	春	241	100	19		109
010013	中国农科院品资所	3226	白马牙	门头沟区	春	284	132	21	2.5	116
010014	中国农科院品资所	3229	二黄棒子	门头沟区	春	247	111	21	1.2	109
010015	中国农科院品资所	3230	大黄棒子	门头沟区	春	258	113	20	2.5	107
010016	中国农科院品资所	3211	昌平白马牙	昌 平 县	春	267	147	24	3.5	120
010017	中国农科院品资所	3133	建明白	昌 平 县	春	246	112	22		120
010018	中国农科院品资所	1079	八道白	昌 平 县	春	287	127	21	3.3	117
010019	中国农科院品资所	1080	大灯笼红	昌 平 县	春	185	71	18	2.4	117
010020	中国农科院品资所	3212	延庆火棒子	延 庆 县	春	231	107	21	3.0	102
010021	中国农科院品资所	3218	黄马牙	延 庆 县	春	230	102	19	1.2	116
010022	中国农科院品资所	3225	白骨头棒子	延 庆 县	春	200	69	17	1.2	103
010023	中国农科院品资所	344	延庆二民子	延 庆 县	春	263	112	22		107
010024	中国农科院品资所	3397	延庆二民子		春	170	84	19	16.7	104
010025	中国农科院品资所	3398	二民黄玉米	怀 柔 县	春	219	101	22		112
010026	中国农科院品资所	3399	关东黄	怀 柔 县	春	203	93	21		110
010027	中国农科院品资所	3400	大民黄玉米	怀 柔 县	春	226	125	24	18.0	118
010028	中国农科院品资所	3401	把粗	怀 柔 县	春	152	63	19		99
010029	中国农科院品资所	3402	灯笼红	怀 柔 县	春	221	103	22		108
010030	中国农科院品资所	3403	白磁	怀 柔 县	春	258	133	23	16.6	117
010031	中国农科院品资所	3404	白马牙	怀 柔 县	春	253	125	23		116
010032	中国农科院品资所	3219	白马牙	怀 柔 县	春	287	141	24	1.2	117
010033	中国农科院品资所	3220	二黄棒子	怀 柔 县	春	302	146	22	2.3	116
010034	中国农科院品资所	3223	黄棒子	怀 柔 县	春	288	146	23	0	115
010035	中国农科院品资所	239	火棒子	密 云 县	春	185	83	19		104

内 品 种

病 害				倒伏	穗型	粒型	粒 色	轴色	穗长	穗粗	穗行数	千粒重	观察	备 注
小班	大班	丝黑穗 (%)	黑粉病 (%)	其它	度				(cm)	(cm)		(g)	地点	
1—2		0	2.5		轻	锥	硬粒	黄	白	16.8	4.2	14—16	264	北 京
			0		轻	锥	硬粒	深黄	白	15.4	4.3	14	276	北 京
1		0	3.6			锥	硬粒	白	白	17.3	3.6	12—14	206	北 京
		0	1.1			中间	马齿	白	白	14.8	3.9	10—12	472	北 京
0.5		0	24.6		轻	柱	马齿	白	白	19.2	5.1	12—14	391	北 京
		0	6.3		轻	锥	硬粒	深黄	白	12.2	3.3	14—16	150	北 京
0.5—1						柱	偏马	白	白	16.7	4.4	12—14	289	北 京
		1.0	3.2		中	柱	马齿	黄	红	11.6	3.9	12	188	北 京
1		0	6.1			锥	硬粒	黄	白	16.5	4.4		253	北 京
1—2		0	2.4		轻	中间	马齿	白	白	16.1	4.2	12—14	254	北 京
1		0	8.4			柱	马齿	黄	红白	18.8	4.2	14—16	245	北 京
1		0	6.1			中间	马齿	黄	红	17.5	3.9	14—16	267	北 京
1		0	3.8			柱	马齿	白	白	9.7	4.4	12—14	309	北 京
0.5		0	9.8			中间	偏硬	黄	白	18.0	4.1	12—14	242	北 京
0.5		0	8.6			柱	马齿	淡黄	红	14.4	4.4	12—14	271	北 京
0.5		0	5.9			柱	马齿	白	白	19.5	4.2	12—14	362	北 京
1		0	0			柱	偏马	白	白	15.7	4.1	12—14	310	北 京
1		0	4.6		中	锥	马齿	白	白	18.5	4.1	8—10	335	北 京
1		0	6.0			柱	硬粒	黄	白	16.6	4.5		217	北 京
1		0	11.1			锥	硬粒	黄	白	15.5	3.7	12—14	198	北 京
0.5		0	0			柱	马齿	黄	红	17.1	4.2	14—16	238	北 京
0.5		0	1.2			锥	硬粒	白、黄	白	16.7	3.8	10—12	250	北 京
1.0					轻	锥	硬粒	黄	白	15.6	4.1	14	292	北 京
3	2		6.3	粗30.0	轻	锥	中间	黄	白	14.3	4.3	10—14	243	石家庄
3			7.8	粗18.9		锥	中间	黄	白	15.9	4.7	12—16	278	石家庄
2			8.1	粗13.4	中	锥	中间	黄	白	14.7	4.3	12—16	240	石家庄
2			12.5	粗61.6	轻	锥	中间	黄	白、红	15.6	4.7	12—16	335	石家庄
2	1		12.5	粗54.6	轻	锥	硬粒	黄	白	10.8	4.4	14—18	218	石家庄
2			3.1	粗35.5	中	锥	中间	黄	红、白	14.2	4.6	12—16	235	石家庄
2			9.9		中	锥	偏马	白	白	16.8	4.5	10—14	348	石家庄
2			20.0	粗30.0	重	柱	偏马	白	白	16.9	4.6	10—18	312	石家庄
0.5		0	0			柱	马齿	白	白	18.5	4.4	12—14	280	北 京
0.5		0	9.2			柱	偏硬	黄、紫	红、白	18.6	4.3	12—14	277	北 京
		0	13			中间	马齿	淡黄、紫	白	20.9	4.4	12—14	253	北 京
0.5			1.2			中间	偏硬	黄	红	12.4	4.0	14—16	158	北 京

统一 编号	保存单位及编号		品 种 名 称	产地或来源	播种 期	株高 (cm)	穗位高 (cm)	主茎叶 片数	双穗率 (%)	生育 日数
编号	保 存 单 位	编号								
010036	中国农科院品资所	3405	二花头	密 云 县	春	176	76	18		107
010037	中国农科院品资所	3406	白马牙	密 云 县	春	257	131	21	12.3	120
010038	中国农科院品资所	220	墩子黄	顺 义 县	夏	186	66	17	7.2	101
010039	中国农科院品资所	3407	蹲子黄	顺 义 县	春	175	93	20		106
010040	中国农科院品资所	3410	蹲子黄	顺 义 县	春	181	80	17		103
010041	中国农科院品资所	3408	大屁股黄	顺 义 县	春	155	65	19		106
010042	中国农科院品资所	3409	小灯笼红	顺 义 县	春	187	81	19	15.4	106
010043	中国农科院品资所	3411	二黄	顺 义 县	春	173	78	20		106
010044	中国农科院品资所	3414	二黄	顺 义 县	春	179	93	21		109
010045	中国农科院品资所	3412	三黄	顺 义 县	春	174	76	21	6.7	102
010046	中国农科院品资所	3413	金顶黄	顺 义 县	春	147	90	21		107
010047	中国农科院品资所	3415	白马牙	顺 义 县	春	247	127	21		118
010048	中国农科院品资所	3417	九年黄	顺 义 县	春	237	112	20		116
010049	中国农科院品资所	3418	八行白	顺 义 县	春	198	95	19		117
010050	中国农科院品资所	3419	小白磁	顺 义 县	春	174	74	18		108
010051	中国农科院品资所	3420	白磁	顺 义 县	春	254	140	23		117
010052	中国农科院品资所	3416	白磁	顺 义 县	春	243	147	21		112
010053	中国农科院品资所	3421	十二道白	顺 义 县	春	217	112	22	14.1	117
010054	中国农科院品资所	3127	白马牙	平 谷 县	春	239	96	20	1.2	123
010055	中国农科院品资所	3128	八道渠	平 谷 县	春	250	136	23	2.8	125
010056	中国农科院品资所	3131	大八趟	平 谷 县	春	259	129	21	0	123
010057	中国农科院品资所	3144	平抚	平 谷 县	春	201	69	20	3.9	112
010058	中国农科院品资所	3141	黄马牙	平 谷 县	春	260	144	22		
010059	中国农科院品资所	3422	二黄	平 谷 县	春	170	80	20		106
010060	中国农科院品资所	3423	三黄	平 谷 县	春	166	72	18		102
010061	中国农科院品资所	153	籽白	通 县	夏	173	73	17		93
010062	中国农科院品资所	203	窝窝头黄	通 县	春	179	85	19	4.7	93
010063	中国农科院品资所	3424	海里黄	通 县	春	178	81	19		107
010064	中国农科院品资所	3425	红骨头黄玉米	通 县	春	300	103	25		112
010065	中国农科院品资所	3426	黄洋玉米	通 县	春	222	113	21	20.0	111
010066	中国农科院品资所	3427	窝头黄玉米	通 县	春	176	84	19		105
010067	中国农科院品资所	3428	白马牙	通 县	春	235	117	22	15.4	118
010068	中国农科院品资所	3429	八沟白	通 县	春	232	116	21		112
010069	中国农科院品资所	3430	马牙黄	通 县	春	228	112	22		113
010070	中国农科院品资所	3431	白玉米籽白	通 县	春	172	72	20		114
010071	中国农科院品资所	3432	白马牙	通 县	春	174	84	21		110
010072	中国农科院品资所	3140	早熟黄	大 兴 县	春	158	51	16	1.5	101
010073	中国农科院品资所	1092	灯笼红	大 兴 县	春	180	56	17	10.7	101
010074	中国农科院品资所	3433	细皮黄玉米	大 兴 县	春	215	99	21		108

(续)

病 害					倒伏					穗长	穗粗		千粒	观察	备 注
小班	大班	丝穗 (%)	黑粉 病 (%)	其它	度	穗型	粒型	粒色	轴色	(cm)	(cm)	穗行数	重 (g)	地点	
3			6.3	粗33.3	中	锥	中间	黄	白、红	15.5	4.1	12—14	165	石家庄	
1			6.5	粗18.9	重	柱	马齿	白	白	17.0	3.9	12—16	335	石家庄	
1		0	20.0		无	锥	硬粒	黄	白	11.9	5.4	14—16	286	北 京	
3	1			粗14.2	无	锥	中间	黄	白、红	14.2	4.3	12—16	233	石家庄	
2	2		6.7	粗33.3	轻	锥	中间	黄	红	13.0	4.0	12—14	203	石家庄	
			6.3	粗14.2	轻	锥	中间	黄	白	13.0	4.7	12—16	203	石家庄	
3				粗 7.7	无	锥	中间	黄	白、红	13.8	4.2	10—16	233	石家庄	
2			18.8	粗44.1	轻	锥	中间	黄	红	12.7	4.6	14—16	225	石家庄	
2			12.5		中	锥	中间	黄	白、红	13.9	4.6	12—16	280	石家庄	
3			12.5	粗 6.7		锥	中间	黄	红	14.9	4.3	12—16	225	石家庄	
2			6.3	粗33.3	轻	锥	中间	黄	白	10.9	4.7	14—16	223	石家庄	
3			7.7	粗15.4	重	柱	马齿	白	白	18.0	5.1	12—14	340	石家庄	
2			13.3	粗40.0		锥	中间	黄	白、红	16.4	4.5	12—16	256	石家庄	
3				粗33.3		柱	马齿	白	白	14.6	4.0	8—10	353	石家庄	
1			6.3	粗23.1	轻	锥	中间	白	白	14.3	4.2	12—14	245	石家庄	
1			6.3	粗 7.1	轻	锥	中间	白	白	16.6	4.3	10—12	325	石家庄	
2			6.5	粗26.8	轻	锥	中间	白	白	16.5	4.4	12—16	314	石家庄	
2			12.6	粗 6.8	中	柱	马齿	白	白	17.4	4.4	10—14	370	石家庄	
0.5			1.2			柱	马齿	白	白	16.9	4.1	12—14	269	北 京	
1—2		0	1.4			中间	马齿	白	白	14.7	3.7	8	298	北 京	
1		0	0			中间	马齿	白	白	16.8	4.4	8	472	北 京	
0.5		0	4			柱	马齿	白	白	18.9	4.4	10—12	328	北 京	
						中间	马齿	黄侧红	白、浅红	14.3	4.1	12	266	北 京	
1			12.5		轻	锥	中间	黄	红、白	14.0	4.3	12—16	235	石家庄	
2			18.8	粗18.2	中	锥	中间	黄	白	11.4	4.4	14—16	230	石家庄	
						锥	硬粒	白	白	13.0	3.9	14—16	195	北 京	
1—2		0	0		中	锥	硬粒	桔黄	白	8.6	4.2	14—18	176	北 京	
3			17.8	粗25.0	轻	锥	硬粒	黄	红、白	14.0	4.6	16	233	石家庄	
3			12.5	粗33.5	无	柱	偏马	黄	红、白	14.9	4.1	12—16	220	石家庄	
2				粗 6.7	轻	锥	中间	黄	红、白	14.4	4.0	10—16	225	石家庄	
4			50.0	粗23.1	轻	锥	硬粒	黄	白	11.3	4.4	14—16	188	石家庄	
2			10.9	粗30.8	重	柱	马齿	白	白	20.1	4.5	10—16	330	石家庄	
2			12.5	粗13.4	轻	柱	马齿	白	白	17.8	4.0	8—12	361	石家庄	
3			18.8	粗25.0	轻	柱	马齿	黄	红、白	15.1	4.5	12—14	395	石家庄	
2			6.3	粗18.8	轻	锥	中间	白	白	14.2	4.3	14—18	253	石家庄	
1			18.8	粗46.9	无	柱	马齿	白	白	13.9	4.2	12—16	228	石家庄	
		0	1.5			柱	偏马	黄	白	12.6	3.2	12	162	北 京	
		1.1	3.2			锥	硬粒	黄	白	12.9	4.0	14—16	204	北 京	
3			18.8	粗6.7	轻	锥	硬粒	黄	白、红	14.8	4.0	14—16	175	石家庄	

统一 编号	保存单位及编号		品种名称	产地或来源	播种 期	株高 (cm)	穗位高 (cm)	主茎叶 片数	双穗率 (%)	生育 日数
	保 存 单 位	编号								
010075	中国农科院品资所	3434	黄玉米	大 兴 县	春	284	73	22		110
010076	中国农科院品资所	3435	海里红	大 兴 县	春	174	72	20		104
010077	中国农科院品资所	3436	细皮黄玉米	大 兴 县	春	192	90	20		105
010078	中国农科院品资所	3437	二把粗黄玉米	大 兴 县	春	196	99	20		108
010079	中国农科院品资所	3438	二黄玉米	大 兴 县	春	210	105	22		111
010080	中国农科院品资所	3439	红骨头黄马牙	大 兴 县	春	199	98	21		112
010081	中国农科院品资所	3440	红骨头马牙	大 兴 县	春	220	98	21		110
010082	中国农科院品资所	3441	二路快	大 兴 县	春	165	65	18		102
010083	中国农科院品资所	3445	二路快	大 兴 县	春	248	113	21		122
010084	中国农科院品资所	3442	籽黄	大 兴 县	春	198	97	21		109
010085	中国农科院品资所	3443	小籽白	大 兴 县	春	193	88	21		110
010086	中国农科院品资所	3444	民黄	大 兴 县	春	216	113	20		112
010087	中国农科院品资所	3446	红皮黄	大 兴 县	春	212	114	23		115
010088	中国农科院品资所	3447	把粗	大 兴 县	春	173	93	20		110
010089	中国农科院品资所	3448	白马牙	大 兴 县	春	226	103	21		114
010090	中国农科院品资所	3449	大八白	大 兴 县	春	252	161	23		119
010091	中国农科院品资所	3450	白磁	大 兴 县	春	218	90	21		111
010092	中国农科院品资所	3451	洋白	大 兴 县	春	246	132	23		117
010093	中国农科院品资所	3452	八沟白	大 兴 县	春	231	116	24	14.2	118
010094	中国农科院品资所	3459	小八趟	房 山 县	春	193	97	21		117
010095	中国农科院品资所	3453	白马牙	房 山 县	春	203	100	20	20.0	111
010096	中国农科院品资所	3454	二马牙	房 山 县	春	202	110	23	13.4	114
010097	中国农科院品资所	3455	麦茬白玉米	房 山 县	春	175	81	21		107
010098	中国农科院品资所	3456	老鸱嘴	房 山 县	春	161	65	20		104
010099	中国农科院品资所	3457	大白马牙	房 山 县	春	238	142	24	15.6	123
010100	中国农科院品资所	3458	黄马牙	房 山 县	春	258	123	25		117
010101	中国农科院品资所	3460	牛腿粗	房 山 县	春	157	80	19		105
010102	中国农科院品资所	3461	小海里红	房 山 县	春	179	78	18	9.1	110
010103	中国农科院品资所	3462	牛腿粗	房 山 县	春	179	82	20	27.3	110
010104	中国农科院品资所	3463	二茬棒子	房 山 县	春	171	81	21		106
010105	中国农科院品资所	3464	大白马牙	房 山 县	春	240	122	24	15.6	119
010106	中国农科院品资所	3465	白洋磁	房 山 县	春	252	131	20		117
010107	中国农科院品资所	1074	浅黄	北 京 市	春	185	71	18	2.6	103

(续)

病 害					倒伏					穗长	穗粗		千粒	观察	备 注
小斑	大斑	丝穗 (%)	黑粉病 (%)	其它	度	穗型	粒型	粒色	轴色	(cm)	(cm)	穗行数	重 (g)	地点	
4			12.5	粗14.2	轻	柱	偏马	黄	白、红	14.0	4.0	14	223	石家庄	
2			6.7	粗16.4	中	锥	硬粒	黄	白	11.6	4.4	14—18	193	石家庄	
2			3.1	粗 7.7	轻	锥	中间	黄	红、白	15.6	4.5	16—18	215	石家庄	
2				粗 7.7	轻	锥	硬粒	黄	白	15.0	4.9	14—18	390	石家庄	
3			6.3	粗42.6	中	锥	硬粒	黄	白	12.5	3.8	12—18	195	石家庄	
3			12.5	粗30.8	轻	锥	中间	黄	白、红	13.8	4.3	12—18	185	石家庄	
2			6.3	粗31.5	轻	柱	中间	黄	白、红	15.6	4.4	12—16	275	石家庄	
3			12.5	粗11.8	轻	锥	硬粒	黄	白	16.0	3.9	14—18	158	石家庄	
2			4.7	粗16.3	中	柱	马齿	白	白	17.2	4.4	12—16	293	石家庄	
3			6.3	粗18.9	轻	锥	中间	黄	白、红	14.7	4.1	14—18	218	石家庄	
1			12.5	粗13.4	中	锥	中间	白	白	13.6	4.3	16—18	200	石家庄	
2			12.5	粗26.8	轻	锥	中间	黄	白、红	15.0	4.2	14—16	285	石家庄	
3			12.5	粗40.2		锥	硬粒	黄	红、白	15.0	4.4	14—16	275	石家庄	
3	1		25.0	粗20.0	轻	锥	硬粒	黄	白	15.0	4.8	14—16	260	石家庄	
2			3.1	粗13.4	重	柱	马齿	白	白	15.1	4.6	12—14	335	石家庄	
3			6.2	粗40.2	重	锥	马齿	白	白	17.6	4.1	8—14	278	石家庄	
3	2		12.5	粗15.4		柱	硬粒	白	白	16.3	4.2	10—14	302	石家庄	
2			18.8	粗31.5	重	柱	马齿	白	白	15.8	4.3	12—14	272	石家庄	
2				粗14.2	轻	柱	马齿	白	红、白	17.3	4.0	8—10	400	石家庄	
2	1		4.7	粗20.1	无	锥	硬粒	白	白	16.8	3.5	8—12	310	石家庄	
3				粗10.0	轻	柱	马齿	白	白	16.2	4.0	8—14	268	石家庄	
3			31.0	粗26.8		锥	偏马	白	白、红	14.4	3.7	8—12	315	石家庄	
1			13.4	粗20.1	重	锥	硬粒	白	白	14.8	4.0	14—16	225	石家庄	
2			12.5	粗33.5	重	锥	硬粒	黄	白	12.4	4.1	14—16	178	石家庄	
2			12.5	粗21.3	重	柱	中间	白	白	15.1	4.5	12—14	320	石家庄	
2			43.3	粗13.4	中	柱	中间	黄	白	17.4	3.8	12—14	238	石家庄	
3			18.8	粗 7.7	重	锥	硬粒	黄	白	10.9	4.1	14—18	163	石家庄	
4			6.5	54.6	中	锥	硬粒	黄	白	14.0	4.0	12—18	230	石家庄	
2				粗45.5	重	锥	硬粒	黄	白、红	13.1	4.2	16—18	243	石家庄	
1				粗20.1	中	锥	中间	黄	白	13.5	3.9	12—16	215	石家庄	
2			6.3	粗18.9	重	柱	马齿	白	白	16.4	4.3	10—14	366	石家庄	
3			9.9	粗33.5	重	锥	中间	白	白	15.7	4.1	12—14	293	石家庄	
0.5		0	10.4			锥	硬粒	黄	白	14.2	4.0	16	199	北 京	

天津市

统一 编号	保存单位及编号		品种名称	产地或来源	播种	株高	穗位高	主茎叶	双穗率	生育
	保 存 单 位	编号			期	(cm)	(cm)	片数	(%)	日数
020001	河北省农科院农作所	379	二黄	蓟 县	春	169	79	19	0	99
020002	河北省农科院农作所	467	二黄棒子	蓟 县	春	137	51	18	0	100
020003	河北省农科院农作所	488	帮均晚玉米	蓟 县	春	139	56	18	0	100
020004	河北省农科院农作所	518	蓟县白马牙	蓟 县	春	231	150	24	0	118
020005	河北省农科院农作所	531	蓟县八大行	蓟 县	春	223	103	20	0	120
020006	河北省农科院农作所	557	蓟县白玉米	蓟 县	春	237	114	21	0	115
020007	河北省农科院农作所	439	灯笼红	宝 坻 县	春	199	100	22	65.0	111
020008	河北省农科院农作所	559	宝坻金皇后	宝 坻 县	春	211	111	21	20.3	116
020009	河北省农科院农作所	574	宝坻白马牙	宝 坻 县	春	225	107	21	0	116
020010	河北省农科院农作所	52	武清细皮黄	武 清 县	春	194	99	21	0	106
020011	河北省农科院农作所	424	灯笼红晚玉米	武 清 县	春	152	74	18	0	99
020012	河北省农科院农作所	426	大屁股快黄玉米	武 清 县	春	158	69	19	0	103
020013	河北省农科院农作所	427	小粒黄	武 清 县	春	213	110	23	0	113
020014	河北省农科院农作所	431	大塌顶黄	武 清 县	春	243	187	20	16.6	108
020015	河北省农科院农作所	433	本地黄二快子	武 清 县	春	214	110	21	0	105
020016	河北省农科院农作所	440	快红挺	武 清 县	春	187	79	20	0	107
020017	河北省农科院农作所	434	灯笼红	静 海 县	春	221	108	22	0	105
020018	河北省农科院农作所	459	大粒黄	静 海 县	春	200	94	24	0	110
020019	河北省农科院农作所	457	塌顶黄	天 津 市	春	215	106	23	0	114
020020	河北省农科院农作所	580	军粮城白马牙	天 津 市	春	206	122	22	0	113
020021	天津市农科院作物所		小御河	天 津 市	夏	221	84	19		95
020022	天津市板桥试验站		平谷白	北 京	春	243	103		80	
020023	天津市板桥试验站		双桥白	北 京	春	272	124		40	
020024	天津市板桥试验站		小八趟	南 郊 区	春	210	83	13		140
020025	天津市板桥试验站		大屁股快	南 郊 区	5/15	163	67	11		117
020026	天津市板桥试验站		黄硬粒	南 郊 区	5/15	173	79	13		129
020027	天津市板桥试验站		白马牙	北 郊 区	春	220	90	14		150
020028	天津市板桥试验站		白玉米	北 郊 区	春	216	100	14		145
020029	天津市板桥试验站		灯笼红	北 郊 区	5/13	183	80	13		124
020030	天津市板桥试验站		黄马牙	北 仓	5/14	216	96	15		141
020031	天津市板桥试验站		黄马牙	北 仓	5/15	216	96	14		141
020032	天津市板桥试验站		黄玉顶	港 上	春	208	96		30	
020033	天津市板桥试验站		六十日还家	大 港	春	160	50		20	
020034	天津市板桥试验站		黄粒子	天 津	5/13	213	83	12		130
020035	天津市板桥试验站		滚尤白	河北平山县	5/18	203	87	12		142
020036	天津市板桥试验站		黄马牙	河北滦平县	5/14	210	80	14		140
020037	天津市板桥试验站		把粗	河北安国县	春	191	83		10	
020038	天津市板桥试验站		武清多穗	河北农展会	春	270	80	14		140
020039	天津市板桥试验站		白马牙	河 北	春	223	90	13		140

病 害					倒伏					穗长	穗粗		千粒	观察	备 注
小斑	大班	丝穗 (%)	黑粉 (%)	其它	度	穗型	粒型	粒色	轴色	(cm)	(cm)	穗行数	重 (g)	地点	
3			18.8	粗23.1	中	锥	硬粒	黄	白、红	11.6	4.3	14—16	198	石家庄	
3				粗 0	轻	锥	硬粒	黄	白	12.2	4.2	14—16	215	石家庄	
2				粗21.0	无	锥	硬粒	黄	白	11.3	4.7	12—16	170	石家庄	
2			3.1	粗26.8	重	锥	偏马	白	白	15.8	4.3	8—12	348	石家庄	
3	2		12.5	粗10.0	轻	柱	马齿	白	白	16.9	4.3	8—10	413	石家庄	
3			6.5	粗 0	重	柱	中间	白	白	16.1	4.4	12—14	270	石家庄	
3			6.3	粗 7.1	无	锥	中间	黄	白、红	16.4	4.2	12—16	218	石家庄	
4			6.7	粗13.4	重	柱	偏马	黄	白、红	16.3	4.0	12—16	255	石家庄	
1			6.5	粗33.3	轻	柱	马齿	白	白	17.1	4.6	12—14	320	石家庄	
1			25.0	粗21.3	轻	锥	中间	黄	白、红	12.1	4.5	16—18	210	石家庄	
3			10.9	粗14.2	无	锥	硬粒	黄	白	13.5	4.4	12—14	198	石家庄	
2	2		6.3	粗27.3	无	锥	硬粒	黄	白、红	11.5	3.6	14—16	170	石家庄	
3			10.9	粗44.1	无	锥	硬粒	黄	白、红	14.0	4.6	14—18	278	石家庄	
2			12.5	粗16.6	重	锥	硬粒	黄	白	12.5	3.9	12—16	165	石家庄	
3			12.5	粗13.4	轻	柱	偏马	黄	白、红	14.8	4.4	12—18	235	石家庄	
2				粗25.0	轻	锥	偏马	黄	红	14.3	4.4	10—16	285	石家庄	
2	2		12.5	粗20.1	轻	锥	中间	黄	红	14.3	4.2	12—16	243	石家庄	
2			18.8	粗14.2	轻	锥	中间	黄	白、红	13.5	4.5	12—18	280	石家庄	
2			6.5	粗13.4	中	锥	马齿	黄	白、红	15.2	4.8	10—16	333	石家庄	
2			6.5	粗15.4	轻	锥	偏马	白	白	15.5	4.2	8—12	310	石家庄	
						锥	硬粒	黄	白	13.1	4.0	16—18	186	北 京	
		0	0		轻	锥	中间	白	白	17.1	3.9	8—10	372	板 桥	
		0			轻	柱	硬粒	白	白	22.8	4.5	10—14	356	板 桥	
					无	柱	马齿	白	白	18.8	4.1	8—10	425	板 桥	
0	0	0	0		无	锥	中间	淡黄	白	13.3	4.2	14—16	190	板 桥	
					轻	锥	硬粒	黄	白	14.0	4.2	12—14	255	板 桥	
0	0	0	0		无	柱	马齿	白	白	17.3	4.6	12—14	345	板 桥	
					无	柱	马齿	白	白	17.4	4.1	8—10	390	板 桥	
0	0	0	0		无	锥	硬粒	桔黄	白	14.6	4.2	14—16	266	板 桥	
0	0	0	0		轻	柱	马齿	黄	红	18.4	4.9	14—16	305	板 桥	
0	0	0	0		无	柱	马齿	黄	白	19.0	4.7	12—14	310	板 桥	
		0			无	中间	中间	桔黄	白	15.0	4.6	12—14	240	板 桥	
		0			轻	中间	中间	桔黄	白	13.1	4.2	16	246	板 桥	
0	0	0	0		无	柱	马齿	黄	红	19.3	4.2	12—14	260	板 桥	
0	0	0	0		无	柱	中间	白	白	16.1	4.4	12—14	370	板 桥	
0	0	0	0		轻	柱	马齿	黄	红	17.8	4.5	14—16	260	板 桥	
					轻	锥	中间	桔黄	浅红	16.9	4.5	14—16	280	板 桥	
0	0	0	0		轻	锥	硬粒	桔黄	红	16.8	4.3	14	235	板 桥	
0	0	0	0		轻	柱	马齿	白	白	17.8	4.2	10	345	板 桥	

河北省

统一 编号	保存单位及编号		品种名称	产地或来源	播种 期	株高 (cm)	穗位高 (cm)	主茎叶 片数	双穗率 (%)	生育 日数
	保 存 单 位	编 号								
030001	河北省农科院农作所	253	六号乡	张北县	春	106	26	12	0	89
030002	河北省农科院农作所	254	唐贡黄	张北县	春	90	23	12	0	83
030003	河北省农科院农作所	248	战海乡	张北县	春	130	44	13	0	94
030004	河北省农科院农作所	817	崇礼二金黄	崇礼县	春	162	61	17	0	98
030005	河北省农科院农作所	893	小白玉米	赤城县	春	154	42	15	10	89
030006	河北省农科院农作所	027	赤城八道楞	赤城县	春	140	43	15	14.3	95
030007	河北省农科院农作所	087	灯笼红	赤城县	春	188	80	18	0	105
030008	河北省农科院农作所	813	赤城榆钱玉米	赤城县	春	191	89	20	0	112
030009	河北省农科院农作所	814	白面包	赤城县	春	189	94	21	0	112
030010	河北省农科院农作所	891	小黄籽	张家口市	春	204	61	21	0	92
030011	河北省农科院农作所	818	张市二白子	张家口市	春	184	85	20	0	107
030012	河北省农科院农作所	806	张市天津黄	张家口市	春	211	116	22	0	113
030013	河北省农科院农作所	041	黑甜玉米	宣化县	春	145	53	19	0	110
030014	河北省农科院农作所	815	怀来二金黄	怀来县	春	159	83	20	0	105
030015	河北省农科院农作所	805	白马牙	怀来县	春	199	72	19	0	115
030016	河北省农科院农作所	892	灯笼红	怀来县	春	249	119	21	19.0	113
030017	河北省农科院农作所	812	涿鹿黄老八行	涿鹿县	春	189	88	19	0	106
030018	河北省农科院农作所	025	涿鹿老八行	涿鹿县	春	208	97	20	0	116
030019	河北省农科院农作所	807	涿鹿二黄棒子	涿鹿县	春	199	108	24	0	114
030020	河北省农科院农作所	819	涿鹿二白马牙	涿鹿县	春	221	91	22	0	117
030021	河北省农科院农作所	246	二民子	蔚县	春	187	77	19	34.0	102
030022	河北省农科院农作所	88	英粒子	蔚县	春	188	87	20	0	109
030023	河北省农科院农作所	667	围场黄八趟	围场县	春	211	100	19	0	108
030024	河北省农科院农作所	745	老来瘰	围场县	春	184	80	21	0	109
030025	河北省农科院农作所	714	关东洋	围场县	春	297	82	15	0	110
030026	河北省农科院农作所	641	白刺棒子	隆化县	春	111	45	14	0	92
030027	河北省农科院农作所	746	灯笼红	隆化县	春	148	30	12	0	92
030028	河北省农科院农作所	594	九莲灯	隆化县	春	124	42	16	23.1	93
030029	河北省农科院农作所	682	白刺	隆化县	春	131	40	14	0	95
030030	河北省农科院农作所	694	老来瘰	隆化县	春	184	81	20	6.3	109
030031	河北省农科院农作所	680	小黄棒子	隆化县	春	165	51	19	0	101
030032	河北省农科院农作所	634	花花棒子	隆化县	春	170	63	16	27.3	100
030033	河北省农科院农作所	660	老来瘰	隆化县	春	170	74	17	0	105
030034	河北省农科院农作所	635	红棒子	隆化县	春	188	75	21	0	109
030035	河北省农科院农作所	735	大白	隆化县	春	197	102	21	0	111
030036	河北省农科院农作所	665	灯笼红	丰宁县	春	146	59	16	0	103
030037	河北省农科院农作所	637	红棒子	丰宁县	春	181	79	18	0	104
030038	河北省农科院农作所	685	黄老来瘰	丰宁县	春	219	105	21	0	110
030039	河北省农科院农作所	713	丰宁黄马牙	丰宁县	春	188	86	19	0	106