


江西中药

(下集)

江西省中医药研究所编
江西人民出版社





江 西 中 藥

· (下 集)

江西省中藥研究所編

江 西 人 民 出 版 社

江 西 中 藥
(下集)

江西省中醫藥研究所編

*

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11號)

(江西省書刊出版業營業許可證出字第1號)

江西印刷公司印刷 江西省新華書店發行

*

書號：(2081)

開本：787×1092 1/25 印張：7 1/2 字數：151,600

1930年12月第一版

1930年12月第一版第一次印刷

印數：1—2,300

統一書號：14110·40

定價：(3) 六角二分

· 內 容 提 要

本書搜集了我省出产的药材一百种，將它們的名称、俗名、概說、产地、来源、植物形态、生药性状、栽培与采制、商品规格、成分、效用、附方、用量、加工炮制、貯藏等項，都作了詳細敘述，并有实物标本照片。其中經大部分取材是根据我省的实践经验，通过整理編写出来的。这对今后发展药材生产及中医药研究，提供了现实資料。

目 录

十大功劳·····	(3)	西河柳·····	(43)
女贞·····	(4)	刘寄奴·····	(44)
大青·····	(6)	杜衡·····	(46)
大活血·····	(8)	角蒿·····	(47)
千金藤·····	(10)	谷精草·····	(49)
土荆芥·····	(12)	旱莲草·····	(51)
木槿花·····	(13)	明党参·····	(53)
木芙蓉·····	(14)	虎骨·····	(55)
五加·····	(17)	刺楸·····	(57)
五味子·····	(19)	芫花·····	(58)
五倍子·····	(21)	夜明砂·····	(60)
凤仙·····	(23)	青黛·····	(62)
凤尾伸筋·····	(24)	卷柏·····	(65)
石耳·····	(26)	闹羊花·····	(67)
石杉子·····	(28)	南天烛·····	(68)
石韮·····	(29)	飞来鹤·····	(70)
白花蛇·····	(31)	韭子·····	(71)
白毛藤·····	(33)	红木香·····	(73)
白芍·····	(34)	红娘·····	(75)
仙茅·····	(37)	枸骨·····	(76)
瓜瓣·····	(38)	穿山甲·····	(77)
地南蛇·····	(40)	枳椇子·····	(79)
地锦·····	(41)	郁李仁·····	(81)

胡葵	(82)	斑蝥	(132)
射干	(84)	滑石	(133)
馬尾伸筋	(86)	藜蘆	(135)
海風藤	(88)	菟葵	(137)
龟甲	(89)	蜂蜜(附:蜜蠟)	(138)
烏梅	(91)	鸡内金	(141)
桑	(93)	鸡冠花	(143)
桑螵蛸	(97)	榧实	(144)
柴胡	(99)	銀杏	(146)
党参	(101)	薤白	(148)
側柏	(102)	衛矛	(149)
蛇蛻	(104)	蝟	(151)
莪朮	(106)	藕蓮(附:蓮子、蓮須、蓮心、藕節)	(152)
旋復花	(107)	澤兰	(156)
望月砂	(109)	澤漆	(158)
貯醬	(110)	澤瀉	(160)
鹿啣草	(112)	蜜虫	(164)
紫荊	(114)	樗樹皮	(165)
紫花地丁	(115)	鴨跖草	(167)
紫蘇(附:蘇子)	(117)	薤白	(168)
紫葳	(119)	瞿麥	(170)
萊菔子	(121)	鵝不食草	(172)
預知子	(122)	蘿豆(附:扁豆花及衣)	(174)
絲瓜絡	(124)	蟬蛻	(176)
絡石	(126)	覆盆子	(178)
黃柏	(128)	鶴龜	(180)
革鱗	(130)	鱉甲	(181)

十大功劳

概 說：本品植物名实图考載有二种。本草綱目載：有枸骨，亦名貓儿刺。据中国葯用植物志載枸骨属冬青科，别名十大功劳，而經濟植物手冊所載的十大功劳属小檗科植物，别名貓儿头，供葯用，其又在冬青科內將枸骨与貓儿刺分別記載，或为两个品种，名称大多繁复，为求实用，似宜訂正，以免用葯訛誤。查十大功劳在我国有24种，特提出以供参考。

产 地：本省上犹、广昌、永修、宜丰等县，均有小量出产。

来 源：本品系小檗科植物十大功劳，其干燥之根、叶及种子，均供葯用。

植物形态：本植物为常綠灌木。莖粗壮直立，全体光滑无毛，莖干木材为黄棕色。叶枝为紫色，叶抱莖互生，长约20—30厘米，亦有甚长者，为奇数羽状复叶，具叶柄，叶柄基部較扁寬成鞘狀，叶軸上有节，小叶着生于节上，小叶通常为4—7对，革质而厚，对生，无柄，近叶柄部的小叶較小，小叶呈广卵狀矩圆形，先端漸尖而有銳刺，邊緣反卷，每側有3—7个大刺齿，基部



上犹十大功劳

兩側不等，一側呈圓形，一側近于截形而傾斜。三月間，枝梢葉叢間抽生數個花梗，花黃色，微垂，兩性排列成總狀花序。果實為漿果，卵圓形，先端柱頭宿存，熟後呈暗紫藍色，表面披有白粉。

生藥性狀：本品呈圓柱形，長達50—60厘米，直徑約1.5—2厘米，外表灰棕色，呈多數不規則龜裂，並有圓形突出之支根痕跡，質堅硬，不易折斷，斷面鮮黃色，纖維狀，皮部與木質部易分離，味苦。

栽培與採制：七至十二月連根掘起，斬去莖葉，放日光下曬干。

商品規格：以色黃粗逾手指者為佳。

據文獻記載：本品含小蘗鹼等

效 用：

1. 苦涼無毒，涼血清熱，凡虛熱、骨蒸、腰膝酸軟等之由於血虛有熱者，皆主治之。

2. 藏器云：“其皮堪浸酒，補腰膝令健，枝葉燒灰，淋汁，或煎膏塗白癩風”。希雍云：“枸骨，本經附女冬條下，不載氣味所主”。按：本品明以前本草常與冬青科枸骨，混而不分。

3. 近時用作清涼性滋養藥，適用於肺結核之潮熱，及頭暈、耳鳴、腰酸、腳軟等症，久服有效。

用 量：一日量，二錢至五錢，作煎劑，或茶劑。

加工炮制：用清水浸八至十六小時，再洗淨，潤透，切成一分厚的斜片，曬干即成。

貯 藏：用簍包裝，置干燥處。

女 貞

概 說：本品神農本草經列為上品。本草綱目稱：冬青葉厚而柔長，綠色，面青背淡，女貞葉長者四、五寸，子黑色，凍青葉微圓，子紅色為異，又女貞樹能放蠟蟲，其製造之白蠟，亦供藥用。

产地：主产本省吉水县，次为吉安县。其他泰和、新淦、遂川、永丰、安福、万安、南康、广丰、余江、龙南、贵谿、永新等县均有出产。

来源：本品系木犀科植物女贞，其干燥果实供药用。

植物形态：本植物为常绿小乔木。茎高数米，叶对生，革质，呈卵圆形、尖端圆，基部楔形，边缘有锯齿。夏日于叶腋生花簇，花白色，果实球形大如赤小豆，黑色有长柄。

生药性状：本品呈长椭圆形，纵6—8毫米，横4—5毫米，外表紫黑色或黑蓝色，有不规则的皱缩，形成网状。果皮软而薄，果内黄赤色，颗粒状，附着种子的一面微呈纤维状。种子一枚，黑褐色，椭圆形，背面隆起，另一面平直，有平行纵皱，质较软，种仁黄白色，油润，味甘苦。

栽培与采制：十一至十二月摘取成熟的果实，放木甑中，隔水蒸之，俟蒸气上腾约五分钟，取出，晒干。

商品规格：以身干、颗粒大而饱满，皮色灰黑而不皱缩者为佳。

成分：

1. 水浸液加新制Fehling's 试液，共热，有砖红色沉淀生成。另取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，用鹼中和，再加Fehling's 液，加热，有砖红色沉淀生成，其量比未水解者为多。（貳）

2. 水浸液加α-萘酚，再沿管壁滴入浓硫酸，于交界处有紫色环



南昌女贞

RAN 32/01

生成。(还原性糖)

3.水浸液加 FeCl_3 生成綠色。

4.与生物鹼沉淀剂的反应:

(1)与Wagner's 試剂反应生成棕色沉淀。

(2)与Mayer's 試剂反应生成淡桔紅色沉淀。

(3)与苦味酸試液反应生成黃白色沉淀。

5.脂肪。

据文献記載:本品含甙,木蜜醇、葡萄糖、軟脂酸、硬脂酸、油酸及多量脂肪等成分。

效 用:

1.甘苦平无毒,补肝肾,健腰膝,烏須明目,凡阴虛发热,腰膝痠軟,眩暈目昏等之由于肝肾阴亏者,皆主治之。

2.本經云:“主补中安五脏,养精神、除百病”。时珍謂其“强阴健腰膝、变白发、明目”。希雍謂“此药气味俱阴,正入肾除热补精之要品”。

3.近时用作滋養性强壮药,适用于骨蒸、潮热、头暈、心悸、目眩、耳鳴、失眠、遺精等症。

附 方:二至丸(簡便方):治虛損百病,头发早白等。用女贞实阴干(酒浸一日,蒸透晒干)二十兩,桑椹子(阴干)十兩,旱蓮草(阴干)十兩,共研末,炼蜜为丸。每服三錢,空腹时用淡盐湯或盐酒送下。

用 量:一日量,一錢二分至三錢,作煎剂或丸剂。

貯 藏:宜用箱裝封固,放置高燥处,以防受潮生霉及虫蛀。

大 青

俗 名:臭虫柴、鬼灯火。

概 說:名医別录列为中品。本草綱目称:莖圓,叶长三、四

寸，面青背淡，对节而生，八月开小花，紅色成簇，結青 实大如椒
類，九月色赤。本品为有效之抗生药，治热性傳染病，甚有功效，但
类似品种頗多，尚須作进一步研究。

产 地：本省各地均有出产。

来 源：本品系馬鞭草科植物大青，其干燥叶供药用。

植物形态：本植物为落叶灌木。枝条黄褐色，幼时有毛，旋即脫
落。叶对生，为长卵圆形，长
17.5厘米，寬0.5厘米，先端脫
尖或漸尖，邊緣微呈波狀或罕
有鋸齿，基部圓形或漸尖，叶
脉明显突出于背面，有长约6
厘米的沟狀叶柄。頂生繖房狀
圓錐花序，花冠管狀，白色，
外面有毛。果实为漿果，呈
倒卵形或球形，具有宿存的
萼。



上 統 大 青

生藥性狀：本品 呈黃綠
色，广披針形，长约14—16厘
米，寬約5—6厘米，表面光滑
无毛，常皺縮，叶柄有縱皺紋，
常扭曲，叶脉为明显之网状脉，
主脉突出于背面，质脆易碎，
有特殊微臭，味苦。

栽培与采制：六至八月，連莖叶采来，置日光中晒干。

商品規格：以叶色青綠者为佳。

据文献記載：本品含大青素。

效 用：

1. 苦大寒无毒，退热解毒，凡时行头痛，大热口疮等之由于热毒

者，均主治之。

2. 弘景謂其“除时行热毒甚良”。甄权用以“治溫疫寒热”。时珍謂其“主热毒痢、黄疸、喉痺、丹毒”等。士材云：“古方不用，阴寒之物，只宜祛除天行热病，而不可施于虛寒脾弱之人”。

3. 近时用作解热、解毒药，适用于斑疹伤寒、急性热病、扁桃腺炎、急性喉头炎、猩紅热、丹毒及吐血、衄血等症。

附 方：犀角大青湯：治伤寒发赤斑、心煩痛。大青叶七錢五分，犀角二錢五分，梔子十枚，淡豆豉四錢，水煎，一日三次分服。

用 量：一日量，干者一錢五分至三錢。鮮者五錢至一两，作煎剂。

加工炮制：用清水洗淨，切成四分长横片，晒干。

貯 藏：原料：用簍裝。飲片：用木箱裝。

大 活 血

俗 名：过山龙、活血藤、血灌腸。

概 說：本品載宋图經本草。本草綱目在茜草附录中記有血藤条。李时珍称：“按虞搏云，血藤即过山龙未知的否”。据植物名实图考载大血藤即千年健，土名大活血，今江西庐山多有之。又称：“思长数尺，外紫内白，有菊花心，搗白曝之，紫液津潤，酒浸一宿紅艳如血”。但另载有过山龙一种，与大活血为同名異物，而与茜草则更不相类似，特提出以供参考。

产 地：主产本省都昌、丰城、吉安、全南、九江等县。次为永新、武宁、德安、乐平、鉛山、上犹。其他如彭澤、湖口、新干、吉水、信丰、南康、贛县、于都、永修、兴国、会昌、瑞金、大余、崇义、宜春、宜丰、定南各县，均有出产。

来 源：本品系大血藤科植物，大血藤（土名大活血），其干燥莖供药用。

植物形态：本植物为落叶攀缘灌木，高达10米，圆形褐色，具有纵行条纹。叶互生，为三出复叶，中间为小叶菱状卵形，有短叶柄，两侧的小叶斜卵形，无叶柄，先端均尖，叶脉明显突出于背面，革质光滑，有长约5.6厘米之总叶柄。春日于叶腋抽生花茎，花排列成总状花序，下垂，长达10厘米余，雄花黄色，长圆形，有六片萼片及六片花瓣，雌花生有六枚不发育的雄蕊，雌蕊很多。结浆果，内含黑色光滑卵形种子。

生药性状：本品为圆柱形，多弯曲，常截成尺余的段落，长约2厘米，外表赤褐色，有断续屈曲的纵皱，并有横裂痕，质硬而韧，不易折断，横断面外紫内白，有菊花心，紫色部分质坚实，白色部分质疏松，有多数圆形小孔，味涩微苦。

栽培与采制：十至十二月采取长藤，去枝叶，斩成一尺五寸左右为一段，置日光下晒干。



都昌大活血

商品规格：以肉色红而带黄，有车轮纹理，色彩鲜明者为佳；色变灰黑者次之。

成 分：

1. 水浸液振荡之，有持久性泡沫生成（皂甙等）。
2. 水浸液加新制Fehling's 试液，共热，生成砖红色沉淀。另取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，用鹼中和，再加Fehling's 试液，共热，生成砖红色沉淀，其量比未水解时多（甙）。
3. 水浸液加 α -萘酚，再沿壁滴入浓硫酸，在交界处有不十分明显的紫色环生成。
4. 水浸液加 $FeCl_3$ 试液有棕绿色沉淀生成。

5. 与生物檢沉淀剂反应:

(1) 与Wagner's 試剂反应呈阴性。

(2) 与Mayer's 試剂反应呈阴性。

(3) 与苦味酸試液生成白色沉淀。

(4) 与鞣酸試液生成淡棕白色沉淀。

6. 与 $Pb(AC)$ 試剂生成淡紅白色沉淀。

效 用: 味澀微苦, 一般配伍他药, 用于風湿病及跌打损伤等症。

用 量: 一日量, 三錢至五錢, 作煎剂服。

加工炮制: 用清水浸二日, 取出潤透, 剉成橫片, 晒干。

貯 藏: 原料: 捆裝。飲片: 用木箱裝。

千 金 藤

俗 名: 安痛藤。

概 說: 本品載宋开宝本草。1952年江西中医藥月刊第8期刊載“安痛藤”, 据称为治風湿痛的有效藥物, 亦即本植物的民間习用藥, 近年我省部分中医师, 已在采用。

产 地: 本省宜春县为主要产区, 萍乡、安福等县次之。

来 源: 本品系防己科植物千金苻, 其干燥之莖供药用。

植物形态: 本植物为多年生藤本。莖扭曲, 常纏繞于岩山或大树之上, 可伸展甚长, 表面具有縱行条紋。叶互生, 大小不一, 呈心臟形, 长寬几相等, 約1.2—9厘米, 先端圓尖, 全緣或略呈波狀, 基部微凹呈心臟形, 有細長約7厘米之叶柄, 叶柄不生于叶基部, 而生于叶基部下約1厘米之叶背面, 叶脉掌狀, 腹面疏生細小短毛。春末于叶腋抽生花莖, 花小, 呈圓錐花序, 花后結黑色球形小漿果。

生药性狀: 本品呈圓柱狀, 外表灰褐色, 上具众多的縱皺, 膨大处似节長約22厘米, 直徑約2厘米, 質堅硬, 不易折断, 断面黃白

色，纖維狀；皮層與木質部分層
明顯，木質部似蜂窩狀而較小，
味淡。

栽培與採制：六至八月採取
長藤，去枝葉，斬成一尺五寸左
右為一段，置日光下晒干。

商品規格：以色褐，中有細
孔，吸其此端，外氣能自彼端透
入者為佳。

成 分：

1. 水浸液加入 α -萘酚，再
沿壁滴入濃硫酸，在交界處有紫
色環生成。

2. 水浸液加新制Fehling's試
液，共熱，生成磚紅色沉淀。另

宜春千金藤

取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，使其水解後用鹼中和之，再加Feh
ling's試液，共熱，生成磚紅色沉淀，其量較未水解時為多。

3. 與生物鹼沉淀劑反應呈陰性。

4. 與 $Pb(AC)_2$ 試液反應生成淡黃色沉淀。

效 用：


1. 味淡無毒，活血行氣，消癰解毒，凡瘰癧、痰嗽、癰腫等之由
於血毒者，均主治之。

2. 藏器用於一切血毒諸氣，霍亂中惡、天行虛勞、瘧瘴、痰嗽不
利，癰腫大毒等症。

3. 近時我省部分中醫用作鎮痛藥，擬名“安痛藤”，應用於關節
疼痛等症，經驗有效。

用 量：一日量，三錢至五錢，作煎劑。

加工炮制：用清水浸二天，取出潤透，剉橫片，晒干。



貯藏：原料：捆裝，飲片：用木箱裝，放干燥处。

土荆芥

概說：本品見植物名实图考。赵学敏称：“土人以代假苏”。查本品为有毒植物，与荆芥不同，不可不知。其挥发油为有效的驱虫剂。

产地：本省贵谿、南昌、新建等县均有出产，亦有家种。

来源：本品系藜科植物土荆芥，其干燥全草供药用。

植物形态：本植物为一年生草本，野生于廢圩間，亦有家种。莖圓形，高达1米，色淡綠，有綫稜。叶互生，披針形，大小不等，先端圓尖，邊緣呈鋸齒狀，基部楔形，有短叶柄。夏日叶腋間抽生排列成复穗狀花序的細小花朵，色綠，莖叶都有一种不快的香气。



貴谿土荆芥

生藥性狀：本品呈黃綠色。莖柔軟，长达1米許，色淡綠，有綫稜。叶互生，披針形，邊緣微呈鋸齒狀，叶腋間开細小的花，呈綠色。莖叶均有一种不快的香气，味辛。

栽培与采制：八月間拔取全草，去根，晒燥。

商品規格：以全草去根，色黃綠，身干无杂者为佳。

成分：

据文献記載：本品含精油，P-Cymol.

D-Terpinen. P-Ment

hadien 1-limonen,

Salicylsanrene—thyester, AAskaridol,

ASkardolglykolan—hydrid, ASaridolglykol. 及酪酸等。

效 用:

1. 辛凉, 有小毒, 健胃通經, 凡消化不良, 妇人經閉等之由于風熱者, 均主治之。

2. 方书用其生叶揉碎, 外貼毒虫刺伤。

3. 近时用作芳香健胃药, 适用于鉤虫, 消化不良, 胃腸充气, 及月經閉止, 痛經等症。

用 量: 一日量, 一錢五分至三錢, 作煎剂分服。

加工炮制: 抖淨砂土, 去兜, 洗淨, 晾去水分, 切成三分长横片, 晒干。

貯 藏: 原料: 用簍裝。飲片: 用木箱裝, 放阴涼干爽处。

木 槿 花

俗 名: 打碗花。

概 說: 本品見日本本草。花白或粉紅, 民間有用白花与山雅雀同煮食, 能止鼻血, 又其根皮制成流浸膏治香港脚, 均有良效。

产 地: 本省各地均有小量出产。

来 源: 本品系錦葵科植物木槿, 其干燥之花供药用。

植物形态: 本植物为落叶小灌木。莖高三米余, 枝条較軟, 圓形, 色棕紅, 有白色疏柔毛。叶互生, 为楔狀卵形, 長約3.7厘米, 寬約2.2厘米, 先端尖, 邊緣往往为三淺裂, 呈齿牙狀, 基部楔形, 叶脉五出, 有叶柄, 長約1.3厘米, 扁圓形, 腹面有毛。六、七月間于莖頂叶腋間开花, 有重瓣与单瓣二种, 色白或淡紫, 外有六片綫狀苞片, 中有五片橢圓形萼片, 基部癒合, 花瓣五片, 为离瓣花, 呈斜倒卵圓形, 雄蕊多数, 花后結蒴果, 有毛, 种子也有毛。