


# 中国野生动物集锦·2·



高等教育出版社

《中国野生动物集锦》收有我国野生动物——第二集16幅，  
包括鸟类的丹顶鹤、白鹤、黑鹤、大天鹅、疣鼻  
、腹锦鸡、血雉、白  
、绿孔雀、花尾榛鸡、白尾海雕、虎头海雕等14种和爬行类的圆鼻巨蜥、大壁虎(蛤蚧)等  
2种。可供初中动物学教学和一般爱好动物的读者参考用。

忻丁斌摄影 洪 波编文 余家骥校订 上海教育出版社出版 上海发行所发行 上海市印刷一厂印刷 (全套16幅)定价: 0.79 元  
开本 787×1092 1/64 印张 0.5 1982 年 9 月第 1 版 1982 年 9 月第 1 次印刷 印数: 00,001—18,000 统一书号: 7150·图片 1686



褐马鸡 (*Crossoptilon mantchuricum* Swinhoe) 又叫  
鹏鸡、角鸡。属马鸡、鸡形目、雉科。雄鸟体长约 100 厘米。体  
羽大部分黑褐色。眼周裸出,呈红色。喙和上喉白色。耳羽向头  
后延长,成角状,白色。腰羽和尾上覆羽银白色。尾羽基端银白,  
末端转黑而有紫蓝色金属光泽。脚上有距。雌鸟稍小,羽色与雄  
鸟相似。脚上无距。

## 褐马鸡 Brown eyed pheasant

生活在海拔 2000 米以上的高山深林中。不善飞翔,但善奔跑。  
常结成小群在山溪处饮水。荤食。食性杂。主食植物的块茎、细  
根和果实。也吃植物的叶。芽。种子和果实。巢营于灌木丛间的  
地面凹处。每窝产卵 10—14 枚。

产于内蒙古西南东北部、甘肃西部、四川北部、河北西北部  
和山西北部。



此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)


## 人壁虎 Tokay

人壁虎 (*Gekko gecko* Linnaeus) 2 枚

同胎卵 腹部有斑, 有鳞目, 壁虎科 全长可达 30 厘米 尾与体等长或几于等长 头极大 于头宽 头前鳞片细小, 呈菱形形, 有活动的眼睑 指、趾宽大 头面甚侧行灰色, 体躯背面紫灰色, 有红色和蓝灰色斑点 腹面灰白色 尾部暗灰色, 有 2 条深褐色相间的横

生活于荒野的石灰岩缝或树洞里 夜间活动 主食昆虫, 也吃蜘蛛和小型鸟等 鸣声“啾—啾—”, 因而得名 3—8 月为繁殖期 每产卵 2 枚 在我国, 产于广东、广西、云南、福建、台湾等地





### 虎头海雕 Kamchatkan sea eagle

虎头海雕(*Haliaeetus pelagicus* Pallas) 又叫虎头雕、海雕。属鸟纲, 隼形目, 鹰科。是海雕中最大而最凶猛的一种。体最长可达100厘米。全身羽毛大都褐色, 仅额、尾白色。嘴厚而长。跖趾只在上部被羽毛。

生活在近海岸的河流、湖泊岸边, 有时也飞到山地的河溪附近。

这一飞翔缓慢, 往往抖动两翼, 在空中滑翔, 或作圈状翱翔。多单独生活, 迁徙时形成小群。主食鱼类, 也吃鸟、兽, 饥饿时可食腐肉。巢筑于白桦、松树上, 或海岸的岩壁上。5月产卵, 每产2枚。

产于我国辽宁旅顺、营口和河北。



## 白 鹳 White stork

白鹳 (*Ciconia ciconia* Linnaeus) 又叫老鹳。属鸟纲，鹳形目，鹳科。体长在100厘米以上。全身大部白色，翅上大覆羽黑褐。颈长而直。翼长大，尾甚短。


生活在溪流附近。飞翔轻快。夜宿高树。常结成小群或单独地在池塘、沼泽的浅水里或呆立在水边觅食。以鱼、蚌、蛙、蛇

和昆虫等为食。巢筑在松树或老橡树上。在北方，3月开始繁殖。每产卵3—5枚。

产于我国新疆西部、内蒙古东北部、东北各省和长江下游等地。数量极少。



此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)



### 白尾海雕 White-tailed sea eagle

白尾海雕 [*Haliaeetus albicilla* (Linnacus)] 又叫站白雕、芝麻雕、黄嘴雕。属鸟纲，隼形目，鹰科。体最长可达80厘米。头部羽毛白色，颈有褐斑。上体暗灰色，上背杂有浓褐色羽毛。胸、腹部褐红色，有灰褐色斑，羽缘色较淡。尾纯白色。雌鸟羽色似雄鸟，但体形较大。


生活在海滨、江河附近的广大沼泽地。有时离水很远，可达草原或海拔1400—1500米的高山上。除繁殖期有幼鸟伴随外，均

单独生活。飞行较迟缓。以鱼类和其他鸟类、小型兽类为食，也吃腐尸。食量很大，但能长期不食。巢筑在海岸边的悬崖或乔木崖上，一般距地面20米左右。2月下旬至4月中旬产卵，每产2枚。孵化期35天。

在我国东北和长江下游一带繁殖，迁徙时遍布华北一带，越冬在长江以南沿海地区。

（中国科学院南京鸟类研究所）





### 疣鼻天鹅 Mute swan


疣鼻天鹅 [*Cygnus olor* (Gmelin)] 又叫赤鼻天鹅。属鸟纲，雁形目，鸭科。它最显著的特征是嘴基部有一瘤状突起。嘴红色，颈极长。羽毛纯白色。雄鹅全长最大可达130厘米。雌鹅较小。

群栖于江河、湖泊地带。飞行快速而高。筑巢在长有芦苇、高

草丛的湖沼地上，也有浮在水面上的。主食水生植物和鱼、虾。每年4—5月繁殖，每窝产卵8枚，孵化期35—40天。

分布极广。产于我国新疆、青海、甘肃、内蒙古、四川、东北各省、河北、山东、江苏、台湾等地。





### 丹顶鹤 Red-crowned crane

丹顶鹤 (*Grus japonensis*) (P. L. S. Muller) 又叫仙鹤、  
属鸟纲、鹤形目、鹤科。体最长可达170厘米以上。全身羽毛几乎  
纯白色。头顶皮肤裸露，呈朱红色。次级和三级飞羽黑色，形长  
而弯曲成弓状，覆于整个白色尾羽上，因此常被人们误为尾羽。尾  
短。喙、颈和跗蹠都长。

生活在芦苇、草丛沼泽地带。飞翔力强。每年作季节性迁移。

鸣声响亮，可传到两、三里外，正是“鹤鸣九皋，声闻于天”。最喜  
筑成对居于近水浅滩。取食鱼、虾以及蚌类等，也吃水草、稻谷。  
产卵于巢内，每产1—2枚，以1卵为主。卵产后即孵。雌雄轮流孵。  
孵化期为30—35天。幼鸟易于饲养，并能与饲养员建立感情。

主产于我国黑龙江及苏联西伯利亚东部和朝鲜，越冬时迁到  
长江下游一带。数量极少，是我国特产的稀有珍禽。



此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)