



考研必备(2001年版)

数学

全真模拟 经典320题 【经济类】

主编 中国人民大学 袁荫棠
清华大学 李永乐
北京大学 范培华

国家行政学院出版社

考研必备(2001 年版)

数学全真模拟经典 320 题

(经济类)

主 编	中国人民大学	袁荫棠
	清华大学	李永乐
	北京大学	范培华
编 者	(以姓氏笔画为序)	
	北京大学	刘西垣
	清华大学	李永乐
	北京大学	范培华
	中国人民大学	袁荫棠
	天津财经学院	鹿立江
	东北财经大学	龚兆仁

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

数学全真模拟经典 320 题:经济类/袁荫棠,李永乐,范培华主编. —北京:国家行政学院出版社, 2000.6

(考研必备)

ISBN 7-80140-118-2

I. 数… II. ①袁… ②李… ③范… III. 高等数学-研究生-入学考试-自学参考资料
IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 24019 号

考研必备(2001 年版)

数学全真模拟经典 320 题

[经济类]

袁荫棠 李永乐 范培华 主编

*

国家行政学院出版社出版发行

北京市海淀区厂洼街 11 号

邮政编码:100089

发行部电话:68929037 68929098

新华书店经销

北京市朝阳区印刷厂印刷

√

787×1092 1/16 开本 16.25 印张 360 千字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—10000 册

ISBN 7-80140-118-2/O·9 定价:22.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

本书是《2001 年考研数学复习全书》(经济类)的姊妹篇。为了使考研同学更好地提高数学水平,检查第一阶段对数学基本概念、公式、定理及运算法则的复习效果,查漏补缺,提高应战能力,积累临场经验,作者深入研究了近年来考研命题规律及特点,分析了历年考研试题的考点分布及难易程度,并结合作者多年来数学阅卷以及全国各大城市“考研班”辅导的经验,编写了这本实战训练题集——《2001 年考研数学全真模拟经典 320 题》(经济类)。

本书特点:

1. 每题均全新优化设计,且试题涵盖大纲所有考查知识点

2000 年考研数学试卷三与试卷四共有 40 道题,其中填空题与选择题 20 道题,解答题与证明题 20 道题。为使考研同学考前多一些查漏补缺的机会,多见一些新题型,多一些针对性,考试中多一份把握,我们特优化设计或改编了 16 套共 320 道模拟试题,这 16 套共 320 道题构思新颖、方法灵活;在内容设计上,每道题均涉及两个以上知识点,有些综合题甚至涉及到 3 个考点或更多,这些题涵盖新大纲所有考查知识点。通过这 16 套全新优化设计的试题训练,我们相信一定能提高您的数学的分析问题、解决问题的能力。

2. 注重归纳总结,力求一题多解

我们在设计这 16 套试题时,无论是填空题、选择题,还是计算题与证明题,绝大部分题都设有①分析——该题的解题步骤和解题思路、方法;②解答——该题的详细、规范解题过程;③评注——该题所考查的知识点(或命题意图)、解题思路归纳总结和延伸、常见错误和注意事项。同时,在解题过程中,力求一题多解,扩展考生的视野和思路,比较各种解题方法的特点和适用范围,从而提高考生的应试水平。

本书使用说明:

1. 本书是依据最新精神为 2001 年考研读者全新优化设计的一本训练题集,本书中的试题难度略高于 2000 年考研试题,解答题与证明题体现了考试重点、难点内容,综合性比较强;填空题与选择题着重考查考生对基本概念、基本公式、基本定理的理解

和运用,适用于第二阶段复习训练之用。

2. 本书中的每道题均有较透彻的分析、详细解答、归纳总结的评注,因此希望考生在做题时,如果遇到了困难,不要急于看分析和解答,一定要多思考,只有这样才能达到本书编写的目的,才能提高应试水平,才能取得好成绩。

3. 考生在使用本书之前,应仔细研读《2001 年考研数学复习全书》(经济类),弄清《考试大纲》中要求掌握的基本概念、基本定理和基本方法,掌握《2001 年考研数学复习全书》(经济类)中所介绍的解题方法、技巧和思路。

在本书的编写、编辑和成书过程中,由于时间紧、任务重,尽管我们认真对待和严格要求,仍难免有不尽如意的地方,诚请广大读者和同行批评指正。

祝愿同学复习顺利,考试成功,心想事成!

编者

2000 年 6 月

目 录

第一部分 考研数学命题规律与注意事项	(1)
一、考研数学入学考试性质及命题的基本原则	(1)
二、数学三与数学四的试卷结构以及各类题的考查目标	(1)
三、考研数学试题的特点	(2)
四、考生复习中应注意的问题	(12)
第二部分 全真模拟经典 320 题	(13)
数学三全真模拟经典题详解	
模拟试题(I)	(15)
模拟试题(I)答案及详解	(20)
模拟试题(II)	(28)
模拟试题(II)答案及详解	(33)
模拟试题(III)	(42)
模拟试题(III)答案及详解	(47)
模拟试题(IV)	(57)
模拟试题(IV)答案及详解	(61)
模拟试题(V)	(69)
模拟试题(V)答案及详解	(73)
模拟试题(VI)	(83)
模拟试题(VI)答案及详解	(87)
模拟试题(VII)	(96)
模拟试题(VII)答案及详解	(101)
模拟试题(VIII)	(114)
模拟试题(VIII)答案及详解	(118)
数学四全真模拟经典题详解	
模拟试题(I)	(131)
模拟试题(I)答案及详解	(135)
模拟试题(II)	(142)
模拟试题(II)答案及详解	(147)
模拟试题(III)	(155)
模拟试题(III)答案及详解	(160)
模拟试题(IV)	(167)
模拟试题(IV)答案及详解	(172)
模拟试题(V)	(181)
模拟试题(V)答案及详解	(186)
模拟试题(VI)	(194)

模拟试题(Ⅵ)答案及详解·····	(198)
模拟试题(Ⅶ)·····	(206)
模拟试题(Ⅶ)答案及详解·····	(210)
模拟试题(Ⅷ)·····	(221)
模拟试题(Ⅷ)答案及详解·····	(226)

附录:

2000 年硕士研究生入学考试数学三试题参考解答 ·····	(236)
2000 年硕士研究生入学考试数学四试题参考解答 ·····	(244)

第一部分 考研数学命题规律与注意事项

一、考研数学入学考试性质及命题的基本原则

根据教育部颁布的“数学考试大纲”,考生应当明确研究生的入学考试是一种“具有选拔功能的水平考试”.这种考试既要有利于国家选拔出高层次人才,继续深造攻读硕士学位,同时,又要促进高校数学课的教学改革,教学质量的提高.

教育部考试中心制定了命题的基本原则,从中我们可以得到许多重要信息,诸如:严格按照教育部颁布的考试大纲所规定的考试内容与考试要求进行命题,试题以考查三基(基本概念、基本方法和基本原理)为主,并加强对考生的运算能力、逻辑思维能力、空间想象能力以及综合运用所学知识解决实际问题的能力的考查,...

这些法规性文件已经明确指出命题的依据是考试大纲,而不是同学在本科学习时的教学大纲或某一指定的教材,根据入学考试的性质是具有选拔功能的水平考试,同学也不难理解硕士研究生数学入学考试的要求会略高于教学要求,考试大纲与教学大纲是有差异的.因此,同学在备考阶段要认真看考试大纲,搞清考试内容与考试要求,它是指导考生复习的唯一依据.

二、数学三与数学四的试卷结构以及各类题的考查目标

近年来,试卷的总题量基本上是 20 道题,其中第一大题为填空题,第二大题是选择题,第三大题至第十二大题为解答题(包括证明题).其中,填空题与选择题各由 5 个小题组成,每题都是 3 分,即客观性试题共 10 道题总分为 30 分.而解答题的形式主要是计算题,但必有综合题及应用题,主观性试题共有 10 道大题,总分为 70 分.

在数学三的试卷中,微积分的内容有 12 道题共 50 分,其中填空题与选择题各有 2 道,解答题(包括证明题)为 6 道;线性代数有 5 道题约 25 分,其中填空题与选择题分别为 1 道与 2 道,解答题 2 道;概率统计有 5 道题共 25 分,其中填空题 2 道、选择题 1 道、解答题 2 道.

在数学四的试卷中,微积分的内容有 12 道题,其总分与题型结构与数学三相同;线性代数有 5 道题约 25 分,其中填空题 2 道、选择题 1 道、解答题 2 道;概率统计亦有 5 道题共 25 分,其中填空题 1 道、选择题 2 道、解答题 2 道.

填空题主要是考查考生在三基以及重要数学性质方面掌握的情况,从认知的角度看,这些题可分为识记、理解和简单应用三个层次,但从难度上看是以中等难度为主,同时由填空题也可了解同学在简捷、准确运算能力以及简单推理方面的情况.

选择题主要用于考查考生对数学概念、性质、方法的理解与掌握的程度,从理论上讲选择题可以考核考生在各层次上的知识和能力,但现阶段主要考查的是中低层次,了解考生在简单推理、比较以及判别能力方面的情况,同时,也可以了解考生在一些常见的概念性、方法性错误方面的情况.

解答题(包括证明题)是考研数学考试的主要题型,是对考生三基以及数学能力、水平的一个全面评估.通过解答题可考核考生对数学的基本原理、方法、公式和定理掌握及熟练运用的程度,可考查运算能力、抽象概括能力、数学建模解决实际问题的能力,而通过证明题可了解考生对数学主要原理、定理理解和掌握的程度,考查逻辑推理能力.

根据题型的考核要求,我们知道无论是填空题还是选择题,每个题涉及的知识点不会很多,计

算的复杂性不应太高(有的题可能会有简便方法),综合性也不会特别强,推理亦相对简单,这些题应当好做.但另一方面,一份试卷中安排填空题与选择题必然加大了总题量,因而也就增加了考核的知识点,扩大了考试内容的覆盖面,因此考生在备考阶段一定要全面系统的复习,不能有所偏废,要重视三基,防止眼高手低,华而不实,把基础打扎实了,考试时从填空题入手,由于题目难度适中,会有利于缓解考试时的紧张心情,开头顺了更便于发挥水平.

三、考研数学试题的特点

数学试卷中的大多数题目难易度中等,且区分度合格,一般有 2 至 3 道题较难,但对高分的考生区分能力强,一般没有“太难多数人不会做”及“太易多数人会做”的题目.并且考核知识覆盖面广.同时,考查的各个知识点分布适当,知识结构合理,较好地体现了考试大纲所规定的以考查三基为主,在此基础上加强对考生数学能力的考查的要求.

1. 重视考查三基

考试大纲明确指出考试以考基本概念、基本方法、基本原理为主,命题组也确实严格遵循考试大纲命题,但从每年阅卷的情况看,无论是填空题、选择题还是解答题中的基础题均有为数不少的考生失误,这要引起备考同学足够的重视.

【例 1】 已知 $z = u^v, u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}, v = \arctan \frac{y}{x}$, 求 dz . (2000 年数学四试题)

【分析】 这是一个计算复合函数全微分的基本题.只要正确运用复合函数求偏导数的公式和全微分的定义

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}, \\ dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.\end{aligned}$$

就可以稳拿 6 分.但在实际考试中,不少考生把 z 写成 x, y 的函数,即

$z = (\ln \sqrt{x^2 + y^2})^{\arctan \frac{y}{x}}$. 这时 z 是一个幂指函数,对 x, y 求偏导的计算比较繁,极易出错.

类似这种类型的计算题出过多次,如 1998 年数学三、数学四共同的一个试题:设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【例 2】 计算 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}$. (2000 年数学四试题)

【分析】 这是一个广义积分.被积函数含有 e^x , 是常见的类型,解题方法很多,既可用凑微分法,也可用令 $e^x = t$ 等法换元.

【方法一】 从被积函数中提出 e^{-1} , 并将分子分母同乘 e^x , 则有

$$\begin{aligned}I &= e^{-1} \int_1^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx = e^{-1} \cdot \frac{1}{e} \arctan \frac{e^x}{e} \Big|_1^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{4} e^{-2}.\end{aligned}$$

【方法二】 $I = \int_1^{+\infty} \frac{e^{x-3}}{e^{2(x-1)} + 1} dx = e^{-2} \int_1^{+\infty} \frac{de^{x-1}}{e^{2(x-1)} + 1}$
 $= e^{-2} \arctan e^{x-1} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} e^{-2}.$

【方法三】 令 $e^x = t$, $x = \ln t, dx = \frac{1}{t}dt$, 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{ee^x + e^3e^{-x}} = \int_e^{+\infty} \frac{\frac{1}{t}dt}{et + e^3 \cdot \frac{1}{t}} \\ &= \int_e^{+\infty} \frac{1}{e} \frac{dt}{t^2 + e^2} = \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{e} \arctan \frac{t}{e} \Big|_e^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{4} e^{-2}. \end{aligned}$$

考试中,考生犯了不少初等错误,如不知道 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. 在用【方法二】解答此题时,得 $\arctan e^0 = 0$. 在用【方法一】解答此题时,积分 $\int \frac{e^x}{e^{2x} + e^2} dx$ 的原函数不会求等.

【例3】 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, E 为单位矩阵, A^*

为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____. (1998年数学三、数学四试题)

【分析】 这是一个常见的基础题,作为矩阵方程的考核既有以解答题形式出现的大题,也有如本题这样的填空题. 求解矩阵方程首要的是对矩阵方程恒等变形化简,考查的是矩阵的运算与性质,不要急于把已知数据代入矩阵方程,那会增大计算工作量,使问题复杂化. 对于本题,由于方程中含有伴随矩阵 A^* ,而已知条件是矩阵 A ,那么如何处理 A^* 是本题的关键.

如果通过 A 先求出 A^* 再求解 B 是麻烦的,应当考虑到伴随矩阵的重要公式 $AA^* = A^*A = |A|E$, 用 A 左乘矩阵方程的两端,有

$$|A|BA = 2ABA - 8A.$$

从已知条件知 A 是可逆矩阵,再用 A^{-1} 右乘,即有

$$|A|B = 2AB - 8E \quad \text{或} \quad (2A - |A|E)B = 8E.$$

所以 $B = 8(2A - |A|E)^{-1}$.

因为 A 是对角矩阵,易见 $|A| = -2$, 那么 $(2A - |A|E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + E)^{-1}$.

$$\text{从而} \quad B = 4(A + E)^{-1} = 4 \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}^{-1} = 4 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 2 \end{bmatrix}.$$

本题主要考查矩阵方程求解,但涉及到伴随矩阵的性质,矩阵的运算,求逆等基础知识,任一环节出差错均要影响整个题目的正确性.

【例4】 设 A, B 是二随机事件,随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现,} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现,} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现,} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立. (2000年数学三、数学四试题)

【分析】 这是一道涉及随机事件相互独立性、随机变量相互独立与相关性的基本概念与求随机变量数字特征基本方法的题目. 我们只要将随机变量 X 与 Y 的协方差用事件 A, B, AB 的概率表

示出来,问题是很容易解决的.

$$EX = P(A) - P(\bar{A}) = 2P(A) - 1, \quad EY = 2P(B) - 1,$$

$$\begin{aligned} P\{XY = 1\} &= P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = -1\} = P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= P(AB) + 1 - P(A + B) = 2P(AB) - P(A) - P(B) + 1, \end{aligned}$$

$$EXY = 2P\{XY = 1\} - 1 = 4P(AB) - 2P(A) - 2P(B) - 1,$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 4P(AB) - 4P(A)P(B).$$

$$\Rightarrow \text{cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

即 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow$ 事件 A 与 B 独立.

有些考生在单方面证明命题充分性,即从 A 与 B 独立推证 X 与 Y 不相关时,混淆了两个随机变量独立与两个随机事件独立的概念,将事件 A 与 B 独立不加论证地等同于随机变量 X 与 Y 独立,直接由 A 与 B 独立认为就是 X 与 Y 独立,得出 X 与 Y 不相关.正确的证法应该是从 A 与 B 独立得出 A 与 $\bar{B}$ 、 $\bar{A}$ 与 B 、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均也独立.有

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i\}P\{Y = j\}, \quad i, j = 1, -1.$$

从而才得到 X 与 Y 相互独立.

另外有些考生不能熟练运用事件运算性质与概率的性质,如 $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$ 、 $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB)$ 、 $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A+B})$ 等,因而不能将 $\text{cov}(X, Y)$ 正确整理出所需结果,这也是导致考生得分低的原因.

【例 5】 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本,令

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2,$$

则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时,统计量 X 服从 χ^2 分布,其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (1998 年数学三试题)

【分析】 χ^2 、 t 、 F 分布是数理统计中三个最基本分布. 本题考查的就是关于抽样分布中常见统计量 χ^2 分布的知识. 根据 χ^2 分布定义,若 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立且服从标准正态分布,则 $Y = Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_m^2$ 服从自由度为 m 的 χ^2 分布. 在本题中,如果 X 服从 χ^2 分布,则自由度为 2,并且要求 $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)$ 与 $\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)$ 相互独立且均服从标准正态分布 $N(0, 1)$. 由于 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立,因此 $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)$ 与 $\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)$ 也相互独立.

$$D[\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)] = aD(X_1 - 2X_2) = 5aDX_1 = 20a,$$

$$D[\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4)] = bD(3X_3 - 4X_4) = 25bDX_1 = 100b.$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}.$$

如果考生将方差 $D[\sqrt{a}(X_1 - 2X_2)]$ 误算为 $3aDX_1 = 12a$ 或 $12\sqrt{a}$ 甚至 $(-\sqrt{a})^2DX_1 = 4a$ 都是错误的. 这是由于利用方差基本性质计算随机变量方差的基本功不够扎实所致.

2. 试题的灵活性较强


有些试题设计的比较新颖,不落俗套,考生基本功扎实读懂题意就不难解;有的试题解法灵活,知识融会贯通的同学往往有捷径可节省出宝贵的时间.

【例 6】 计算 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$. (1995 年数学四试题,相当于现在的数学三).

【分析】 这是一道求二重广义积分题. 难点是如何处理函数 $\min\{x, y\}$, 若将积分区域(全平

面)以 $y = x$ 分成 D_1 和 D_2 两部分(如图),则在 D_1 内, $x < y$, 因此 $\min\{x, y\} = x$. 在 D_2 内, $x > y$, 因此 $\min\{x, y\} = y$.

$$\begin{aligned} \text{从而积分 } I &= \iint_{D_1} x e^{-(x^2+y^2)} dx dy + \iint_{D_2} y e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \int_{-\infty}^y x e^{-x^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^x y e^{-y^2} dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2y^2} dy - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx \\ &= -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} dx. \end{aligned}$$



对最后的积分还需要用变量替换 $x = \frac{t}{\sqrt{2}}$, 化成

$$I = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \text{ 再用泊松积分 } \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1$$

这一结果,而泊松积分在概率中应是非常熟悉的.

该题考的知识点比较多是一个综合性很强的题.同时,方法也要求掌握的灵活,在实际考试中,多数考生不知如何下手,得分率较低.

【例7】 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续,且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$. (1997年数学三试题)

【分析】 等式右边含有未知函数的二重积分,为了求出 $f(t)$ 必须对等式两边求导,得到一个微分方程,再求解.为此需先对二重积分做变量替换,化二重积分为变上限的积分.二重积分

$\iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy$ 的积分区域是以 $2t$ 为半径的圆,是 t 的函数.被积函数

$f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right)$ 是关于 x^2+y^2 的抽象函数,可以在极坐标变换下化简该积分.

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2} \sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2t} f\left(\frac{1}{2} r\right) r dr \\ &= 2\pi \int_0^{2t} r f\left(\frac{1}{2} r\right) dr. \end{aligned}$$

对等式两边求导,有

$$f'(t) = 8\pi t e^{4\pi t^2} + 8\pi t f(t).$$

这是一阶线性微分方程,解之可得

$$f(t) = (4\pi t^2 + C) e^{4\pi t^2}.$$

需要提醒考生注意的是,此处的 C 应通过初始条件定出来.由原方程可得 $f(0) = 1$. 所以

$$f(x) = (4\pi x^2 + 1) e^{4\pi x^2}.$$

本题把利用极坐标变换计算二重积分,求变上限积分的导数,求解一阶非齐次线性微分方程等重要知识点紧密结合起来,考查了考生的综合运算能力和灵活运用各种知识的能力.

在实际考核中,考生也知道应对等式两边求导,化成微分方程再求解.但面对含有参数的二重

积分束手无策,故得分率不高.反映考生对知识的灵活运用还欠缺.

【例 8】 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$, 已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值. 试求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵. (2000 年数学四试题)

【分析】 本题已知矩阵 A 有三个线性无关的特征向量, 那么 A 必可对角化. 因而对于 $\lambda = 2$ 这二重特征值就必有 2 个线性无关的特征向量. 从而齐次方程组 $(2E - A)x = 0$ 的基础解系由 2 个向量组成, 得知秩 $r(2E - A) = 1$.

经初等变换矩阵的秩不变, 于是

$$2E - A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -y \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & x-2 & -x-y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

可推知 $x = 2, y = -2$.

为求矩阵 P , 下面需求出 A 的特征值及其特征向量. 由于已知 $\lambda = 2$ 是二重特征值, 所以可以不用特征多项式来求特征值, 而是利用迹, 由

$$2 + 2 + \lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 4 + 5,$$

求出 $\lambda_3 = 6$.

关于特征向量的求解请读者自己完成. 作为 3 个未知数的齐次方程组求基础解系时出错的不少, 请不要掉以轻心, 要认真对待.

【例 9】 已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布

$$X_1 \sim \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad X_2 \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

而且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$.

(1) 求 X_1 和 X_2 的联合分布;

(2) 问 X_1 和 X_2 是否独立? 为什么? (1999 年数学四试题)

【分析】 对于二维离散型随机变量 (X_1, X_2) , 已知其联合分布, 求其边缘分布及判断 X_1 与 X_2 的独立性是非常容易的问题. 然而若求 X_1 与 X_2 的联合分布, 仅仅知道 X_1 与 X_2 各自的分布是不够的, 还必须有一些附加条件才行. 对于本题能否灵活运用所给的附加条件 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 首先求出 X_1 和 X_2 的联合概率分布是解题的关键, 也是本题难点. 由于 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 所以 $P\{X_1 X_2 \neq 0\} = 0$, 即

$$P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = 0.$$

于是可以分析出 X_1 和 X_2 的联合分布结构如下:

$X_2 \backslash X_1$		X_2		
		0	1	
-1	a_1	0	1/4	
0	a_3	a_2	1/2	
1	a_4	0	1/4	
	1/2	1/2		

再根据边缘分布性质, 很容易依次求出 a_1, a_2, a_3, a_4 , 即 X_1 与 X_2 的联合分布为

$X_1 \backslash X_2$	0	1	
-1	1/4	0	1/4
0	0	1/2	1/2
1	1/4	0	1/4
	1/2	1/2	

从上面 X_1 与 X_2 的联合分布表容易验证 X_1 与 X_2 不独立.

本题得分率只有 0.23, 主要是考生不能灵活运用条件 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$. 有些考生先误认定 X_1 与 X_2 相互独立, 求联合分布为 $P\{X_1 = i, X_2 = j\} = P\{X_1 = i\} \cdot P\{Y = j\}, i = -1, 0, 1; j = 0, 1$. 这是完全错误的.

3. 试题的综合性强

有些试题考核的知识点较多, 既有把前后章节的知识综合起来考核的, 又有不同学科的知识联系在一起的, 这类题目要求同学要学会分析问题, 抓联系抓总结.

【例 10】 已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求

(1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x . (1994 年数学四试题, 相当于现在的数学三)

【分析】 利用 (x_0, y_0) 在两条曲线上和在点 (x_0, y_0) 处两曲线的切线斜率相等这两个条件可以列出三个方程, 从而求出 a 和切点坐标 x_0, y_0 . 又 (x_0, y_0) 也是两曲线的交点, 从而根据旋转体的体积公式

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx,$$

求出 V_x (略).

由 $y = a\sqrt{x}$ 和 $y = \ln\sqrt{x} = \frac{1}{2}\ln x$,

得 $y' = \frac{a}{2\sqrt{x}}$ 和 $y' = \frac{1}{2x}$.

又两曲线在点 (x_0, y_0) 处有公切线, 故

$$\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0}, \quad \text{得} \quad x_0 = \frac{1}{a^2}.$$

将 $x_0 = \frac{1}{a^2}$ 分别代入两曲线方程, 解出 $a = \frac{1}{e}, x_0 = e^2, y_0 = 1$.

在上面的求解过程中, 不少考生目的性不明确, 倒来倒去, 解不出 a 和 x_0, y_0 .

本题是一个综合性考题, 考查了导数的几何意义, 用定积分求旋转体的体积以及考查考生的运算能力. 在定积分的计算中还用到了分部积分法.


【例 11】 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0. \end{cases}$

其中函数 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性. (1996 年数学四试题)

【分析】 由于 $g(x)$ 具有二阶连续导数, 所以在 $x \neq 0$ 时, $f(x)$ 也有二阶连续导数, 可以直接



求 $f'(x)$, 且 $f'(x)$ 连续, 余下的问题, 就只要求 $f'(0)$ 及讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2},$$

$$\begin{aligned} x=0 \text{ 时, } f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} \\ &\stackrel{*}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} \stackrel{**}{=} \frac{g''(0) - 1}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又在 } x=0 \text{ 处有 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (1+x)e^{-x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} \stackrel{**}{=} \frac{g''(0) - 1}{2} \\ &= f'(0), \end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为连续函数.

本章综合考查了连续的概念, 导数定义与运算, 洛必达法则等.

(*) 处为题设条件, 即假定 $g(x)$ 有连续二阶导数. 若把条件改成 $g'(x)$ 连续, $g''(0)$ 存在, 照样可以有上述结论, 但 (**) 式就不成立了, 此时可用导数定义求 $g''(0)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(g'(x) - g'(0)) + (e^{-x} - 1)}{2x} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{g'(x) - g'(0)}{x} + \frac{e^{-x} - 1}{x} \right) = \frac{1}{2} (g''(0) - 1). \end{aligned}$$

对于 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}$ 也不能再用洛必达法则, 必须把 $g'(0) = -1, g(0) = 1$ 配进去, 再定义求 $g''(0)$. 这样试题的难度就加大了很多.

【例 12】 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个

特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值. (1999 年数学一、数学三试题)

【分析】 伴随矩阵是一个重要的考核点, 关于伴随矩阵一个重要公式为 $AA^* = A^*A = |A|E$. 对于本题根据特征值与特征向量的定义, 有

$$A^* \alpha = \lambda_0 \alpha. \quad (1)$$

由于矩阵 A 中有较多的参数, 如若先由 A 来求 A^* , 再代入到 (1) 式求解, 是不明智也是行不通的. 应当注意知识点之间的联系与转换, 用矩阵 A 左乘 (1) 式, 并将题设 $AA^* = -E$ 代入得

$$\lambda_0 A \alpha = -\alpha,$$

$$\text{即 } \lambda_0 \begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

问题转化为解方程组

$$\begin{cases} \lambda_0(-a+1+c) = 1, & (2) \\ \lambda_0(-5-b+3) = 1, & (3) \\ \lambda_0(-1+c-a) = -1. & (4) \end{cases}$$

② - ④ 可知 $\lambda_0 = 1$.

将 $\lambda_0 = 1$ 代入到 ② 和 ③ 可知 $a = c, b = -3$.

最后,再利用 $|A| = -1$, 由

$$\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = a - 3 = -1,$$

可完成本题.

此题综合考查了伴随矩阵与原矩阵的关系,特征值与特征向量、方程组求解、行列式计算等重要知识点.求参数也是近几年来考研的热点话题之一.

【例 13】 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布,试求边长 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$. (1999 年数学四试题)

【分析】 这是考查二维随机变量函数概率密度的综合应用试题.考查的基本知识点有:

(1) 服从均匀分布的二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } (x, y) \in G, \\ 0, & \text{若 } (x, y) \notin G; \end{cases}$$

(2) 矩形面积 S 是一维随机变量,它是二维随机变量 (X, Y) 的函数: $S = XY$;

(3) 求随机变量函数 S 的分布函数 $F(s)$,这也是本题的关键部分,由于

当 $s \leq 0$ 时, $F(s) = 0$;

当 $s \geq 2$ 时, $F(s) = 1$;

当 $0 < s < 2$ 时,如上图,有

$$\begin{aligned} F(s) &= P\{XY \leq s\} = \iint_{xy \leq s} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \iint_{xy > s} f(x, y) dx dy = 1 - \frac{1}{2} \int_s^2 dx \int_x^1 dy \\ &= \frac{s}{2} (1 + \ln 2 - \ln s). \end{aligned}$$


(4) 根据随机变量 S 的分布函数 $F(s)$,求其概率密度

$$f(s) = F'(s) = \begin{cases} \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln s), & 0 < s < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

本题对二重积分的计算能力亦有要求,不少考生将二重积分算错,或是不会算,有些考生不会讨论分段函数 $F(s)$ 的取值,这一方面反映出考生的基本概念不清,没有熟练掌握基本方法;另一方面更不能将所学知识融会贯通,解决应用问题和综合问题的能力较差.

4. 试题的论证性较强

为了考查考生的逻辑推理能力以及抽象思维能力,微积分部分年年必考论证题.从 1991 年至 2000 年的试卷不难看出,论证题主要分布在极限、零点、不等式、级数收敛等范围,这些试题中涉及中值定理的尤其多.由于一些考生对定理理解不透彻,或审题不严或定理成立的条件不清楚,糊里糊涂或不管三七二十一乱用定理公式的现象常有发生,要学会从题目已知条件出发进行分析推



导逐步向结论靠拢,提高自己的推理能力.

【例 14】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$. 试证:

(1) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得

$$f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1. \quad (1999 \text{ 年数学三试题})$$

【分析】 (1), (2) 要证的结论亦可改写为 $f(\eta) - \eta = 0$ 与 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] - 1 = 0$. 题中 (1) 的证明较易, 利用闭区间 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的连续函数 $\varphi(x) = f(x) - x$ 在左右端点上异号, 一定存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使 $\varphi(\eta) = 0$. (2) 的证明首先考虑到罗尔定理或其它的中值定理, 但注意 (2) 中涉及到 (1) 中的 η , 因此, 构造辅助函数时, 也应考虑到与 $\varphi(x)$ 有关. 令

$$F(x) = e^{-\lambda x} \varphi(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - x],$$

由于 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上满足罗尔定理的条件, 故存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得

$$F'(\xi) = 0,$$

即 $e^{-\lambda \xi} \{f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] - 1\} = 0,$

从而 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1.$

本题考查连续函数的介值定理和罗尔定理的应用, 重点在于考查逻辑推理能力与构造辅助函数的技巧. 在历年的考题中, 微积分中该类证明题占多数.

【例 15】 设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关. (1996 年数学三试题)

【分析】 要证明 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关, 即对

$$k\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \dots + k_t(\beta + \alpha_t) = 0, \quad (1)$$

要证 $k = k_1 = \dots = k_t = 0$, 为此应当对 ① 式作恒等变形, 而变形的依据是已知条件. 由于 $A\alpha_i = 0, A\beta \neq 0$, 那么用矩阵 A 左乘 ① 式, 化简可有

$$(k + k_1 + \dots + k_t)A\beta = 0,$$

进而有 $(k + k_1 + \dots + k_t) = 0. \quad (2)$

为论证出每个 k_i 均为 0, 还要注意到条件 —— 基础解系, 基础解系除有解的概念之外, 还有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关的信息. 为此对 ① 式再作恒等变形(拆项重组)有

$$(k + k_1 + \dots + k_t)\beta + k_1\alpha_1 + \dots + k_t\alpha_t = 0. \quad (3)$$

将 ② 式代入 ③ 式, 得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0.$$

最后根据 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是基础解系, 它们是线性无关可推知

$$k_1 = k_2 = \dots = k_t = 0.$$

从 ② 式再得到 $k = 0$ 即可完成论证.

本题用了同乘与拆项重组两个最基本的恒等变形方法. 它均来自已知条件提供的信息, 这一类证明题方法是基本的, 只要认真复习掌握起来并不困难.

5. 试题注重应用能力的考查