

内蒙古蔬菜品种志



*NEIMENGGU
SHUCAI*

PINZHONGZHI

内蒙古人民出版社

内蒙古人民出版社

内 蒙 古



蔬 菜 品 种 志

《内蒙古蔬菜品种志》编审人员

(以姓氏笔画为序)

技术顾问 林维申

编审统稿 王子忠 王礼 白征夫 许世英

主要执笔人

马爱群 方乃武 王礼 王远良 张西林 张受远
李影 苏以长 余诞生 周洪涛 屈淑文 段迅甫
袁家琦 高仲清 杨明 赵清岩 潘秀兰

责任编辑 白征夫

图照摄影 段迅甫

封面设计 李晓锐

内蒙古蔬菜品种志

NEI MENG GU SHU CAI

PIN ZHONG ZHI

内蒙古自治区种子管理站编

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街82号)

内蒙古新华书店经销 内蒙古蒙文印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.5 字数: 302 千

1987年10月第一版 1989年12月第1次印刷

统一书号: 16089·154 印数: 1—1,890 册

ISBN 7-204-00187-7 S·5 每册: 25.00 元

《内蒙古蔬菜品种志》编审人员

(以姓氏笔名为序)

技 术 顾 问 林维申

编 审 统 稿 王子忠 王礼 白征夫 许世英

主要执笔人 马爱群 方乃武 王礼 王延良 张西林 张受远
李影 苏以长 余延年 周洪涛 屈淑文 段迅甫
袁家琦 高仲清 杨明 赵清岩 潘秀兰

责 任 编 辑 白征夫

图 照 摄 影 段迅甫

封 面 设 计 李晓悦

编辑说明

一、本志所载蔬菜系作为副食品的草本作物和菌类。原始材料来自1977—1978年内蒙古西部地区蔬菜品种普查与1981—1982年内蒙古东部地区蔬菜品种补充普查。统编中先经分类整理、补充核实，编出初稿，复经审核订正、统一体例，并据近年发展变化情况作必要补充后编辑成书。

二、编入本志的蔬菜，主要是经过普查以及近年推广面积较大的品种。对新引入但栽培面积较小，或历史上虽有栽培但现已淘汰的品种，则未予列入。对野生蔬菜，因其品种繁多又限于材料，只编主要品种。

三、本志共收338个蔬菜品种，包括杂种一代。系依农业生物学分类，按熟期为序，将主要推广品种列于相应部分之首。

四、本志对每一类别蔬菜都列以拉丁学名、品种均列有正名、别名、品种来源、分布地区及产量、植物学特征、生物学特性、栽培要点等，有些还加了评语。

关于名称，以通用名为正名，余为别名，个别地方特有的品种按习惯用的名称为正名，对同名异种的另冠以地名。

品种来源中记载的栽培史，按其年代远近，概括为悠久、较久等语，考证确切的标明具体年代。

分布地区，按普查材料，尽量标明主、次产区，一般写至旗县，个别写至乡，也有按自然类型区标明的。

植物学特征，简要描述形态特征，注意突出食用部分，尽量用数字加以区分。

生物学特性，分别介绍熟性、生育期、适应性、抗逆力、品质、食用与贮藏加工等内容。

栽培要点，以当地栽培法为主，介绍其对土肥水的要求、栽培方式、株行距，有些还列了留种技术。

评语，根据普查记载，对优缺点提出鉴定性意见，以供规划与布局的参考。

五、本志所用月、日均为公历，度量衡为公制，温度为摄氏度。

六、本志由内蒙古自治区种子管理站主持编辑，得到内蒙古农业委员会、科学技术委员会、农牧学院、师范大学、农业科学院，多种经营站，各盟市种子公司，农业科学研究所、呼和浩特市科学普及协会等单位的支持与协助，或参与普查，或提供资料，或拍摄照片，或参与审定，本志的完成，实为集体劳动的产物。

七、编写本志的目的，在于系统反映内蒙古蔬菜品种资源情况，总结四十年来种子工作成就，为规划生产和科学研究提供依据。本志可供生产、科研各方面读者参阅，也可

供大、中专以上农业院校师生阅读。

八、 鉴于当今的时代是科学技术飞速发展的时代，蔬菜品种的引进、试验与推广空前活跃，请广大读者在参阅本志时要注意新情况、新问题与新经验，以补此前的不足，书中如有缺点错误，希予以指正。

编 者

1987年8月8日

目 录

一 根菜类

(一) 萝卜	1
梢白尖(1) 呼市五纓(2) 赤峰鞭杆红(2) 勉萝卜(2) 小京子(4) 白萝卜(4) 六纓(4) 红皮水萝卜(5) 二红袍(5) 七纓水萝卜(5) 小水萝卜(7) 小籽水萝卜(7) 大籽水萝卜(7) 心里美(8) 露八分(8) 大青皮(9) 国光1号(9) 青圆脆(11) 石家庄白萝卜(11) 洋白萝卜(11) 象牙白(12) 白萝卜(12) 大红袍(12) 翘头青(13) 豆腐青萝卜(13) 卫青萝卜(13) 花萝卜(15)	
(二) 胡萝卜	15
齐头黄(15) 露八分胡萝卜(16) 一支蜡(16) 巴盟尖子黄(17) 鞭杆红(17) 红胡萝卜(17) 扎地黄(17) 贼不偷(20) 小红胡萝卜(20) 真红胡萝卜(20) 多伦红胡萝卜(21)	
(三) 芜菁甘蓝	21
布留克(21) 科布尔蔓菁(22)	
(四) 芜菁	22
白蔓菁(24) 红蔓菁(24)	

二 白菜类

(一) 大白菜	25
中青麻叶(25) 大青麻叶(26) 小青麻叶(26) 中青麻叶×山海关矮桩(28) 老屯青麻叶×舒心青白口(28) 呼郊中青麻叶(29) 大台什青麻叶(29) 中青816(29) 长炮弹青麻叶(30) B ₄₁ 42×785(30) 旱31(32) 郊良中青(32) 新城小青(32) 灰堆青麻叶(33) 老屯青麻叶(33) 杂交青白口(33) 团结大白菜(35) 核桃纹(35) 翻心黄(35) 二牛心(36) 黄籽大辣(36) 通源4号(36) 八叶齐(37) 赤峰黄秧白(37) 哈尔滨9号(37) 玉青(38) 小抱头(38) 杭后二抱头(38) 郑州早黑叶(40) 山东小根(40) 拧心青(40) 抱头青(41) 小青口核桃纹(41) 新华二抱头(41) 舒心青白11(42) 二黄白(42) 菊花白(44) 鸡腿白(44) 巴盟卷心白(44) 高桩白菜(45)	
(二) 油菜	45
四月慢(45) 五月慢(46) 白帮油菜(46) 青帮油菜(48) 青白帮油菜(48) 二月慢(48) 油冬儿(49) 乌塌菜(49)	

三 甘蓝类

(一) 结球甘蓝	50
牛心甘蓝(50) 中甘11号(51) 金早生(51) 报春(51) 迎春(52) 北京早熟(52) 小牛心(53) 丹京早熟(53) 庆丰(53) 京丰1号(54) 黄苗(54) 黑叶	

小平头(56) 成功 2 号(56) 苏木沁二虎头(57) 巴盟大圆菜(57) 晚丰(57) 包头二大籽圆菜(59) 包头大籽圆菜(59) 乌研 711(59) 西菜园人头菜(60) 桥靠板墩(60) 丰镇二黑甘蓝(61) 和尚头圆菜(61) 大平顶圆菜(61) 农牧大平头(64)

(二) 花椰菜	64
荷兰雪球(65) 瑞士雪球(65) 耶尔福(65)	
(三) 球茎甘蓝	67
扁玉头(67) 苕蓝(67) 小缨子(68) 青皮玉头(68) 集宁小籽玉头(68) 狗头玉头(69)	

四 芥菜类

芥菜	71
包头牛毛芥菜(71) 赤峰小花叶芥(71) 呼市牛毛芥菜(72) 花叶芥(72) 赤峰大花叶芥(73) 河套大叶芥(73)	

五 绿叶菜类

(一) 菠菜	75
混菠菜(75) 圆叶菠菜(76) 尖叶菠菜(76)	
(二) 芹菜	77
空杆芹菜(77) 实杆芹菜(77)	
(三) 茺荽	80
本地茺荽(80)	
(四) 莴笋	81
尖叶莴笋(81) 鱼肚莴笋(81) 柳叶莴笋(82) 鱼肚白(82) 茼蒿(84)	
(五) 茴香	84
小茴香(84)	

六 葱蒜类

(一) 蒜	87
紫皮蒜(87) 白皮蒜(88) 巴盟白皮蒜(88) 白狗牙蒜(88) 红皮蒜(89)	
(二) 韭菜	89
白根宽马蔺韭(91) 马蔺韭(91) 大马蔺韭(92)	
(三) 大葱	92
毕克齐大葱(92) 托县孤葱(93) 鸡腿葱(93) 白皮葱(95) 叉子葱(95) 红葱(95) 章丘大葱(96)	
(四) 韭葱	96
韭葱(96)	

(五) 葱头	96
黄皮葱头(97) 紫红皮葱头(97)	

七 茄果类

(一) 辣椒	99
小矮秧(99) 农牧永久青椒(100) 茄门青椒(100) 巴彦椒(100) 三道筋(101)	
青岗青椒(101) 铁皮青椒(104) 大同 3 号(104) 徐水青椒(104) 吉林 3 号	
(105) 世界冠军(105) 四平头(105) 三根筋(108) 朝天壕(108) 早熟 3 号	
(109) 忻县二猪嘴(109) 农大 40(109) 早丰(110) 沙尔沁尖辣椒(110) 新疆	
羊角椒(112) 小红辣椒(112) 小尖辣椒(112) 银川羊角辣子(113) 金星尖椒	
(113) 星光尖椒(113) 保加利亚尖辣椒(114) 西宁羊角椒(114)	
(二) 番茄	114
青岛早红(115) 西安中架(115) “71216”(116) 北京 10 号(116) 红星柿子	
(116) 摩雷 33(117) 沈农 2 号(117) 早粉 2 号(117) 秃尖粉(118) 春魁	
(118) 北京早红(120) 强丰(120) 中蔬 4 号(121) 苹果青(121) 强力米寿(124) 农大	
土豆红(124) 大同 156(124) 满丝(125) 橘黄佳辰(125) 大黄柿子(126) 丰收黄	
(126) 潘利加(128) 红瓦伦特(128) 特罗皮克(128) 粉红甜肉(129) 台湾大	
红(129) 格利克斯大粉(132) 顺义大粉(132) 北京大红(132) 农大 907(133)	
(三) 茄子	133
阳高茄(133) 本地牛心茄(134) 玛瑙茄(134) 呼茄 1 号(136) 海六杂交茄	
(136) 鹰嘴长茄(136) 巴盟长茄(137) 74-10(137) 大敏茄(138) 包钢茄	
(138) 绿油茄(138) 巴盟牛心茄(140) 托县长茄(140) 呼市灯泡茄(140) 呼	
市圆茄(141) 麻花板长茄(141) 海红皮(144) 二敏茄(144) 北京六叶茄	
(144) 北京七叶茄(145) 北京九叶茄(145) 科选 1 号(145) 太原海茄(147)	
兴城紫圆茄(147) 火茄(147) 柳条青(148) 长茄 1 号(148) 牛心×火茄(149)	

八 瓜 类

(一) 黄瓜	151
先明刺瓜(151) 沙尔沁刺瓜(152) 园艺大青刺(152) 北京小刺(153) 东瓦窑刺	
瓜(153) 长春密刺(155) 津研 6 号(155) 津研 7 号(155) 津研 2 号(156) 呼	
市黑乌蛇(156) 佳木斯青刺瓜(157) 大青条(157) 桥靠刺瓜(157) 地黄瓜	
(160) 黑油条(160) 五里营刺瓜(161) 津研 4 号(161) 津研 1 号(161) 叶儿	
三(163) 包杂 2 号(163) 黑乌蛇(164) 山东密刺(164) 北京大刺(164) 西农	
74-18(165) 宇阳大刺(165) 中农 1101 黄瓜(165)	
(二) 南瓜	167
多伦大窝瓜(168) 倭瓜(168) 大瓜(168) 阿尔及利亚西葫芦(169) 一窝猴西葫	
芦(169) 圆叶一窝猴西葫芦(171) 白皮西葫芦(171) 花叶一窝猴西葫芦	

(171) 大青皮西葫芦(172) 跑条西葫芦(172) 大黑皮西葫芦(173) 四十日早葫芦(173) 杂选西葫芦(173) 快葫芦(176) 丰镇葫芦(176)	
(三) 菜瓜	177
菜瓜(177)	

九 豆 类

(一) 菜豆	178
供给者(178) 沙克沙(180) 新西兰3号(180) 英国棍豆(180) 自来油(181) 巴盟五月鲜(181) 丰镇五月鲜(181) 北京快豆(184) 呼市五月鲜(184) 赤峰五月鲜(184) 西德豆角(185) 兰湖274(185) 嫩荚菜豆(185) 七寸莲(186) 丰收1号(186) 一挂鞭豆角(188) 白大架(188) 大青条(188) 青岛架豆(189) 双季豆(189) 白架豆(189) 白粒弯(192) 圆青(192) 肉豆角(192) 白莲豆(193) 东德8号(193)	
(二) 豇豆	193
红嘴燕豇豆(196) 菜豆角(196) 之豇28-2(196)	
(三) 豌豆	197
内软1号豌豆(197) 矮软1号(197)	

十 菌 类

猴头(198) 松口蘑(198) 白蘑(199) 花脸香蘑(199) 卷边网褶菌(200) 蘑菇(200) 白桦蘑菇(200) 亚侧耳(201) 密环菌(201) 雷蘑(201) 香蕈口蘑(202) 木耳(202) 双孢蘑菇(203) 凤尾菇(203) 侧耳(204)

十一 野生蔬菜类

(一) 黄花菜	205
(二) 发菜	206
(三) 蕨	206

十二 多年生蔬菜类

(一) 菊芋	208
(二) 草石蚕	208

一、根 菜 类

(一) 萝卜 *Raphanus sativus* L.

萝卜为十字花科一、二年生草本植物。

萝卜在内蒙古地区栽培历史悠久，分布广泛，表现为适应性强，管理简便，产量高，价格低，耐贮，耐运，供应期长，可供菜食、鲜食，腌渍，晒干，是城乡人民的主要蔬菜之一。

萝卜的品种，按收获期分，有春萝卜、夏秋萝卜、秋萝卜、四季萝卜等；按生育期分，主要有小萝卜、大萝卜两类。

小萝卜又称水萝卜，生育期短，肉质根小，当年播种当年开花采种。一般多在春季终霜前 20—30 天播种，也有少量在夏秋播种的。小萝卜品种较多，曾经广泛栽培的有小籽、二大籽、梢白尖、鞭杆红萝卜、白水萝卜，多年栽培中，有的已被淘汰。近年由外地引入五纓、四纓、六纓、花萝卜、算盘珠、樱桃萝卜、琵琶纓等，五纓、六纓等为推广品种。

大萝卜又称秋萝卜，生育期长，肉质根肥大，夏播秋收，翌年采种，产量高，是城乡人民冬春主要蔬菜，多用于贮藏加工。大萝卜地方品种较少，过去栽培的主要是白萝卜、青萝卜一类品种，建国后陆续引入露八分、心里美、大红袍、大青皮、青圆脆、石家庄白萝卜、浙江大白萝卜等，有些已成为主要栽培品种。

梢 白 尖

〔品种来源〕 农家品种，在内蒙古地区已有 60 余年的栽培历史。

〔分布及产量〕 主要分布在呼和浩特市郊区，近年推广到包头市、巴彦淖尔盟、赤峰市和乌海市等地。每亩产量 2000—2500 公斤。

〔植物学特征〕 叶簇半直立，叶片近长倒卵形。肉质根呈长圆锥形，露出地面 3 厘米左右。因其根梢部 $1/5$ — $1/4$ 为白色而得名。梢白尖有大、小两品种。大梢白尖肉质根长约 20 厘米左右；小梢白尖约 12 厘米。根皮薄而光滑，红色，根肉白色。大梢白尖叶柄较长，小梢白尖叶柄较短。翼叶少，叶面深绿色，背面略浅，叶柄浅紫红色，叶脉紫色，上有刺毛。其叶柄，大梢白尖长，小梢白尖短。

〔生物学特性〕 大梢白尖生长期约 60 天，小梢白尖约 50 天。耐寒性强。适于密植。肉质细嫩，汁多味甜，辣味较少，不易糠心，品质好。

〔栽培要点〕 呼和浩特市于 4 月中旬播种，在简易保护地内可提前 20—30 天。行距 20 厘米左右，株距 10—12 厘米。每亩留苗 1.5—2 万株。

呼市五纓

〔品种来源〕 呼和浩特地方农家品种。栽培历史悠久。

〔分布及产量〕 主要分布在呼和浩特市郊区，其他地区也有少量种植。一般亩产 1500—2000 公斤。

〔植物学特征〕 叶簇半直立，长倒卵形，翼叶多，叶柄长，紫红色，叶面绿色，背面浅绿，叶缘波状，有刺毛。肉质根圆锥形，长 12 厘米左右，皮色鲜红，根肉白色。

〔生物学特性〕 生长期 50—60 天左右。适应性强，耐寒。易糠心，质地粗糙，品质中下。

〔栽培要点〕 参照梢白尖条。

〔评语〕 本品种抗寒性与适应性强，种植面积较大，市场上也受欢迎，因种植多年，应注意品种的防杂保纯。

赤峰鞭杆红（爆竹筒）

〔品种来源〕 赤峰市地方农家品种。

〔分布及产量〕 主要分布在赤峰市、呼和浩特市地区。一般亩产 2000—2500 公斤。

〔植物学特征〕 植株较大。叶簇直立，叶长约 29 厘米，长倒卵形，多为板叶，个别为花叶，微皱，绿色，背面稍淡，有少量刺毛；叶柄、叶脉浅紫色，叶缘波状。肉质根长筒形，末端稍尖，表皮鲜红色，光滑，根肉白色，平均长 13 厘米，粗 3 厘米，重 80—120 克。

〔生物学特性〕 生长期 60 天左右。抗病，耐寒，较耐热。肉质根含水分多，纤维少，嫩脆，稍有辣味，品质好。采收延迟易糠心。

〔栽培要点〕 呼和浩特市郊区于 4 月上旬露地直播，行株距 21 厘米×10 厘米。6 月上旬收获。要注意防治地老虎。

勉萝卜（大籽萝卜）

〔品种来源〕 呼和浩特地方农家品种。栽培历史悠久。

〔分布及产量〕 主要分布在呼和浩特市和巴彦淖尔盟。

〔植物学特征〕 叶簇较高大，半直立，高约 30 厘米，株幅约 45 厘米，大叶 10—15 片，多数为板叶，长倒卵形；翼叶多，叶缘波状，深绿色，背面浅绿，多白色刺毛，叶脉



左上稍白尖
左下勉萝卜

右上呼市五缨
右下赤峰鞭杆红



紫红色。肉质根圆锥形，长约20—30厘米，露出地面的根皮色紫红，地下部分为白色。

〔生物学特征〕 生长期约70天左右，属晚熟种。适应性强，耐寒。易受菜青虫危害。不易抽苔，不易糠心，可延迟收获。肉质根质地细嫩而脆，水分多。品质好。

〔栽培要点〕 行株距应略大，为25×15厘米。

小京子

〔品种来源〕 呼和浩特地方农家品种。约有70多年的栽培历史。

〔分布及产量〕 主要分布在呼和浩特市郊区。一般每亩产量1000公斤左右。

〔植物学特征〕 叶簇半直立，株形小，有叶6片，长倒卵形，绿色，背面稍浅，有小刺毛，叶柄红色。肉质根长圆形，长约6—7厘米，鲜红色，根肉白色。

〔生物学特性〕 生长期约50天。在保护地早熟栽培，优于其它品种。适于密植。抗逆性稍差。根肉细嫩，品质好。

〔栽培要点〕 在保护地可周年种植，但主要用作早熟栽培。行株距15×15厘米。

〔评语〕 因其产量低，已被逐渐淘汰。

白水萝卜

〔品种来源〕 农家品种。有40余年栽培历史。

〔分布及产量〕 主要分布在呼和浩特市、包头市和巴彦淖尔盟一带。一般每亩产量1500—1700公斤左右。

〔植物学特征〕 叶簇半直立，有叶8—10片，板叶，长倒卵形，长16厘米，宽8—9.4厘米，叶色深，有稀白刺毛，叶柄与叶脉白绿色，叶缘略有缺刻。肉质根圆筒形至长圆锥形，梢部渐细，表皮白色，露出地表部分黄色略多，一般长15—18厘米，粗4—4.3厘米，根肉白色，重约150克。

〔生物学特性〕 中晚熟品种。播后65天收获。耐寒性强，质脆，味稍辣，不易糠心，食用品质较好。

〔栽培要点〕 可成片栽培，也可同其它蔬菜间作，间作时株行距应大些。

〔评语〕 在低水肥条件下，辣味浓，品质下降，宜在商品菜区种植。

六纓（锥子把）

〔品种来源〕 1972年由北京市引入。

〔分布及产量〕 主要分布在巴彦淖尔盟的临河市。一般亩产1500公斤左右。

〔植物学特征〕 叶簇直立，6—8片叶，株幅约为30厘米，板叶，长倒卵形，叶色深绿，长14厘米，宽7—8厘米，背面淡绿色，有稀疏的白色刺毛；叶柄与叶脉浅红色。肉质根长圆锥形，长约16厘米，粗3.2厘米，外表皮上部为深粉红色，下部渐浅，根尾

部为白色。肉白色，重约 100 克。

〔生物学特性〕 早熟，播后 50 天开始收获。耐寒性较强，早春播种不易抽苔。肉质根脆嫩但稍有辣味，品质较好。

〔栽培要点〕 在临河地区，一般于 4 月上、中旬播种，5 月中旬定苗，行距 24 厘米，株距 9 厘米，6 月上旬收获。应适时收获，否则易糠心。

红皮水萝卜

〔品种来源〕 巴彦淖尔盟地方农家品种。栽培历史悠久。

〔分布及产量〕 主要分布在巴彦淖尔盟各城镇菜区。一般每亩产量 2500 公斤左右。

〔植物学特征〕 叶簇直立，有大叶 6—9 片，板叶，长倒卵形，长 15 厘米、宽 8 厘米，叶片深绿色，有稀疏的白刺毛；叶缘有缺刻，叶脉紫红色。肉质根短圆锥形，根尾部稍粗；外皮深粉红色，根尾部浅粉红色，一般长 12 厘米，粗 5 厘米，根肉白色，重约 150 克。

〔生物学特性〕 中熟，播后 60 天开始收获。适应性强，耐寒，应适时收获，否则易糠心。肉细嫩，味甜，品质好。

〔栽培要点〕 在临河地区，以早春栽培为主，于 4 月中旬播种，行距 30 厘米，株距 9 厘米，6 月中旬开始采收上市。

二红袍

〔品种来源〕 包头市地方农家品种。栽培历史悠久。

〔分布及产量〕 主要分布在包头市和巴彦淖尔盟的五原县一带。亩产 3500 公斤左右。

〔植物学特征〕 叶簇半直立，有大叶 15—20 片，板叶，长倒卵形，叶长 18 厘米，宽 9 厘米，叶色深绿；叶柄及叶脉紫红色。肉质根长圆形，一般长 15 厘米，粗 8—10 厘米，根尖部较小；约有 1/3 露出地表，根皮粉红色，重约 400 克。

〔生物学特性〕 中晚熟种，播后 60 天开始收获。生长势较强，耐寒、耐旱性一般。抗病性强。肉白色，皮薄，稍有辣味，品质一般。

〔栽培要点〕 在临河地区，适宜春季露地直播，于 4 月中旬播种，5 月中旬定苗，行距 40 厘米，株距 15—18 厘米，6 月上旬即可收获。收获要适时，否则易糠心。

〔评语〕 本品种产量较高，在包头市、巴彦淖尔盟一带有发展前途。

七纓水萝卜（二大水萝卜）

〔品种来源〕 包头市地方农家品种。已有 30 多年栽培历史。

〔分布及产量〕 主要分布在包头市菜区。春播亩产 2000—2500 公斤，夏播亩产 2500—3500 公斤。



小京子



白水萝卜

〔植物学特征〕 叶簇较直立，有大叶7—10片，叶长32厘米，宽7厘米，呈长倒卵形；叶脉浅绿色，叶柄略带紫红色，叶绿略呈缺刻，刺毛稀疏。肉质根1/4露出地表，呈圆柱形，长23厘米、粗5厘米，根皮红色，根梢色淡，根肉白色，单根重量约150—250克。

〔生物学特性〕 中晚熟，播后60—70天开始采收；也有夏播夏收的，用以调剂淡季蔬菜供应。

〔栽培要点〕 参照红皮水萝卜条。

小水萝卜

〔品种来源〕 由河北省引入，已有90余年的栽培历史。

〔分布及产量〕 主要分布在呼伦贝尔盟海拉尔市郊区。亩产2000—2500公斤。

〔植物学特征〕 叶簇直立，有大叶5—7片，板叶，叶呈长椭圆倒卵形，叶色深绿，叶脉浅红色。肉质根长圆筒形，长8—11厘米、粗2—3厘米，皮色深红，尾部淡红色，皮较光滑。肉白色。

〔生物学特性〕 植株生长较快，露地风障栽培播后55天即可收获。耐寒性较强，肉质脆嫩，微甜，稍有辣味，生熟食均可。但如收获稍迟即易植心。

〔栽培要点〕 在海拉尔培区风障栽培，于4月下旬播种，6月中旬收获。畦作。行株距25×5—7厘米，如过密，肉质根膨大缓慢，影响产量和质量。本地常排开播种，分期收获，或在瓜类、果菜类定植前套种。

〔评语〕 本品种适应性强，是内蒙古东部地区理想的淡季补充品种。

小籽水萝卜

〔品种来源〕 包头市郊区地方农家品种。

〔分布及产量〕 主要分布在包头市郊区。亩产1500公斤左右。

〔植物学特征〕 叶簇较直立，花叶，叶色浅绿，叶柄及主脉紫红色。肉质根圆锥形，外皮浅红色，单根重80—100克。

〔生物学特性〕 早熟，生长期55天左右。耐寒性强，不耐热。易植心。肉味甜，肉质脆嫩，水分大，品质较好。

〔栽培要点〕 适宜春季露地栽培，包头市3月底至4月初播种，行株距20×6.7—10厘米。在真叶露心时开始间苗2—3次，三叶一心时定苗，5月底肉质根充分肥大时开始收获。

大籽水萝卜

〔品种来源〕 包头市地方农家品种。