

贈閱

請交換

全國醫藥衛生技術革命展覽會

中醫名方匯集

六八三

編輯者：第四軍醫大學
發行者：新華書店

1958年11月 定價0.27元

前 言

本材料係我校參觀組，在京參觀「全國醫藥衛生技術革命展覽會」時所記錄的材料，現將中醫、中藥部份整理匯編出來，並按臨床科別分類以便參考和查閱。

這些處方和治療方法都已經過長期實踐驗證，它是祖國醫學豐富地遺產的一部份，是我們祖先和疾病鬥爭的有力武器，現在全國已掀起了中西醫合流，創造我國新醫學的熱潮，為配合學習祖國醫學，經工人同志們連夜苦戰排印出來以供學習，推廣和研究祖國醫學之參考。

但由於抄錄和整理的同志不熟悉中醫中藥，又加急於付印故錯誤之處勢必難免，希讀者學習中注意並予以指正。

目 錄

前 言

內 科.....	1
肝硬化.....	1
高血壓.....	5
傳染性肝炎.....	9
再生障礙性貧血.....	11
血小板減少性紫癜病.....	13
何杰金氏病.....	14
慢性腎炎.....	16
類風濕性關節炎.....	20
風濕性關節炎.....	21
喘息.....	25
消化性潰瘍病.....	27
肺結核.....	30
癌瘤的治療.....	35
肺膿瘍.....	36
矽肺.....	37
側柏葉湯治療咯血.....	37
中藥治療枝氣管肺炎.....	37
針灸治療內科疾病.....	37
傳染科.....	42
急性細菌性痢疾.....	42
急性流行性腮腺炎.....	42
清瘟安腦丸治療流行性腦脊髓膜炎.....	42
麻瘋.....	42
血吸虫病.....	43
流行性腦炎.....	44
中醫治療布氏桿菌病.....	44

針灸治療傳染科疾病.....	45
精神神經科.....	46
松蔞合劑治療癲癇.....	46
神經衰弱.....	46
中醫治精神病.....	47
中醫治癲癇.....	47
針灸治療精神神經科疾病.....	48
皮膚科.....	50
酒渣鼻.....	50
癬藥粉.....	50
慢性濕疹.....	50
腳氣粉.....	50
脫髮再生.....	51
白癜風.....	51
復方黃連軟膏治療皮炎皮膚潰瘍.....	52
中醫治過敏性疾痛.....	52
黑布膏治療甲癬.....	52
芥子氣軟膏治療牛皮癬.....	53
嬰兒濕疹軟膏.....	53
三仙丹和梅毒丸治療梅毒.....	53
芋頭汁治療頑癬.....	53
中醫治療癬病及毛囊炎.....	54
針灸治療皮膚科疾病.....	53
小兒科.....	56
小兒麻痺症.....	56
青梅散治療小兒鸛口瘡.....	56
小兒傳染性肝炎.....	57
百日咳.....	57
蟻虫症.....	58
小兒喘息性支氣管炎.....	58
針灸治小兒科疾病.....	59
外科.....	61

泌尿外科	61
針灸治療尿潴留	61
中藥治療腎結石，輸尿管結石	61
膀胱石	61
尿道結石	61
薤白治療晚期泌尿結核	62
普通外科及胸科	62
季德勝蛇藥	62
神農治各種癰腫	62
闌尾炎不開刀療法	63
呃逆	64
血栓閉塞性脈管炎	64
破傷風	65
胆道結石不開刀療法	65
胆囊結石不開刀療法	66
雲南白藥止血止痛，促傷口癒合	66
痔瘡	66
治癰及慢性毛囊炎	67
癰、疽、免瘡無名腫毒	67
肛瘻	67
胆道蛔蟲非手術療法	67
治食道癌	68
燒傷及外傷化膿性炎症	68
鹽綠酒液快速洗手法	69
腰麻後頭痛針灸療法	69
甲狀腺腫治療	69
淋巴腺結核	70
腸梗阻	70
針灸治療腰麻後反應	71
針灸治療肛門術後疼痛	71
針灸治療粉瘤	71
瘡形外科	71

風濕性關節炎	71
陳舊性肩關節脫臼	73
柳枝接骨	73
關節結核	74
骨折及急性挫傷	76
婦產科	78
慢性盆腔炎	78
子宮頸癌	78
子宮頸糜爛	79
功能性子宮出血	80
不育症	81
靈驗香避孕	81
妊娠惡阻	81
痛經	81
習慣性流產	82
針灸治療婦產科疾病	83
耳鼻喉科	84
治療美尼爾氏症	84
慢性付鼻竇炎	84
慢性鼻炎	84
巴豆、硃砂治療咽白喉	85
胡氏六散丸治療喉風、喉麻痺、喉癰	85
中醫治療干酪性鼻炎	85
針灸治耳鼻喉科疾病	85
眼科	87
瀉腦湯治療視網膜神經質瘤	87
中醫治療視神經萎縮	87
清熱解毒湯、羌活勝風湯治角膜實質炎	87
中醫治玻璃體退化變	88
中藥治療電擊性白內障與早期青光眼	88
還翳散治療樹枝狀角膜潰瘍	88
中醫治砂眼	88

針灸治療眼科疾病.....	88
口腔科.....	90
潰瘍性口腔炎.....	90
小兒驚口瘡.....	90
蠟酥制劑在口腔科應用.....	91
銀花解毒湯治療頰面部化膿性炎症.....	91
豬胆膏治療蜂窩組織炎.....	91
針灸治療口腔科疾病.....	91

內 科

肝 硬 化

一、中藥治肝硬化：（重慶市第一中醫院）

治療原則：伴腹水的肝硬化，祖國醫學稱「單腹脹」其主要治療原則為「健運扶脾」，「淡參利濕」，本組均以此原則以五苓散，五皮飲二方為主，結合全身隨時加減。

處方：五苓散：豬苓、茯苓、肉桂、澤瀉、白朮。

五皮飲：茯苓皮、腹皮、冬瓜皮、陳皮、生薑皮。

隨症加入藥品：

理氣行水：厚朴、茵陳、雞內金、香附、丑牛粉。

行血逐瘀：桃仁、紅花、郁李仁、郁金、別甲、茜草。

濕脾固正：黨參、黃耆、附片、干姜。

疏肝解熱：柴胡、青蒿、黃芩、茅根。

療效：共39例

臨床治癒：症狀體徵消失，肝功正常17例

顯著療效：症狀體徵消失。肝功進步7例

好轉：症狀體徵好轉，肝功不變12例

二、肝硬化：（山東德州中醫院王子良）

處方：

（一）白茅根2兩，送服消水丹五分

服後大便下瀉5—6次，次日用消水毒1錢

仍以白茅根送服，又大便5—6次。

腹部稍小，呼吸不困難，轉柔肝，健脾利水劑。

（二）生白朮七錢、云苓兩半、玉米八錢。

赤小豆一兩、杭芍四錢、豬苓三錢、澤夕三錢。

冬瓜皮一兩、琥珀一錢、炙別甲四錢、川棟子四錢。

當歸四錢、內金四錢。

連服七劑，右肋已不作疼，但小便仍不多。

(三)乃以柔肝，健脾利水劑：

白朮七錢、云苓二兩、玉米八錢、赤小豆一兩、澤夕三錢、車前八錢、防己三錢、川楝子四錢、玉金三錢、皂丸五分、內金四錢、六曲三錢、通車一錢。

連服 9 劑、肝捫之見小，大便黑色。

(四)按以上處方去皂丸加龍胆草三錢、商陸三錢。

外以元寸商陸貼在肚臍，連貼 10 餘劑，小便正常。

共服藥約 30 劑，二便正常，腹脹消失，停藥觀察。

療效：經治一例，已有食道靜脈出血及昏迷。

治療後，肝功恢復正常，(治三個月，以休息二個月後檢查)

三、逍遙散湯治肝硬變：

(河北省中醫研究所籌備處錢琪光)

治療原則：根據臨床症狀，按陰、陽、虛、實決定治法，古人有陰水陽水之分，以脈診論，數大有力為陽，沉弱兼遲為陰，陽水以八正散為主，與胃苓湯化裁、清熱、利尿、健脾消腫、陰水以腎氣丸加減，中寒脹滿，得肉桂附子之熱其氣乃行，腹水嚴重的，先以舟車丸瀉之，這是急則治其標的辦法，應注意掌握「衰其大半而止」，當腹水消去大半時應變方治本，至於陰水雖嚴重，腎氣丸服後，小便增多，腫即消，不必用瀉。

早期治療，根據兩脅脹痛，消化不良，多本肝郁沉方法，以丹梔逍遙散清熱開郁，養脾舒肝，隨症加減即可治癒，病癒後諸症消失，脾虛氣弱時，用六君子湯善後調理，如果脅痛未根治，乃用丹梔逍遙散調治，即可收功。

具體治法：由西醫確診後，按不同體質進行治療。

(一)早期治療，脅下垂痛，肝臟腫大，脘次脹滿，口干舌苦，頭暈，小便黃，或有鼻衄牙齦出血等。

但沒有腹水，一律用丹梔逍遙散加桃仁、玉金、鼈甲、香附以破郁治脅痛，加三棱，莪朮消癥治脹痛，有黃疸的可

與茵陳蒿湯化裁。

(二)腹水治法：

陽水治法：脈實而數，腹脅脹大，小便赤黃而少，口干口苦，八正散，胃苓湯化裁，脈數實小便少，大便燥或澀而色黃，皆實用大黃，腹大如鼓，脹滿不堪，小便點滴而下，病情嚴重時，先予舟車丸輕瀉數次，再用八正散調治，這是急則治其標的意思。

陰水治法：脈微弱，下肢發涼，口不干苦，腹脅脹大，小便微黃，濟生腎氣丸加減，重用茯苓附子，脹甚加三棱，莪朮大腹皮，消癥利水。

(三)善後調理。

腹水已消，脅痛等症狀已愈，消化不良的用六君子湯加減善後調理，偶發脅痛加三棱、莪朮，如脅痛常常發現，當用丹梔滌滌散收功。

效：共45例，完全治癒17例，無效6例，接近痊癒10例，好轉12例仍在繼續治療中。

痊癒是指自覺症狀及體徵消失，肝功恢復正常者，17例痊癒者其服藥劑數16—270付，平均30付，治療日程一個半月—15個月，一般為3—5個月。

四、治肝硬化腹水：（山西中醫研究所）

治法：對脹滿迫急之嚴重腹水先以「逐水」之法用甘遂元明粉等藥研面吞服（如服藥嘔吐劇者可裝入膠囊吞服）一般情況則以「軟堅化癥」「行氣散結」「通利小便」「活血止痛」為主用別甲、海藻、木香、枳實、李仁、冬葵子、瞿麥、滑石、燈心、通草、當歸、芍藥、桃仁、紅花等藥，所用劑量較大，如通草、燈心每次達3—4兩之多，並根據體質脈症之虛實寒熱在上述治法中參合桂、附參、姜、苓、朮、運陽扶正之品，攻補兼行使郁結消散氣血暢通，以復其運化之常。

效：共11例腹水，有8例基本消失，2例顯著減少。肝功改變較少。

五、〔紫珠草〕治肝硬化食道靜脈曲張破裂出血：

(廈門市中醫院)

處方：紫珠草、又名賊仔草、創傷草，產於福建閩南一帶屬馬鞭草科。

制劑：飲片劑：每劑 6 gm 水煎湯服。

粉劑：每次量 1—5 gm 每日 6—10 gm。

片劑：每次 2—10 片每日 12—20 片。

濃縮丸：每日三次每次 8 丸。

濃縮丸：藥量少效力大，便帶，先採鮮葉洗淨搗爛和水熬純三次濾去其渣，將湯另行熬汁成膏適量配合粉劑而成丸。

本例均用粉末 6 gm 分 6 次每四小時一次，原葉 6 gm 煎代茶。

療效：共 7 例於藥後均即刻止血（均為多方治療無效而來院者）

並能治潰瘍病出血及鼻衄。

高 血 壓

一、高血压合劑：

處方：龍胆草六錢、黃芩六錢、夏枯草五錢、杜仲六錢。

在製流浸膏時加菊花一味二錢（指每劑量）。

製法：先將藥物洗淨，曬干，切碎（菊花，夏枯草需切，杜仲需去粗皮）各置於瓷盆內，用60%酒精浸24小時，48小時亦可（比例為1：3）去渣，用蒸餾法收回酒精，再將以上五味浸出液體分別過濾，分別煎成需要濃度，然後混合即成。（杜仲浸液煎至10—20分後放入固體石蠟，使之溶解。冷卻後取出石蠟，其目的在於除去杜仲膠質，再煎至一定濃度與其他浸膏混合一市斤中藥，煎成160cc.流浸膏。

用法：療程10天，每次20cc.，每日二次。

二、芡蓬標治高血压：（13例報告）

芡蓬標：日量20—40克，分三次服，煎劑效果好，無副作用，（克數是指芡蓬標乾燥後除根切碎量），初服時應由小劑量開始，並應根據病情較長時間服用（5—6個月），症狀改善後可服維持量。

於治療時同時不應忽視精神，飲食，生活規律等。

關於芡蓬標的主要成份，降壓作用機制，遠期療效及併發症，最有效劑量等須進一步研究。

三、中藥加針灸治高血压：

（124例，療效100% 北京中醫研究所）

分型治療：

（一）虛性高血壓：

腎虛肝旺：知柏地黃丸、六味丸、補腎煎、虎潛丸。

上實下虛：地黃飲子、桂附八味丸、安腎湯、茸珠膏。

肝陽不足：大定風珠、真珠母丸、一貫煎、三甲復脈湯。

營血不足、虛風上攔：地黃骨皮湯、當歸川芎湯、滋陰和陽丸、四物湯。

氣虛下陷：升陷湯、補中益氣湯、加味理陰煎、人參益氣湯。

營衛失調：桂枝加桂湯、參芪五物湯。

針灸主要穴位：肩髃、曲池、合谷、內關、神門、三里、三陰交、太沖、膏肓、腎俞。

(二)實性高血壓：

風痰上攔：加減白附子丸、辰珠遠志丸、星夏湯。

肝風上逆：本事鉤藤散、羚羊角散、龍胆泄肝湯。

針灸主要穴位：上脘、中脘、承滿、梁門、天樞、上脘、解谿。

(三)寒性高血壓：

髓海空虛：龜鹿二仙膠和滋珠丸、胡桃枸杞湯、滋陽潛陰湯、壯水滋燥湯。

寒氣上沖：黑錫丹、桂附八味、三建三生湯。

針灸主要穴位：手三里、陽關、氣海、關元、足三里、陽陵、曲泉。

(四)熱性高血壓：

肝胆風火上逆：黃芩湯、龍胆泄肝湯、當歸龍薈丸。

胃腸泄熱：三石湯、陶氏黃芩湯、承氣陷胸湯。

燥熱生風：調胃承氣湯、葛根黃芩黃連湯、防風通聖散。

針灸主要穴位：手十二井出血、十宣出血、大椎、曲池、合谷、外關、豐隆。

(五)氣穴阻礙性高血壓：

氣虛血滯：補陽還五湯。

血郁氣滯：通經逐瘀湯。

針灸主要穴位：

氣：肩髃、曲池、巨骨、肩井、支溝、陽陵、內庭、三里、至陽、膈俞。

血：曲池、內關、陽陵、三陰交、血海、膈俞。

四、云母治高血压：

(云南曲靖专区医院 300例 疗效90%)

處方：鍛赭石、生杜仲、云母石、石決明、白芍、牡蠣、杭菊、全虫、當歸、天麻、蒼耳子、黃芩、夏枯草。

制成丸劑，每日三次，每次4—8丸經三個月自覺症狀減輕。

五、蘿芙木(假辣椒、寿比南)治高血压：

廣西僮族自治區中醫藥研究所。

根切片每日1—1.5兩煎湯一碗，分二次服，治三天血壓降10—30mmHg。

六、桑叶膏治高血压：(淮南礦工醫院中醫楊星庠)

症狀：頭昏、眩暈、血壓高、面熱、手足麻。

處方：鮮桑葉2斤加水4斤煎取7分去渣，微火濃縮成膏約2斤。

服法：每日三次，每次一兩，可加入白糖。

七、二仙湯治高血压：(婦女高血壓特效)

(上海中醫學院)

處方：二仙湯：仙茅、仙靈脾、巴戟天、當歸、知母、黃柏。

每味各三錢，煎二汁，二次服完，每日各一劑。

效：336例，顯效28.7%。

八、臭梧桐治高血压：

(上海中醫學院附第十一人民醫院)

處方：臭梧桐，每日10—16克(每片0.5克)分3—4次口服

效：共430例，有效72.6%。

九、牡丹皮治高血压：

(上海第三人民医院中医研究班)

處方：牡丹皮每日1兩半—2兩，煎湯後分二次服。

十、高血压方：(哈尔滨祖国医学院研究所)

- | | | |
|----------|-------|-------|
| (一)生 赭五錢 | 生龍骨四錢 | 生牡蠣四錢 |
| 懷牛夕四錢 | 大生地六分 | 生石決四錢 |
| 寒水石四錢 | 生石羔五錢 | 甘 草二錢 |
| 菊 花三錢 | 鈎 藤三錢 | 紫石英五錢 |
| (二)龍 胆三錢 | 黃 芩三錢 | 山 枝三錢 |
| 大 黃一錢半 | 川 羌三錢 | 厲 風二錢 |
| 川 芎二錢 | 西 歸三錢 | 荆 子三錢 |
| 薄 荷二錢 | 甘 草二錢 | |
| (三)當 歸三錢 | 生地黃五錢 | 桃 仁三錢 |
| 枳 壳二錢 | 紅 花二錢 | 赤 芍三錢 |
| 柴 胡二錢 | 川 芎二錢 | 桔 梗二錢 |
| 懷 夕三錢 | 甘 草二錢 | |

(四)安神丸：每日三次，每次一丸。

十一、葛湯、葛糊治高血压：

處方：(一)粉葛湯：生粉葛2—5市斤，去皮切成小塊加水4—10碗(1市斤加水2碗)煎成1碗，頓服或2次服，5—7天服一次。

(二)粉葛糊：粉葛粉16克，加水一碗煎成糊加入糖類調味，一日服1—2次。

傳染性肝炎

一、中藥治療傳染性肝炎：（北京中醫研究院）

急性黃疸期：茵陳四苓湯甘露消毒丹。

肝脾大者：以化堅丸溫胆湯柴胡、桂枝湯為主。

消化功能障礙者：柴平湯、溫胆湯、香砂養胃丸為主。

肝功不良者：化堅丸小柴胡合劑溫胆湯。

療效：退黃快，肝脾縮小速共治93例效果97.7%

二、茵陳苡米湯治療傳染性肝炎：

（蕪湖專署醫院中醫科張必烈）

處方：茵陳苡米湯：茵陳三錢、苡米六錢、紅棗五個、廣皮二錢、豬苓、茯苓各二錢、佛手二錢、冰糖1兩。

加減法：嘔吐加叩穀合香，

腹部膨加厚朴大腹皮

發燒：加連翹黃芩

腹瀉：加車前子澤瀉

咳嗽：加竹荪貝母藕芥

肝大久不消：加何首烏，當歸白芍青皮鱉甲柴胡。

用法：小孩1—3歲，每日分3—4次。

成人加½量

效果：共44例治愈率90%

三、傳染性肝炎：（天津市立中医医院）

屬黃疸病：陽黃採用金匱要略。

處方：茵陳蒿湯加味

效：共249例痊癒率95%

服藥後：退燒1—2天，黃疸消7—8天，肝恢復15—60天三

胆陰性10—20天，肝功正常15—30天。