



庭园调色板

景观植物色彩搭配



百通集团

江西科学技术出版社



本书原出版者为英国 Quarto 出版公司, 经授权由百通集团成员出版社
在中国大陆地区出版发行中文简体版。

图书在版编目(CIP)数据

庭园调色板—景观植物色彩搭配 /

[英]珍尼·亨迪著, 陈少风译,

—南昌: 江西科学技术出版社, 2000.1

ISBN 7-5390-1612-4

I. 庭… II. ①亨…②陈… III. 园林植物—图谱

IV. S 68-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字[1999]第 67557 号

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

百 通 集 团

广东科技出版社	北京出版社
吉林科学技术出版社	中国建筑工业出版社
辽宁科学技术出版社	电子工业出版社
天津科学技术出版社	浙江科学技术出版社
河南科学技术出版社	云南科技出版社
安徽科学技术出版社	上海科学技术出版社
黑龙江科学技术出版社	江苏科学技术出版社
江西科学技术出版社	广西科学技术出版社
贵州科技出版社	北京科学技术出版社
四川科学技术出版社	

庭园调色板——景观植物色彩搭配

著 者: [英]珍尼·亨迪 摄影: 彼得·史蒂尔斯

译 者: 陈少风

出版发行: 百通集团

江西科学技术出版社

责任编辑: 刘 峰

特约编辑: 彭春红

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

经 销: 各地新华书店

开 本: 850mm × 1168mm 1/16

字 数: 300 千字

印 张: 12.5

版 次: 2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5390-1612-4/S · 402

定 价: 128.00 元

(赣科版图书凡属印装错误, 可向出版社发行部调换)

庭园调色板

景观植物色彩搭配

〔英〕珍尼·亨迪 著

陈少风 译



百通集团

江西科学技术出版社



GARDENER'S GUIDE TO COLOUR AND HEIGHT



JENNY HENDY
PHOTOGRAPHY BY PETER STILES



目 录



引 言

6 - 9

绿 色



64 - 79

蓝 色



128 - 141

黄 色




142 - 169

粉 色



10 - 45

橙 色



46 - 63

红 色




80 - 99

白 色



100 - 127

紫 色



170 - 192

索 引

193 - 200

如何使用本书



图示简洁的色彩设计——以淡蓝色三色堇为主色块,用四季秋海棠镶边栽植,极为醒目

色彩设计

在庭园种植时色彩的运用虽然受到限制,但色彩通常比庭园中其它组成部分给人的视觉感观效果更显著。本书的意图在于使您能容易地设计出以色彩为主调的花境,在每一章的开头,您会发现许多单一色和组合色调设计的好点子,但重要的是要注意,在园林配植中,主色调的选择依赖于一年中时间的变换。比方说,整年要保持蓝色的花境是不容易的,因为冬季缺少蓝花植物,这时搭

配其它色彩,如黄色,就很有效了。而且,双色花境在某些季节能表现出更大的活力和生机。

用1年生植物来作色彩的配置是很适合的,如果出现某些差错,您能在下个季节再试验。对于一个混合式花境的永久性配置,最明智的办法是用几种常绿植物做主调(即骨干树种),以保持连续性。叶子和花同样重要。叶子虽然没有花那么鲜艳的色彩,但呈现的时间长。叶色变化多端、五彩缤纷,在特殊色彩设计中起衬托鲜花的作用。

当然,设计花坛还要考虑其它因素。例如,利用不同的外形和结构组合以形成强烈的对比。书中近距离摄影和普通摄影图片及描述将为您提供植物配置的好主意。在黑色与白色的组合中,你会发现有种类繁多的搭配方式。花期也同样是重要

问题,因为一个设计要收到好的效果,就必须有令人满意的植物配置,这些植物能在同一时期开花。如果一些植物在图纸的设计上能配置出鲜艳美丽的色彩,而这些植物的花期不同,那么这种设计毫无意义。

最后,您不必坚持花境终年同一种色彩!您可以按季节选择一种主色调,随季节变化用其它对比色或互补色加以点缀,以渲染和烘托气氛。具鳞茎植物和1年生植物能带来这样的变化,因此特别有用。

季节变化

每一色章均以介绍春季开花植物开始,逐渐介绍夏花和秋花植物,最后是冬季开花的植物。有些植物的观赏期较长,可达数月,但只在某章中介绍。因为通常在这个时期其观赏效果最佳。在气候比较温暖的地区,冬季非常暖和,或者说冬季根本不存在,植物实际上全年持续地开花。凤仙花就是一个很好的例子,这种花在无霜区不仅持续开花而且还自播繁衍。月季在温暖的气候条件下也生长良好,它春季开始开花,一直持续到晚

下图为一典型样页,右图为样页中某一种植物的详细内容说明。

颜色

后面
4呎(1.2米)
或更高

中间
2至4呎
(0.6~1.2米)
或更矮

前面
2呎(0.6米)
或更矮



近景植物

普通景植物

图示植物耐寒性,喜阴或喜阳特征



LATIN NAME: *Rosa 'Ferdinand Picard'*
COMMON NAME: Shrub rose
ALTERNATIVES: *R. gallica 'Versicolor,' 'Tricolore de Flandre'*
DESCRIPTION: Hybrid Perpetual shrub rose with tight clusters of fragrant double blooms, palest pink streaked crimson and red. Bushy habit.
HEIGHT AND SPREAD: 4+ x 3ft (1.2+ x 0.9m)
BLOOMING PERIOD: Spring to autumn
SOIL: Rich, moisture-retentive, humus-rich. Good on well-cultivated clay soils.

5-9

与上图所示植物有相近观赏效果的种或品种

秋。植物的开花期有明显的不同,这在描述栏中有所提示。

理想的花境是全年都能显示出绚丽多彩、优美的景观。但实际上这是很难做到的,尤其是当你试图保持一种较特定的色彩的时候。所以,更好的办法是在整个季节中,使花境出现一系列的色彩高峰。在花境色彩平淡时,用1年生植物和不耐寒的多年生植物作为补充,以增添色彩。

种植的高度

在每一页的顶栏为花境的背景植物,这类植物的高度超过4呎(1.2米),中间一栏的植株高度一般在2~4呎(0.6~1.2米)之间,而底栏也就是花境的前景植物,株高一般不超过2呎(0.6米)。但在较暖和的气候下,尤其是无霜区,生长不受抑制,植株的生长可远超出上述所列出的植株高度,攀缘植物、灌木和乔木尤其如此。

利用高度来选用相应花卉材料。例如,如果花境非常狭小,那么栽种的植物不能高于4呎(1.2米)。也不必刻板地把较高的植物作背景。在花境边缘矮小植物间点缀一些较高大的材料有较好

薰衣草是原产地中海地区的草本植物,与多数银叶或灰叶植物一样,必须在完全光照条件下才能旺盛生长及最大程度的开花。



的观赏效果。可以选择一些相当纤细、稀疏的或疏松、轻盈的种类,不致于挡住后面的植物。

光照或遮荫

有一些植物在完全光照下生长旺盛,而另一些植物则喜微阴。有许多种类属于耐荫型,它们能在树木斑驳的荫影下或在 1 日中只有部分时间才能得到光照的花境某处生长。只有少数植物能忍受全荫条件,如在完全没有直射光线条件下生长。为使您能选择适合光照条件的植物,我们设计了下面的图解:



要求完全光照。



喜欢阳光充足,但在部分遮荫下生长良好。




要求部分遮荫,在完全光照或完全遮荫下生长不良。



不能忍受完全光照,在部分遮荫或全荫条件下生长良好。



在全荫下生长旺盛。



在任何光照条件下均可良好生长。

土壤类型

本书列出了每种植物所适宜的土壤类型。通常成功的关键在于排水系统。太干或太湿都不利于植物生长。喜欢在排水良好的条件下生长的植物常能短时期地忍受干旱。多数植物要求根部保持湿润,尤其在生长季节,一旦土壤太湿或积水,

生长就会受到损害。通过施用大量有机物质(腐殖质)或覆盖地面,可使根部保持湿润。当土壤干旱时,适度遮荫可减轻矛盾。几乎所有的花境植物都不能在太湿或沼泽地生长,但也有适应在积水或常年水湿环境生长的可观赏的植物。

土壤的酸度和碱度用 pH 值(1~14)来表示, pH 值等于 7.0 为中性, pH 值小于 7.0 为酸性, pH 值大于 7.0 为碱性。在开始栽植之前,了解土壤的酸碱度是很有必要的。因为有些植物对土壤的酸碱度有特殊的要求,如果您不加考虑,那么可能会导致失败,从而浪费时间和金钱。您可以买一套既便宜又容易使用的测量工具。喜酸植物如杜鹃类和山茶类植物土壤 pH 值必须为 7.0 或小于 7.0,并常常要求湿润、富含腐殖质的土壤。大多数植物能耐弱酸、中性或弱碱性条件,在这种情况下文中未提及土壤的酸碱度。只有少数植物能在强碱性或富含石灰质的 pH 值大于 7.0 的土壤中生长良好。

土壤肥力是另一个要考虑的因素。庆幸的是任何肥力条件的土壤都有其适合生长的植物。在贫瘠、干旱、多石的土壤,“饥饿”植物如灌木蔷薇花生长不良,除非通过耕作改良条件。而耐旱、喜阳的地中海植物,包括许多芳香草本和银叶灌木在上述条件下生长旺盛。可以通过施加化肥、粪肥和混合肥料来保持土壤肥力,这很重要。但也要记住肥沃、施肥过多会使某些植物,如耐寒性 1 年生草本的叶子增多而着花减少。过量施肥还使植株柔软、多汁,易受虫害、霜害。



杜鹃属,杜鹃及杜鹃科其它植物,包括马醉木和许多欧石南等,必须在酸性土壤才能旺盛生长。如土壤稍微含有石灰质,会导致植物叶片变黄(缺绿病)和死亡。

耐寒性

每种植物都有1个数字或1列数字符合下面的地图分区。如果知道您的居住地所在气候区域,那么您看一下地图就可知道某一特定的植物在您的花园是否能旺盛的生长,是否需要冬季保护。1年生植物一旦开花过程结束,就会死亡。因此在任何气候区都能生长的1年生植物,本书都

注有花的符号。


耐寒性不只是一个最低温度的问题。不良的排水系统常常明显地导致植物在冬季不能存活。在极冷的条件下,暴露在寒风中的植物其伤害极为严重。如果提供庇护场所,如秋季在地面上加上厚覆盖防止根部被冻结,那么有许多脆弱的植物都能度过冬季。

5-7 气候分区式样(见右图解)

 1年生植物

地图气候分区图解

- | | | |
|------|--|--|
| 1 = |  | 低于 -10°C (-50°F) |
| 2 = |  | $-9 \sim -10^{\circ}\text{C}$ ($-40 \sim -50^{\circ}\text{F}$) |
| 3 = |  | $-8 \sim -9^{\circ}\text{C}$ ($-30 \sim -40^{\circ}\text{F}$) |
| 4 = |  | $-6 \sim -8^{\circ}\text{C}$ ($-20 \sim -30^{\circ}\text{F}$) |
| 5 = |  | $-5 \sim -6^{\circ}\text{C}$ ($-10 \sim -20^{\circ}\text{F}$) |
| 6 = |  | $-4 \sim -5^{\circ}\text{C}$ ($0 \sim -10^{\circ}\text{F}$) |
| 7 = |  | $-3 \sim -4^{\circ}\text{C}$ ($10 \sim 0^{\circ}\text{F}$) |
| 8 = |  | $-1 \sim -3^{\circ}\text{C}$ ($20 \sim 10^{\circ}\text{F}$) |
| 9 = |  | $0 \sim -1^{\circ}\text{C}$ ($30 \sim 20^{\circ}\text{F}$) |
| 10 = |  | $1 \sim 0^{\circ}\text{C}$ ($40 \sim 30^{\circ}\text{F}$) |



对于不用气候分区地图的其它国家,可用下列符号表示:



半耐寒,耐 0°C (30°F) 以上的温度。



耐寒,能忍耐 -5°C (-10°F) 以上的低温。



极耐寒,能忍耐 -6°C 或 -6°C 以下 (-20°F 或以下) 的低温。



粉 色



纯粉色是由最基本的红色和白色调合而成的。人们通常所指的粉色,其色调的范围非常之大。在不断调入冷色后,粉色渐渐过渡到蓝粉色最终变成淡紫色,而不断调入暖色后,粉色渐渐过渡到黄粉色最终变成柔和的桃色。在花境中用冷暖两端的粉色如用蓝粉色和黄粉色相邻搭配的效果通常不佳。亮鲑肉色通常很难配置,而当其处在冷色调——白色、净蓝色和灰绿色的环境之中,则有恰到好处之感。通常认为粉色与黄色的组合有悖常规,但鲑肉色与黄色的搭配能产生意想不到的效果。这正是值得尝试的事情!

淡粉色在人的眼里是柔和的,在庭园中能产生宁静与和谐的气氛。粉色花境的设计相对比较容易,在整齐的常绿树篱背景的烘托下,粉色显得非常美丽。橙色和粉色搭配令人赏心悦目。

粉色与玲珑剔透的白花和银叶搭配极具浪漫色彩。蓝粉色与浅紫色和蓝色的完美组合表现出轻柔而优雅的特征。当然不能一味地热衷于色调的组合,否则您的设计将缺乏深度而毫无新意。在鲜红色或深红色中用粉色加以点缀使整个色彩分层,观赏效果倍增。



学名: *Rhododendron* 'Christmas Cheer'

俗名: 杜鹃

替换种: 'Pink Pearl'

描述: 常绿灌木。花朵密集成圆头状花序, 花冠漏斗形, 淡粉色。本种杜鹃一般在晚冬或初春开花, 如遇气候寒冷可能会提前开花。

高度与冠幅: 4 呎 × 5 呎 (1.2 米 × 1.5 米)

花期: 冬季至初春。

土壤: 湿润、富含腐殖质的酸性土壤。



5-7



学名: *Prunus* × *subhirtella* 'Autumnalis Rosea'

俗名: 日本早樱, 冬花樱

替换种: *P. mume* 'Beni-chidori'

描述: 落叶乔木, 树姿轻盈。叶卵形, 入秋呈黄色。花在温暖的冬季先叶而开, 簇生, 玫瑰粉色。

高度与冠幅: 24 呎 × 24 呎 (7 米 × 7 米)

花期: 晚秋至初春。

土壤: 任何排水良好的土壤。



4-9



学名: *Daphne mezereum*

俗名: 欧亚瑞香

替换种: *D. odora*

'Aureomarginata'

描述: 落叶灌木, 花先叶而开, 密生于枝上, 花萼花瓣状, 4 枚, 粉紫色, 浓香。浆果红色, 有毒。叶小, 披针形。


高度与冠幅: 2½ 呎 × 3 呎 (0.75 米 × 0.9 米)

花期: 晚冬至初春。

土壤: 排水良好而又湿润, 深厚而富含腐殖质的肥沃土壤。



4-9



学名: *Erica erigena* 'Superba'

俗名: 地中海欧石南, 爱尔兰欧石南

替换种: 'Brightness', 'Irish Salmon'

描述: 常绿灌木。叶针形, 绿色, 冬季暗绿色。穗状花序, 花小, 花冠钟形, 具芳香。栽种地必须是酸性土壤。夏季潮湿生长旺盛。

高度与冠幅: 4 呎 × 4 呎 (1.2 米 × 1.2 米)

花期: 晚冬至春季。

土壤: 富含腐殖质, 湿润的酸性土壤。



8-10



学名: *Cyclamen coum*

俗名: 希腊仙客来

替换种: *C. persicum* cultivars

描述: 多年生草本, 具块茎。叶心脏形, 表面绿色有银色斑纹, 十分美丽。花紫粉色。是落叶乔木和灌木林下优良的地被植物。

高度与冠幅: 4 吋 × 2~4 吋 (10 厘米 × 5~10 厘米)

花期: 冬季。

土壤: 富含腐殖质, 湿润而排水良好的土壤。



7-9



学名: *Primula* × *polyantha* 'Crescendo Rose'

俗名: 多花报春, 西洋报春

替换种: Rainbow 系, Wanda 杂种系, Hercules 系

描述: 耐寒性多年生草本, 作 2 年生栽培用于春季花坛布置。叶基生成莲座状, 绿色, 有皱。花茎由叶丛中抽出。摘心并摘除黄叶。


高度与冠幅: 9~12 吋 × 12 吋 (23~30 厘米 × 30 厘米)

花期: 春季。

土壤: 湿润土壤。



3-9



4-9

学名: *Magnolia stellata* 'Rosea'

俗名: 日本玉兰, 星花木兰


替换种: 'King Rose', 'Susan'

描述: 灌木, 小枝初为直立, 后开展, 树冠呈半球形。先花后叶, 叶卵形, 花星形, 花被片多数, 条形, 有芳香。

高度与冠幅: 8 呎 × 12 呎 (2.5 米 × 3.5 米)

花期: 初春。

土壤: 忌强碱性土壤。



4-9

学名: *Magnolia* × *soulangiana*

俗名: 郁金香玉兰, 朱砂玉兰

替换种: *M.* × *loebneri* 'Leonard Messel'

描述: 大型灌木。茎分枝直立。叶大, 宽卵形。花先叶而开, 花冠高脚杯形, 淡粉色, 渐变为紫色, 十分娇美。

高度与冠幅: 13 呎 × 13 呎 (4 米 × 4 米)

花期: 春季。

土壤: 腐殖质丰富、湿润的土壤。在粘土中生长良好。



7-8

学名: *Rhododendron* × *cilpinense*

俗名: 杂种杜鹃

替换种: *R. Williamsianum*, *R.* 'Praecox', *R. yakushimanum*

描述: 半常绿灌木, 株形紧凑。叶暗绿色, 有光泽。花簇生, 花冠钟形, 里面浅粉色, 外面深粉色, 雄蕊暗褐色, 蕾期深粉色。

高度与冠幅: 4 呎 × 4 呎 (1.2 米 × 1.2 米)

花期: 初春。

土壤: 湿润、富含腐殖质的酸性土壤。



2-7

学名: *Prunus tenella* 'Fire Hill'

俗名: 矮扁桃

替换种: 无

描述: 灌木。茎直立, 丛生。花先叶开放, 花朵繁密, 沿枝排列, 满树嫣红, 十分美丽。'Fire Hill' 是本种中的一个矮生类型。

高度与冠幅: 4 呎 × 3 呎 (1.2 米 × 0.9 米)

花期: 初春。

土壤: 任何排水良好的土壤, 忌强碱土。



5-9

学名: *Primula vulgaris* subsp. *sibthorpii*

俗名: 高加索欧报春, 耐寒报春

替换种: *P. Wanda* 杂种系

描述: 耐寒性多年生草本。叶基生, 形成莲座状叶丝, 有皱。花萼短, 单花顶生, 花冠圆形, 淡粉紫色。

高度与冠幅: 6 吋 × 6 吋 (15 厘米 × 15 厘米)

花期: 初春至仲春。

土壤: 排水良好, 湿润的土壤。



9-10

学名: *Veltheimia bracteata*

syn. *V. undulata*, *V. viridifolia*

俗名: 同拉丁名

替换种: 无

描述: 百合科多年生草本。具鳞茎。叶基生成莲座状, 宽条形, 有光泽。顶生穗状花序, 花被管状, 粉色、红色或橙色, 先端绿色。

高度与冠幅: 12 ~ 18 吋 × 10 ~ 15 吋 (30 ~ 45 厘米 × 25 ~ 38 厘米)

花期: 晚冬。

土壤: 排水良好的土壤。




学名: *Camellia* × *williamsii* 'Bow Bells'
 俗名: 杂种山茶 威廉斯山茶
 替换种: 'Donation', 'November Pink'
 描述: 常绿灌木。叶长椭圆形至披针形, 绿色, 有光泽。花半重瓣型, 花冠漏斗形, 玫瑰粉色。花期很长。
 高度与冠幅: 10 呎 × 10 呎 (3 米 × 3 米)
 花期: 晚秋至初春。
 土壤: 富含腐殖质、湿润的酸性土壤。



学名: *Rhododendron racemosum*
 俗名: 总状杜鹃花
 替换种: 无
 描述: 常绿灌木, 生长健壮。分枝坚挺, 直立性强。叶小、暗绿色, 芳香。花小而多、簇生, 花冠漏斗形, 浅粉色。
 高度与冠幅: 8 呎 × 8 呎 (2.5 米 × 2.5 米)
 花期: 春季。
 土壤: 湿润、富含腐殖质的酸性土壤。



学名: *Rhododendron* 'Kirin'
 俗名: 常绿杜鹃, 克鲁姆杜鹃
 替换种: 'Blaauw's Pink', 'Hino-mayo'
 描述: 常绿杜鹃, 分枝紧密, 丛生状。叶小, 卵形, 暗绿色。花小, 繁多, 花冠漏斗形, 初为深玫瑰色, 渐变为淡粉色。
 高度与冠幅: 4 呎 × 4 呎 (1.2 米 × 1.2 米)
 花期: 春季。
 土壤: 湿润、富含腐殖质的酸性土壤。



学名: *Hebe albicans* 'Red Edge'
 俗名: 红边拟婆婆纳
 替换种: 'Candy'
 描述: 常绿灌木, 树冠呈典型的半球形。叶小, 灰绿色, 镶有细细的红边。幼枝先端粉色。穗状花序短, 花白色。花后稍修剪。
 高度与冠幅: 2 呎 × 3 呎 (0.6 米 × 0.9 米)
 花期: 初夏。
 土壤: 任何排水良好的土壤。



学名: *Erica carnea* 'Myretoun Ruby'
 俗名: 春欧石南, 冬欧石南
 替换种: 'December Red', 'King George', 'Pink Spangles'
 描述: 常绿小灌木, 是良好的地被植物。叶针状, 暗绿色。花小、密集、成簇, 花冠钟形。花后稍作修剪。
 高度与冠幅: 8 吋 × 18 + 吋 (20 厘米 × 45 + 厘米)
 花期: 晚冬至初春。
 土壤: 排水良好而富含腐殖质的土壤, 忌碱性土。



学名: *Bellis perennis* 'Robella'
 俗名: 雏菊
 替换种: 'Monstrosa', 'Goliath' 和 'Radar' 品系
 描述: 短命 (生长期短) 的多年生草本, 常作 2 年生栽培, 供春季花坛用。叶基生成莲座状。花葶细长, 头状花序大, 完全重瓣。
 高度与冠幅: 3 ~ 6 吋 × 6 吋 (7.5 ~ 15 厘米 × 15 厘米)
 花期: 仲春至仲夏。
 土壤: 任何排水良好的土壤。



学名: *Pieris* 'Flamingo'
俗名: 铃兰马醉木
替换种: 'Pink Delight', 'Christmas Cheer', 'Valley Rose'
描述: 常绿灌木, 枝直立, 丛生。叶小, 先端急尖, 暗绿色。蕾期越冬, 圆锥花序, 下垂, 花冠钟形, 深粉色。
高度与冠幅: 6 呎 × 10 ~ 12 呎 (1.8 米 × 3 ~ 3.5 米)
花期: 仲春至晚春。
土壤: 湿润、富含腐殖质的酸性土壤。



学名: *Chaenomeles speciosa* 'Moerloosii' ('Appleblossom')
俗名: 木瓜
替换种: *C. × superba* 'Pink Lady'
描述: 灌木, 株形开展, 茎有刺。花簇生于枝上, 形似苹果花。有时结果, 果小, 芳香。
高度与冠幅: 10 呎 × 10 呎 (3 米 × 3 米)
花期: 冬季至春季。
土壤: 任何排水良好的土壤, 忌强碱土。



学名: *Dicentra spectabilis*
俗名: 荷包牡丹, 里拉花
替换种: 无
描述: 多年生草本。叶有裂, 形似蕨类植物。花序梗拱形, 总状花序, 花朵着生一侧并下垂, 花心脏形, 白色和红色。是优良的切花材料。
高度与冠幅: 2 呎 × 1½ 呎 (0.6 米 × 0.45 米)
花期: 晚春至初夏。
土壤: 富含腐殖质的湿润土壤。



学名: *Daphne odora* 'Aureomarginata'
俗名: 瑞香, 金边瑞香
替换种: *D. odora*, *D. bholua* 及栽培品种
描述: 常绿灌木。叶有光泽, 深绿色, 叶缘黄色。花粉紫色和白色, 芳香浓郁。喜荫凉。
高度与冠幅: 3 呎 × 3 呎 (0.9 米 × 0.9 米)
花期: 仲冬至初春。
土壤: 土层深厚, 富含腐殖质的肥沃土壤, 耐中等碱性土壤。



学名: *Erythronium revolutum* Johnsonii Group
俗名: 猪牙花, 赤莲
替换种: *E. revolutum*
描述: 多年生草本, 具块茎。茎中部以下具叶, 叶披针形, 绿色, 有十分明显的褐色斑纹。花茎纤细, 花大、点垂, 花被片反卷, 粉红色。
高度与冠幅: 8 ~ 12 吋 × 6 吋 (20 ~ 30 厘米 × 15 厘米)
花期: 春季。
土壤: 富含腐殖质、湿润而又排水良好的土壤。



学名: *Epimedium grandiflorum* 'Rose Queen'
俗名: 淫羊藿
替换种: *Epimedium × rubrum*
描述: 常绿多年生矮小植物。叶美丽, 心脏形, 绿色略带铜色。花茎纤细, 花簇生, 下垂, 花形奇特, 有距。
高度与冠幅: 12 吋 × 12 吋 (30 厘米 × 30 厘米)
花期: 春季。
土壤: 湿润、腐殖质多的土壤。