

农业生产知識

畜牧

养 羊

YANG YANG

兰文龄 蔣树威編写



农业出版社

AMT646/0/04

目 录

一 养绵羊	1
一、我国的优良羊种	1
二、绵羊的習性	3
三、种羊的挑选	4
四、种羊的飼育	5
五、选配	6
六、孕羊的管理	6
七、接羔和育羔	7
八、放牧	10
九、綿羊的管理	10
十、怎样宰羔剥羔和羔皮的保存	14
十一、羊舍羊棚及用具	15
十二、綿羊的疾病和寄生虫	18
二 养山羊	26
一、山羊的飼养方法	26
二、山羊的管理	32
三、注意山羊害病	35

一 养綿羊

一、我国的优良羊种

我們已知道的我国綿羊品种計有十二种，現把主要的羊种介紹在后面：

新疆羊 是我国毛肉兼用的細毛羊新品种，是在党和政府正确領導及苏联專家帮助下育成的。头部多毛，胸寬而深，四肢坚实，頸有一到二个皺折，公羊有粗大象螺旋形的角，母羊無角或只有不發达的角，公羊平均体重 130 市斤，好的达 184 市斤；母羊平均 92 市斤，好的达 124 市斤。产毛量公羊 16 市斤，好的达 24 市斤；母羊 13 市斤，好的达 22 市斤。細度極大多數为 64 支，毛長 7 公分。这种細毛羊能耐寒冷和粗劣的飼料，适应能力强，是我国珍貴的細毛羊品种，現已利用这个种在各省进行綿羊杂交改良工作。

蒙古羊 原产蒙古，現在分布在我国广大地区，是我国綿羊品种中数量最多分布最广的一种，它的外形和特征，隨着生長地区而不同，一般头及四肢具有黑色或褐色的毛，体軀为白毛，前軀發育較差，脂尾粗大，公羊有角，母羊角小或無角，毛質粗長。成年公羊体重为 95 市斤，成年母羊体重为 71 市斤，剪毛量公羊 4.4 市斤，母羊 3 市斤。蒙古羊具有坚强的体質，适应性强，能耐粗劣的放牧管理，肉質优良，受到广大人民的欢迎。

西藏羊 分布在青海、四川、西藏及甘肃的部分地区，这种羊在我国羊数来说也占有相当大的数字，因随着分布地区不同，它的外形和性能有了很大差别，一般个体较大，鼻梁隆起，四肢高长，公羊大都有两个向外扭转的角，母羊较小，羊毛大体为白色，头及四肢带黑色及其他杂色，毛质粗长，富于弹性，在国际市场上为有名的粗毛羊，即西宁毛。

哈萨克羊 主要分布在新疆维吾尔自治区，但在甘肃、青海两省有极少数的哈萨克羊。这个品种的体型中等，四肢高长，公、母羊有角的多，角向后弯曲，为脂尾型，但不下垂，成“u”形，背平直，死毛较多，毛色很杂，有白、黑、褐、灰色等，或各种毛色混生。新疆区托里地方的哈萨克公羊平均体重为125市斤，好的达170市斤；母羊体重为95市斤，好的达112市斤；产毛量公羊为3市斤，母羊为1.8市斤。这种羊生长迅速，油脂较多，为优良的肉用粗毛羊。

寒羊 蒙古羊长期饲养于山东、河南、河北等省，逐渐形成了现在的寒羊。这个品种分布在山东、河北、河南、山西等省。寒羊体型中等，毛色全白，公、母羊角的有无，因地区而不同，鼻梁隆起，背平直，肋部开张，脂尾粗大，常使臀部倾斜，公羊体重80—140市斤，母羊50—100市斤，产毛量3—4市斤，羔皮品质良好，羊毛可制呢絨和哔嘰，是我国羊毛中较好的一种，寒羊的繁殖力高，一年可生产二次，每次产羔二到三头。

湖羊 湖羊的祖先也是蒙古羊，但它的外形和性能和蒙古羊有了区别，这个品种现多分布在浙江、江苏两省。湖羊全体白色，鼻梁隆起，耳大下垂，公、母羊有角的很少，尾大成圆形，公羊体重70—90市斤，母羊64—76市斤，产毛量一般为1市斤。羔羊毛皮品质优良，花杂美观，在国际市场上评价很

高。湖羊一年能产羔二次，每次生羔二到三头，并有早熟性。

同羊 同羊分布在陕西省西安的东西部几个县，它的毛为白色，体型中等，公、母羊皆無角，額部狹窄，后軀發達，頸部較長，有时額下有二肉瘤，脂尾粗大，有重达十余市斤的，公羊体重100—120市斤，母羊80—90市斤；产毛量3—4市斤。优良的同羊，毛質纖細良好，可織上等毛織品。

灘羊 灘羊分布在宁夏回族自治区的銀川一帶，公羊有角，母羊大多無角，具有小型脂尾。公羊平均体重70—82市斤，母羊64—76市斤。这种羊适合于裘皮的利用，生产有名的灘羊二毛皮，这种二毛皮，毛叢弯曲美观，华东人民称为蘿卜絲，潔白輕暖，为广大大人民所喜好。

其他尚有新疆的庫車羊和閩羊、吉薩尔羊，甘肅的山谷羊等品种。

二、綿羊的習性

綿羊是一种性情溫柔的小家畜，对牧草和各种農業副产品都很欢喜，所以是人类有利的經濟家畜，現在說明它的主要習性如下：

綿羊的性情 綿羊是溫柔、馴服、胆怯、懦弱的家畜，如一群羊遇到惊吓和兽害，全群就乱跑起来，毫無抵抗和自衛能力，这种情况尤以粗毛羊表現更为突出。有些公羊虽然生長有粗大的角，看起来是英姿雄壯，可是它們也不能用来作防御的武器。又如湖羊，長期飼养于陰暗舍內，很少見人，偶見生人，就惊慌乱跑起来。

合群性 綿羊有强大合群性，这种优良天性，給我們在放牧管理上有了很大的方便，例如一个飼养員可放牧几百头一

群的羊，在廣闊的草原上自由吃草，一個也不至丟失，這是依靠着羊本身有了強大的合群性的緣故。

選擇牧草 綿羊是反芻家畜的一種，吃草範圍廣大，最喜歡吃松軟的細草，及樹枝嫩芽，凡經過羊腳踐踏和粘污尿糞的牧草，羊不喜食。

食息時間 一般放牧的羊，多是整日采食，牧工趕着羊群早出晚歸，在放牧過程中，一般三小時左右吃飽後停食休息，一日吃飽三次。冬季晝短夜長，牧草枯萎，應給少量補飼。產毛量高而毛質優良的細毛羊群，單靠放牧不能很好生長、發育和生產，必須給以較多的飼料。

其他習性 綿羊身被厚毛，皮膚中水分蒸發較少，所以比其他家畜可以飲水較少，一般喜歡喝流動清潔的水。綿羊愛護幼羔比其他家畜強，但初胎母羊，往往有不認羔羊的習性，所以要注意看護。

三、種羊的挑選

群眾有句俗話：“配種留公，留種選母”這兩句話說明了配種時要選擇良好的公羊和母羊交配，才能得到良好的後代。尤其公羊的好壞影響最大，因為一只公羊，一年一季，可以配數十頭母羊，一生可配數百頭母羊，如果應用人工授精，這個數目更大，所以公羊的好壞，可以影響很多的子子孫孫。

選種 首先要注意適當的年齡，公羊最早在六個月後就能交配，母羊八個月後也能發情交配受孕，但這個時候，身體輕小，發育尚未完成，它生下的後代，難保有強大的體格，和健康的體質，它的後代會一代一代的瘦小，因此必須等待公、母羊成熟後，再給以交配。一般公、母羊至少一歲半以上為合格。

留种公、母羊除注意年龄外,还要挑选羊群中体格最大,膘样最好,身体健壮的留种,这样它的后代会更好。

我国劳动人民,经过长期养羊,积累了选留种羊的丰富经验,现在把它介绍在下面:

1. 公、母羊要挑选胸部宽大,身长背宽,四肢健壮。
2. 公羊外观要雄性明显,脂尾粗大;母羊要有健康的身体和良好的嫵姆性(即看护羔羊)。
3. 公羊要挑选睾丸粗大,善于配种;母羊要求后躯宽大,乳房发达,每次产多羔。
4. 在羊毛方面,要选毛细柔软,没有死毛,全身白毛;产毛量高。
5. 要没有疾病和寄生虫。

四、种羊的饲养

种公羊的饲养 要使配种用公羊体格健壮,就要在平时就注意饲养种公羊。种公羊固然要供给营养良好的饲料、草料,但万不可把公羊养的过肥,而丧失了配种能力。但也不能过分瘦弱,同时还要有适当的运动,才能保证公羊有正常配种工作。

种公羊在配种季节的时候,要给予足够的干草、青草、干桑叶等,但要注意有无芒刺及病害。粗硬较长的草料,最好浸润或切断后再喂。其次给以米糠、麸皮、油饼等副产物,其他食盐、骨粉也是公羊必要的饲料,每日都应加在饲料中喂给。

种母羊的饲养 种母羊的营养,不但和羔羊的健康,而且对母羊下羔的多少,都有密切的关系,所以应该在配种前加强母羊的营养。例如:在配种前半个月,给以良好的放牧和饲

料,在怀胎前半期,胎兒需要养料較少,此时母羊飼料可和平日一样,到了怀孕两个半月以后,需要給以营养較好的米糠、麸皮等精料,以及矿物质較多的飼料。同时要注意不給怀孕母羊飲过冷的水或冰,以免流产。

五、选 配

要想提高羊群的品質,仅靠选种还是不够的,必須結合选配工作。选配就是某头公羊应与那些母羊交配較为适合,要想这项工作順利进行,必須要很好的了解每头羊的生产性能和它的优缺点。在选配时應該注意以下事項:

1. 选定的种公羊必須較母羊好一些,至少也要和母羊差不多。因为公羊要配許多母羊,关系羊群品質比母羊为大。

2. 种公羊和所配母羊不能有同样缺点,以免巩固了缺点。但也不能使缺点互补,如一个凹背和一个凸背,就不能使它們交配。

3. 要避免亲緣关系很近的公、母羊互配,如父女、母子及兄弟姊妹間的交配。

4. 最好的公羊必須用最好的母羊配种,以产生最好的后代。并应充分利用好公羊多配母羊,以多产生优良后代。

根据以上应注意的几点,慎重进行选配,等到产生羔羊以后,再看它的羔羊品質,如果羔羊生下很好,說明选配正确,要是生下羔羊不好,就得考虑更換后代不良的种公羊,这样才能达到羊群生产性能的提高。

六、孕羊的管理

母羊配种后三星期左右,如不再發情,就是怀孕了(病羊

例外),这时就要开始注意母羊的管理。母羊有了良好的管理,那么产后的泌乳也会提高,对羔羊發育有極大的好处。

一般在管理孕羊时,应注意以下一些事項:

1. 孕羊每日要有适当的运动,尤其是長期舍飼而不放牧的湖羊,这不但对母羊的消化力有好处,而且还可防止难产。

2. 大群綿羊出入羊舍时,飼养員应站在門口擋羊,不可使它拥挤,更不能有斗架追逐等現象發生,以防流产。

3. 羊舍内要干燥寬暢,光綫充足,空气流通,湖羊地区,尤其要注意这点。

4. 不使孕羊吃有露水的草或帶有冰雪的飼料飼草。

5. 放牧时不要把孕羊放入陡坡或滑地。

母羊一般妊娠期是 5 个月,但略有差异,最短是 140 天,最長 175 天,平均 147 天。

七、接羔和育羔

母羊临产前应先作好接羔的准备工作,如产房的打扫、修补、消毒、鋪褥草等,并要准备好接羔时用的用具,如紗布、药棉、碘酒、剪刀、毛巾、棉綫等。

母羊將近分娩的时候,乳房膨大,乳头分泌黄色乳汁,陰戶腫脹,常有粘液流出;到了分娩前,时时排尿,臥立不安和發出叫声,这是發生陣痛的表現。在發現这种情况以前,应把母羊移到安靜清潔的地方,和別的母羊隔开,不久母羊就有晶亮的水泡挂在陰戶外,水泡破裂后流出羊水。如順产,則羔羊的兩個前蹄先自陰戶露出,羔羊的头也隨着兩前肢露出,鼻子夾在兩膝的中間;不久羔羊的头部位先出,也有的根本生

若为难产,則羔羊后兩腿或其他部位先出,也有的根本生

不出来,这时万不可慌張,助产人应先察明原因,进行人工助产:可尽量先使胎位变正,配合母羊用力时慢慢向外拉,但助产人一定要把指甲剪短,手經消毒后,再涂以凡士林,这样对于人、畜都可以保証安全。不过母羊的难产是不多的。

一般双胎羊,第一个多数是前脚先出,第二个多数是后脚先出。自陣痛开始以至出生,常在二小时左右,如果多胎,則隔20—40分鐘生产一头。

小羔产下后,鼻、嘴内有粘液,应当立刻揩去,身上的粘液用温湿布拭干,或叫母羊自己舐淨,臍帶如自己断了,可用碘酒涂在断口上,如果沒断,則应距离臍部四寸的地方用消过毒的棉綫扎紧后剪断,創口涂以碘酒,上盖药棉,用紗布包在腰部,四、五日后臍帶干落,才可解去。遇天气很冷时下羔,应把羔羊身上羊水擦干,再使母羊自舐,以防冻坏冻死。

母羊产后,身体疲勞,可讓母羊休息十分鐘后,再將陰部附近污染的地方洗擦干淨,地上污染的垫草也要去掉再加新的褥草。母羊产后口渴,可給以温水,或在温水中加入一点麦麸,并加拌勻,然后將母羊乳汁挤出少許,再帮助羔羊找到乳房吃奶。

母羊分娩后第一天不要多吃飼料,最好喂精料,多給温水,从第二天起,就可給它容易消化的青草、干草、稀粥等,使它很快的恢复健康,第五天就可以喂些有营养的普通飼料了。

但以后母羊就担負起給羔羊哺乳的任务,也就是大羊所吃的营养,除了供給自己外,还得供給小羔。为了使母羊产生足够的乳汁来供給小羔,对母羊还得加强放牧飼养,同时給以含有蛋白質及矿物質較多的飼料,如米糠、麸皮、豆餅、新鮮桑叶、蚕沙、骨粉、食鹽等。在枯草期,要給予多种飼料,如:干

草、枯桑叶、甘薯藤、黄豆壳、豆秸等，能够加喂萝卜、洋芋、菜根、菜叶等更好。

母羊如一胎生下一羔，那末羔羊大都发育良好。如果一胎生下了二、三头羔羊，甚至于更多的头数，那末常有大、小，强弱的分别，如果母羊产乳不多，不能喂饲全部羔羊，最好先去弱小的羔羊，或另找养母或用人工补喂其他家畜的乳汁也可。不然的话，一部分羔羊就要死亡。

羔羊在生下来的一个月里，母乳是主要食物，母乳营养最丰富，尤其是初乳（指母羊生后七天内的乳），一定要使初生羔羊吃到，因为初乳中含有清泻胎粪的作用。假使母羊死亡，把羔羊交给其他死去羔羊的母羊带喂，在这时母羊一定不认，可用煤油、樟脑等涂在母羊鼻子上及羔羊的尻部上，以混乱母羊的嗅觉，或用强迫办法将母羊及羔羊关在一个小栏内，使羔羊染上母羊气味，也可达到母羊认羔的目的。

小羔到了两星期后，已逐渐能采食细软的草料，如有良好的草地和精料，可使羔羊放牧采食。羔羊再长大一些，就可正式加喂精料，精料的品质最好是量大而轻松，如切断的优良干草、桑叶、嫩草、麦麸、破碎玉米等都可，但必须要注意，不可喂的过多，以免发生肠胃病。

母羊放牧在邻近地方，可带上小羔，如果在远处放牧，可将小羔放在家中，午间把大羊赶回给羔羊吃奶一次，羔羊长到一个月大的时候，就可考虑到随母羊放牧吃草了。

羔羊一般在四个月时断乳。在断乳时可将羔羊与母羊逐渐分离，如起初三天每晚分开，第二个三天每日哺乳一次，一周后就可完全分开。羔羊断乳后要注意预防消化器官的疾病，应给予一些消化容易的、松软的饲料。

八、放 牧

綿羊是吃草的動物，也是最宜于放牧的家畜，放牧不但節省飼料，還可節省很多設備和人力，同時羊只邊吃邊運動，這樣對羊的健康也有好處。但是一般農區往往因為受着條件的限制，沒有法子進行大規模的放牧，只能進行舍飼或小型的放牧，現在着重地介紹一點關於在農區放牧應注意的一些事情：

農區放牧的綿羊，因受地勢、土地、牧草、農作物的限制，羊群不能過大，放牧地點可利用鄉村中田邊、路旁、隙地、山坡、溝地、廢地等不能耕種的地方，另外還可利用收過庄稼的棧地。水邊的牧草，雖然生長茂盛，但要注意寄生蟲的侵襲，應該利用人工刈割，背回家中喂羊。

春季放牧時，要注意羊的搶青（拼命亂跑，找青草吃），羊只經過了一個冬季枯草季節見到青草後一定是不顧命的吃，這樣很容易使羊子腹瀉而虛弱，如果是豆科牧草就會使羊脹死，這是放牧員應特別注意的。它的預防方法是先給羊吃了半飽干草後，再放牧到青草地，或先趕到枯草地上吃半飽後，再趕到青草地去，這樣就可以防止膨脹病。此外，春季放牧不可放牧太遠，因羊經過一個冬季後，一般都較瘦弱，趕遠後容易得病。夏季可選擇陰涼多風的地方，進行放牧。選擇牧草時，應注意草類較多及草抽穗的地方去放牧，割野草也可利用這種牧草，其次要注意不讓羊吃早上的露水草。冬季天冷草枯，應早早準備好冬草。

九、綿羊的管理

綿羊的一般管理方法，現在擇主要的幾點來說明：

捕羊法 綿羊胆子較小，合群性又強，捕捉是比較困難的。最好在捕羊時不驚動羊只，悄悄的走到羊的身后邊，用兩手抓住羊的左右兩后膝部的皮上，這樣羊不易受傷，也不會逃脫。如果亂抓強拉，很容易使羊感到痛苦而掙脫，引起脫毛及皮肉受傷，但大群的羊，必須用分羊欄捕捉。

羊子推進去 一般人把羊推進都愛拉羊頭、羊角或羊腿，因為羊的性格特別，愈硬拉它愈不肯走。正確的推進方法，人應站在羊的左邊，用左手握住羊的咽喉部，右手放於羊的尾下推羊前進，這樣羊就可很自然的前進。

斷尾 雜種羊或細毛羊，尾巴長而下垂，容易積貯糞塊，污染羊毛，并發生蛆虫，有碍羊體健康，所以要斷尾，但湖羊和寒羊并不需要斷尾。

一般斷尾的時期宜在生后兩個星期，多是和去勢同時進行。斷尾的方法最好是用鐵鉗烙切法，即一人抱着羔羊，使羊背貼于人的腹部將尾露出，另一人拿有孔的木板將羊尾穿過小孔，然后用燒紅的斷尾鉗或斷尾鏟（圖 6,7）切斷羊尾即可。斷尾時應該注意以下幾點，以保證羔羊的健康。

1. 烙尾時不可太快太急，以免出血。
2. 如遇出血時候，可用斷尾鏟燙于出血處，就可止血。
3. 如無烙鏟，用刀切斷或剪刀剪去也可，不過要注意器械与傷口周圍的嚴密消毒及預先結扎，以免出血和潰爛。

去勢 每年生出的小公羔，如果品質不良或不預備留作種用，就應該把它去勢，这样可以保持羊群的純良，去勢羔羊生長也快，易肥壯，肉質細嫩。去勢最好在生后兩個星期，過遲容易流血過多，傷口也不易愈合。去勢的時間，應該是天晴無風并且沒有蠅子的時期，但在天氣很冷時，也不宜去勢。

剪毛 因各地气候不同,剪毛的时间和次数也不相同,如华东地区,一年常剪毛二到三次,但細毛羊和半細毛羊多剪毛一次,因为毛短了,不适于毛紡工業的加工。山东省在五月間开始第一次剪毛,第二次在伏天,第三次在白露。浙江湖羊一般在春秋兩季剪毛一次。过去都用剪刀剪毛,現已逐漸改用彈簧剪或剪毛机剪毛,剪得快而毛整齐,羊毛損失也少。

剪毛的方法,剪毛人先將羊抓到清潔的地方,或鋪上草席,使羊体向左側橫臥。剪毛人蹲在羊的背後,用膝盖輕輕压住羊体,然后用右手自羊的右側后肢肋部(無毛处)向前肢肋部剪下腹部羊毛,然后用毛繩或布繩捆住四肢(用麻繩捆容易伤害皮膚),將右側前后肢短毛剪除后,从右体側的頸部、头部剪至左側头部、頸部,轉入羊体左側,自前軀到后軀,剪去左側羊毛,最后越过背綫剪除整个体軀的羊毛;到此全体羊毛剪去,再修除头部、四肢、尾部等殘留的羊毛,照这样方式剪毛,就可將羊毛剪成一个整片。

剪头部时,剪毛人可將右膝着地,用左膝垫住羊头,左手把羊头按住,自右肩下剪,經過右頸部,向右耳根垂直剪开,次將咽喉部及頸部毛剪下,剪毛人再轉向羊的对面修剪羊头部。

剪左側时,剪毛人可將羊坐起,用兩腿挟住羊头,然后自左側直向臀部剪下,一直可以剪过脊椎骨的右边一寸左右。

剪毛时应注意事項:

1. 选择晴朗無風的天气剪毛,剪毛場所一定要避風。
2. 剪毛前要作好准备工作,如打扫剪毛場所,准备好碘酒、药棉、紗布、捆羊繩子等。
3. 剪毛前12小时不可吃草給食,以免引起膨胀。
4. 剪毛人剪到陰囊、陰鞘、乳头、外陰部、眼睛等处,要謹

慎小心,避免有任何創傷。

5. 羊體如剪傷,立刻塗擦碘酒,大傷要進行包紮。

6. 剪毛後二週內,要注意如何避免下雹、急雨。

全身羊毛剪下後,卷起來扎好,但細毛、雜種毛和粗毛要分開,有糞便污染的毛及花毛要挑出來。如不立刻出售,應放在乾燥通風的地方。

修蹄 湖羊和寒羊的蹄子,一般生長正常,不用修蹄。細毛羊和雜種羊的羊蹄,往往生長過長,不僅影響吃草、走路和運動,而且容易引起腐蹄病,所以這些羊種必須每隔三個月檢查一次,把生長過長的部分剪去,以剪不到它的神經血管為原則。但一定要剪平整,以免羊蹄長成畸形。

羊舍消毒 羊舍每年應在春、秋進行兩次大消毒,消毒藥品可用熱草木灰水噴洒,或用5%來蘇水,或5%石炭酸水噴射。羊舍的地面、四壁、用具、食槽等,都應進行徹底消毒。

更換褥草 為了保持羊群的健康,減少寄生蟲的滋長,舍內必須要清潔乾燥,多換褥草,為了節省褥草,在每次更換時,可撿去髒草。

保證冬春羊群的健壯 羊群到了冬季和初春,常常發生健康不良,身體瘦弱,嚴重的遭到了死亡。這是因為羊群經過一個冬季,缺乏足夠的飼料,喂飼營養不夠,又碰到天氣寒冷的緣故。要保證羊群安全度過冬春,應注意以下幾件事情:

1. 秋天早早收割田野間青草、殘葉和園林中的桑葉、竹葉,曬干捆好,貯藏起來,不可風吹雨淋,以供冬春的喂飼。

2. 秋季草質良好,應做好放牧工作,長好秋膘。

3. 進入冬季前,要做好羊群體內外寄生蟲的驅殺工作。

4. 秋天早早修搭羊棚羊圈。

5. 老弱的羊, 应该在秋天出售。
6. 身体不健康的羊喂给它良好的饲料, 使它恢复健康。
7. 天暖无风的天气, 放出羊群, 到野外游散和放牧, 以使羊体强壮。
8. 不可给以冰水、雪水, 以免减损羊群的体力。

十、怎样宰羔剥羔和羔皮的保存

宰羔和剥羔是一件很重要的工作, 剥的好坏, 直接影响到羔皮的品质。要求剥皮合理, 首先要注意宰羔。合理的宰羊方法, 是从颈腹部中央沿腹线切开, 拉出颈动脉放血, 这样可避免头部皮张受到损失, 皮张也可保持清洁。

其次要注意的是皮面要左右相称。剥的时候应该从腹线、四肢内侧(毛稀处)切开, 谨慎剥下皮子, 绝对避免皮张上有刀伤破口, 同时皮张的任何部分都不得切除, 如阴囊、两耳、四肢, 但可去掉蹄子(如图1)。




图1 剥羔

羔羊宰杀时间, 依各种羊种和羔皮用途而不同, 一般羔皮大都在出生后或二到三日龄宰杀, 因为这时毛的卷曲紧密美观, 皮张面积也不太小, 如湖羊、库车羊等, 如日龄增大, 则皮张面积虽大但卷曲变为松弛, 因而大大的降低了羔皮的品质。我国的滩羊羔皮在生后十日龄左右, 二毛皮要