

中藥材手冊拾遺

(北京地区)

六183

北京市药材公司
北京市药品检验所 合编

中 药 材 手 册 拾 遗

(北 京 地 区)

北 京 市 药 材 公 司
北 京 市 药 品 检 验 所 合 编

一 九 七 三 年 十 一 月

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

前 言

遵照伟大领袖毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”和“人类总得不断总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进”的教导，我们于一九六四年邀请我市有实践经验的老药工同志们座谈和讨论，拟将《中药材手册》^{〔注〕}未收录的，而我市历年习用的236种中药材品种，加以总结，吸收中药老师傅在实践中积累的宝贵经验，并用现代科学方法加以整理和分析，编写成册。

无产阶级文化大革命以来，广大医药卫生工作者的阶级斗争和路线斗争觉悟不断提高，毛主席的无产阶级革命路线深入人心，一个发掘和利用中草药防治疾病的群众运动蓬勃发展，为了坚决贯彻落实毛主席关于“备战，备荒，为人民”的伟大战略方针，和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，进一步发掘祖国医药宝库的群众运动需要，为巩固和发展农村合作医疗制度，将已经编写的资料作部分的修改和补充，定名为《北京中药材拾遗》加以印发，作为广大的赤脚医生和医药卫生工作者在发掘祖国医药遗产的群众运动中的参考资料。

由于我们毛泽东思想水平不高，技术水平低，同时此稿是在无产阶级文化大革命以前编写的，故存在缺点错误一定不少，请同志们批评指正。

北京市药材公司

北京市药品检验所

一九七三年十一月

〔注〕中华人民共和国卫生部药政管理局编著

编写说明

一、本书收载我市习用中药材 236 种，分根及根茎、茎枝、叶、花、果实、种子、全草、树皮、动物、矿物及其它等十一类。每类药材均按简化中文名称的笔划次序排列，书末附有中文名称及拉丁学名索引，以便查阅。

二、本书所收载的每种中药材，按下列顺序和内容编写。

1. 品名 系采用本市历来沿用的药材商品名。

2. 别名 除药材商品名外，统称别名。

3. 概述 记述药材的原植物（动物、矿物）所属科属、中文名、拉丁学名，矿物的国际通用名和药用部分。并引述《本草纲目》或《本草纲目拾遗》的品名、分类等有关记载，凡来源于多品种的药材，在本项内均指明本市历来习用品种，以纠正混乱。

4. 原植物（动物、矿物）形态及分布 本项以描述原动植物形态、生长环境；矿物叙述其产状、伴生矿物。分布地区，除个别外，一般只记载国内分布情况。

5. 产地及销售地区 一般只写省分或主产省分；凡属各省均产或地区性药材，而不向外地销售者，均称为地产地销。

6. 采集加工 根据本市老药工介绍加以记述。采收季节和月份，均指农历而言。

7. 性状鉴别 吸收中药老师傅鉴别经验，以现代科学术语为上描述药材外部形态、色、质地、断面、气味与鉴别药材品质优劣的标志。

8. 效用

9. 用量

10. 贮藏

11. 附注 凡以前各项未包括的内容，均附在本项内，例如关于本草考证；同一名称药材，有数种原植物（或动物、矿物）需列药材检索表等等。

三、计量单位：原植物部分，采用公制为计量单位（米、厘米、毫米），性状鉴别及用量采用市制为计量单位（尺、寸、分；斤、两、钱、分）。

四、个别药材因资料不足，目前尚难鉴定其原植物（或动物、矿物）来源者，均写明不详。以待调查补充。

五、本书中一些带有封建色彩的品名及名词等，有待统一改革。

目 录

一、根及根茎类

1. 大葱 1
2. 大蒜 2
3. 土大黄 3
4. 白茄根 4
5. 仙人头 5
6. 两头尖 6
7. 佛手参 7
8. 延寿果 8
9. 芭蕉根 9
10. 红药子 10
11. 香排草 11
12. 珠儿参 13
13. 墓头回 14
14. 稻草根 15
15. 锦地罗 16

二、茎枝类

16. 红藤 17
17. 柞木枝 19
18. 盘龙草 20
19. 槐条 22

三、叶类

20. 参叶 23
21. 大夫叶 24
22. 松罗茶 25
23. 桔叶 26
24. 臭梧桐 29
25. 黄杨脑 30
26. 普洱茶 31
27. 铁树叶 32
28. 漆树叶 33

四、花类

29. 山茶花 34
30. 芍药花 35
31. 夜合花 36
32. 金莲花 37
33. 金豆菜 38
34. 金雀花 39
35. 佛手花 40
36. 红梅花 41
37. 杨梅花 42
38. 栗子花 43

39. 马蔺花	44
40. 野菊花	45
41. 桅子花	47
42. 蜀葵花	48
43. 凤仙花	49
44. 铁莲花	49
45. 蔷薇花	50
46. 苏子兜	51

五、果实类

47. 大枣	53
48. 土木瓜	54
49. 六轴子	55
50. 天竺子	56
51. 生菜子	57
52. 白平子	58
53. 北巨胜子	59
54. 西瓜皮	60
55. 西瓜翠	61
56. 光明子	62
57. 肉桂子	63
58. 赤雹子	64
59. 豆蔻皮	65
60. 抽葫芦	66
61. 松塔	67
62. 南巨胜子	68
63. 南烛子	69

64. 香椿花	70
65. 香菜子	71
66. 茄子把	72
67. 砂壳皮	73
68. 红谷子	75
69. 倭瓜把	75
70. 桔红子	76
71. 望江南	77
72. 丝瓜皮	78
73. 菴桐子	80
74. 黄荆子	81
75. 凤眼草	82
76. 葡萄干	83
77. 广枣	84
78. 整石榴	85
79. 糠谷老	86
80. 罌粟壳	86

六、种子

81. 小米	88
82. 天麻子	88
83. 木腰子	89
84. 玉果花	90
85. 龙眼核	92
86. 松子仁	93
87. 扁豆皮	94
88. 洋苦果	95

88. 桔核	95
90. 陈仓米	96
91. 秣米	97
92. 野料豆	98
93. 枣槟榔	99
94. 雄黑豆	100
95. 棉花子	101
96. 粳米	102
97. 丝瓜子	103
98. 绿豆皮	104
99. 黑豆皮	105
100. 稽豆	105
101. 糯米	106
102. 藤萝子	107

七、草类

103. 七星草	108
104. 大青草	109
105. 小草	110
106. 仙稻草	111
107. 半枝莲	112
108. 石见穿	113
109. 水葱	114
110. 佛耳草	116
111. 如意草	117
112. 金丝草	119
113. 金牛草	120

114. 金钱草	122
115. 金沸草	123
116. 卧蛋草	125
117. 穿肠草	126
118. 鬼见愁	127
119. 对坐草	128
120. 莱菔纒	130
121. 荠菜花	130
122. 蛤蟆草	131
123. 寻骨风	132
124. 风尾草	133
125. 落得打	135
126. 猫眼草	136
127. 鸭脚草	137
128. 翻白草	138

八、皮类

129. 川槿皮	140
130. 李根皮	141
131. 附子皮	141
132. 苦树皮	142
133. 南五加皮	144
134. 追地风	145
135. 姜皮	146
136. 桦树皮	147

九、动物类

137. 人指甲	149
138. 山羊血	149
139. 白贝齿	150
140. 羊胛子	151
141. 龙涎香	152
142. 龟头	153
143. 青白螺壳	154
144. 虎牙	156
145. 虎肾	157
146. 珊瑚	157
147. 蚕茧	158
148. 海燕	159
149. 马舌子	160
150. 海胆	161
151. 乌鸡	162
152. 柴狗肾	163
153. 蚬蚶虫	164
154. 鱼鳔	165
155. 鹿胎	166
156. 鹿筋	168
157. 鹿肾	168
158. 鹿尾	169
159. 鹿茸血	170
160. 鱼枕骨	171
161. 蛇蚶	172

162. 童便	173
163. 象牙屑	174
164. 豚脑脐	175
165. 肾精子	176
166. 蛭虻	177
167. 蜘蛛	178
168. 熊掌	179
169. 蜗牛	180
170. 螃蟹壳附螃蟹爪	181
171. 壁钱	182
172. 蝼蛄	183
173. 燕窝	185
174. 蛭蛭	186
175. 雕头附雕爪	187
176. 蛭蛭	188
177. 獾油	186
178. 驴肾	190

十、矿物类

179. 大赤金	191
180. 水银	192
181. 白降丹	193
182. 白粉霜	194
183. 白朱砂	194
184. 白石脂	195
185. 白石英	196

186. 石燕	197	211. 沉香曲	217
187. 石蟹	198	212. 半夏曲	217
188. 官粉	198	213. 龙须草	218
189. 金精石	199	214. 西瓜霜	220
190. 红粉底	200	215. 竹沥油	220
191. 红粉	201	216. 竹沥膏	221
192. 信石	202	217. 竹沥水	222
193. 秋石	203	218. 采云曲	222
194. 针砂	204	219. 建神曲	223
195. 倭硫黄	205	220. 龟板胶	224
196. 阴起石	206	221. 柿霜	225
197. 蛇含石	206	222. 香墨	226
198. 铁线粉	207	223. 红曲	226
199. 铁落花	208	224. 乌金纸	227
200. 无名异	208	225. 鹿角菜	228
201. 轻粉	209	226. 梧桐泪	228
202. 玛瑙	210	227. 梧桐碱	229
203. 银精石	211	228. 番打马	230
204. 银朱	211	229. 黄酒	231
205. 雌黄	212	230. 寒食	231
206. 盐硝砂	213	231. 银耳	232

十一、其他类

207. 午时茶	214	232. 槐蘑	233
208. 戈制半夏	214	233. 饴糖	234
209. 六神曲	215	234. 蔡龟胶	234
210. 石花	216	235. 藤黄	235
		236. 鳖甲胶	236

中名索引

拉丁名索引

一、根及根茎类

1. 大 葱

【别名】葱白、葱胡

【概述】本品为百合科植物葱 *Allium fistulosum* L. 的茎及须根。本草纲目列入菜部，葷辛类。

【原植物形态】一年生草本。高45~80厘米棒状或圆筒形、叶圆筒形。中空、先端渐尖、基部具鞘，绿色。4~5月开花，花茎圆柱形，叶状，中空，先端着生繖形花序，圆球形，总苞片白色，膜质、花梗细长，花白色，花被6片，披针形、雄蕊6、外伸、子房上位、3室，花柱线形，蒴果三棱状卵圆形、种子黑色。

分布：全国各地均有栽培。

【产地及销售地区】地产地销。

【采集加工】霜降采收，将全株挖出，除去泥土，阴干即得。

【性状鉴别】本品呈长圆柱形，长约0.8~1.5尺，直径约4~7分，表面白色或黄白色，有纵纹和环皱纹，基部着生多数黄白色须根或断去须根痕。质软，体轻，易折断，断面不平坦，外层白色，中央黄绿色和鲜绿色成环。具特异香气，味辛辣。

【质量优劣】以完整、无泥土者为佳。

【效用】解肌表、祛湿毒。主治：感冒伤寒、风湿痹痛、霍乱腹痛。外用：洗诸毒恶疮。

【用量】：1~3钱。

【贮藏】：置阴凉处。

2. 大 蒜

【别名】 蒜

【概述】 本品为百合科植物蒜 *Allium sativum* L. 的鳞茎。本草纲目列入菜部，葷辛类，蒜。

【原植物形态】 多年生草本，鳞茎大型，含有5~6瓣小鳞茎，外包灰白色、淡褐色或淡紫红色的干膜质皮膜。叶实心扁平，线状披针形，绿色或稍带白粉。3~4月开花，花梗长圆柱形，长60厘米，花序繖形稠密、具长膜质苞、花淡粉红色、花间多杂有淡红色珠芽或缺如，花被6枚，雄蕊6枚，雌蕊1，子房长椭圆形，先端凹入，蒴果、种子黑色。

分布：全国各地均有栽培。

【产地及销售地区】 全国各地均产。

【采集加工】 夏至采收。将全株拔起，除净泥土，编成辫行，晒干即得。

【性状鉴别】 本品呈圆锥形，直径约0.7~1.2寸。表面类白色或紫色、红紫色，基部着生多数黄白色须根。剥去外皮，可见5~7瓣小鳞茎着生于短小木质茎上，小瓣顶端渐尖，向外一面作弓状隆起，每一小瓣裹有薄膜，紫褐色，剥去皮膜，呈肉质，白色，基部具椭圆形疤痕，断面白色，中央为浅黄绿色。具刺激性香气、味辛辣，具刺激性。

【质量优劣】 以个均匀，饱满，皮紫者为佳。

【效用】 除时邪，解诸毒。主治：时疫瘟病，霍乱腹痛，外用涂蝎螫虫咬。多食伤肝损目。

【用量】 1~3钱。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

3. 上 大 黄

【别名】 羊蹄根。

【概述】 本品为蓼科植物巴天酸模 *Rumex patientia* L. 及其近似种植物干燥的根。本草纲目列入草部、水草类、羊蹄。

【原植物形态】 多年生草本。地下具一强壮的圆锥根、高可达一米，茎直立，具纵棱。根生叶和下部茎生叶，卵状长椭圆形，先端渐尖、边缘波状、基部圆形或浅心脏形，具长柄。茎上部叶较小、长披针形、具短柄。5~6月开花，顶生大形圆锥花序，多花密生，花被6枚，排成二轮，内轮花被随果增大，具小瘤，雄蕊6枚，花柱三枚，流苏状，小坚果卵状三棱形，棕褐色，果被心脏形，网纹明显。

分布：东北、华北、华东等地。

皱叶酸模 *Rumex crispus* L.

多年生草本，根肥厚，茎直立，通常不分枝，具纵棱。叶披针形或长圆状披针形，先端渐尖，基部楔形，边缘波状皱褶，叶柄比前种瘦小，茎上部叶为披针形或狭披针形，具短柄。6~8月开花，多数花轮生，构成长狭圆锥花序，花梗细长，中部以下具关节、花被6枚，外花被椭圆形，内花被卵圆形，基部心脏形，有网纹，均具小瘤。小坚果三棱形，褐色。

分布：东北、华北、华东等地。

【产地及销售地区】 河北、河南、及北京郊区均产。地产地销。

【采集加工】 清明前后采挖，挖出后，除去苗叶及须根，用水洗净泥土，切成直片或横片，晒干即得。

【性状鉴别】 本品呈片状或嘴，嘴长1~1.5寸，直径0.5~1寸。表面有纵皱纹，呈淡黄色或灰黄色，具菊花心。质坚硬，

气微酸、味苦微涩。

【质量优劣】 以块大，色淡黄，味苦者为佳。色灰黑者次。

【效用】 清热凉血、祛火败毒、主治：各种疥癣、腹胀停滞、多为外用、民间用为治子宫出血药。

【用量】 3~5 钱。

【贮藏】 置通风干燥处。

【附注】 羊蹄本经列为下品。韩保升谓：生下湿地，春生苗，高者 3~4 尺，叶狭长、颇似莴苣而色深，茎节间紫赤，开青白花成穗，结子三棱，夏中即枯，根似牛蒡而坚实。

酸模日华本草首载。李时珍谓：平地亦有、根、叶、花形同羊蹄，但叶小，味酸，为异，其根赤黄色。

根据所描述的羊蹄、酸模均为酸模属植物、与本市所用的土大黄相吻合。

李时珍所指的酸模非 *Rumex acetosa* L. 本种在北京地区不入药用。

4. 白 茄 根

【别名】 茄根

【概述】 本品为茄科植物茄 *Solanum melongena* L. 干燥的下部茎及根。本草纲目列入菜部，苺菜类，茄。本市茄根分紫白两种，习惯使用白茄根及茎。

【原植物形态】 一年生草本。高达一米，全体披星状毛，茎直立多分枝，叶卵状椭圆形或卵形，长 15~30 厘米，先端尖，边缘浅裂或角裂，基部偏斜。5~8 月开花，聚繖花序，花蓝紫色。果实颜色，形状，随园艺品种而异，通常有：近球形、卵形或长圆形，颜色蓝紫色，白色等。

分布：全国各地均有栽培。

【产地及销售地区】 地产地销。

【采集加工】 霜降后采挖，将全株挖起，除去枝叶及须根和泥土，晒干即得。

【性状鉴别】 本品呈圆柱形，长约1~1.2尺，粗约3~6分，下部多支根，有时残留须根，表面灰白色或灰褐色，茎部具有半月形叶痕或断去的枝痕，质坚，不易折断，断面白色，木质状，髓部松软或中空。嗅无，味甘。

【质量优劣】 以根，茎肥大，干燥，无须根，无泥土者为佳。细瘦，色黑，须根多及泥土者为次，断面呈灰黑色，不能供药用。

【效用】 活血散风，消肿止痛。主治：左癱右瘓，麻木疼痛。煎水洗冻疮。

【用量】 1~2钱，外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

【附注】 品名虽名为白茄根，但实际以地上茎为主要药用部分。

5. 仙 人 头

【别名】 地骷髅。

【概述】 本品为十字花科植物红苕萝卜 *Raphanus sativus* L. 干燥的老块根。本草纲目列入菜部，葶辛类，菜服。配方少用，常用于单方。

【原植物形态】 二年生草本。块根肥厚，肉质，形状，大小，颜色随园艺品种而不同。茎直立，多分枝，稍具白霜。根生叶和下部茎生叶成提琴状羽裂顶端一裂片最大，侧裂通常1~3对，愈向下，裂片愈小，茎上部叶渐小，具短柄或无柄。4~5月开花，总状花序着生于分枝的顶端，萼片4枚，线形，花瓣4枚，白色，