

14.106 / DKW

國民衛生常識叢書



怎樣預防花柳病

東北人民政府衛生部編

14.106 / DKW

國民衛生常識叢書

怎樣預防花柳病

李凌瀾 著

東北人民政府衛生部編

目 錄

一	花柳病是舊社會的餘毒!!	一
二	什麼叫花柳病?	四
三	花柳病的害處!	五
四	談談各種花柳病!	七
五	怎樣預防花柳病?	三五



圖 1 第

花柳病的基地，就是娼妓，八一五光復前哈爾濱市有一千餘名妓女，其中有微毒者佔百分之八一・三二。爲什麼許多女人流落爲娼妓呢？可以說沒有一個女人甘願作這種事情的，都是由於舊社會的統治者，官僚、地主給社會造成的深重災難，使得老百姓因爲經濟上的貧困，生活無着落，或由於男女不平等被壞男人賣到妓館裡纔不得已而流落爲娼妓的。有的人

一 花柳病是舊社會的餘毒!!

花柳病的基地，就是娼妓，八一五光復前哈爾濱市有一千餘名妓女，其中有微毒者佔百分之八一・三二。爲什麼許多

說：『天生殘骨頭』。可是我們想一想：那種封建社會制度及道德，再加上階級的嚴苛壓迫！而且舊社會不但未對這種現象作鬭爭，各方面麻醉她，更沒有人給她們想一個轉業的出路。她們在舊社會裡一輩子也不能翻身的！

一九四二年哈爾濱市立衛生化驗所，關於哈市妓女檢血成績報告：哈市共有妓女兩千餘人，中國人有一千餘名，其中有微毒者佔百分之八一·三二。

在這具體問題上，已十足說明殖民地時代衛生狀況的如何了。




第 2 圖

期微毒，即百分之二十五點七分強。

一九四九年，微毒病人三三三人中有三一名爲第一期微毒，即百分之九點三強。

一九五〇年上半年，微毒病人二五五人中（因施行廉價集體注射的關係，病人都能得醫療機



第 3 圖

我們把現在和過去作一個對比，就可以瞭解我們的社會已大大的不相同了：

我們看看光復後，在新民主主義社會建設的幾年發生了些什麼變化呢？根據哈爾濱市立醫院皮泌科的統計：

一九四八年，微毒病人一〇一名中有二六名爲第一

會，所以求診數目大大增加了）第一期徵毒者五名，即百分之一點九強，不够百分之二。

這些材料足以說明我們的社會進步了，我們有信心消滅花柳病！

二 什麼叫花柳病？

花柳病是由於不潔的性交而傳染的病症。從字面上講，這叫「尋花問柳」招來的傳染病。這種病症普通有四種：

- 一、梅毒（俗語叫楊梅瘡）。
- 二、淋病（俗語叫白濁或下淋）。
- 三、軟性下疳（俗語叫魚口）。
- 四、第四性病（花柳性鼠蹊淋巴肉芽腫）。

其中徵毒可看作是全身病，淋病、軟性下疳、第四性病可看作是局部病。然而這區別並不是絕對的，那一種病也往往不只停留於一處，有時能惹起全身種種病的變化。這四種病雖然多爲獨立存在，然而也有同時傳染兩種病的，其中特別要注意的是軟性下疳和徵毒同時傳染的最多，這

病特別叫做“混合下疳”。

這四種花柳病都有自己的病菌，是由於各自的病菌的傳染而起的。比如梅毒螺旋菌而得，淋病是由於淋菌，軟性下疳是由於軟性下疳菌所得，第四性病是由於一種濾過性病毒傳染而得，淋病的病菌在健康的粘膜上能够發病。其他三種花柳病的病菌都是由於皮膚或粘膜損傷的地方傳染而起的。健康的部分並不能傳染，然而嫖娼妓的人在以前小便頭不一定有損傷，那麼爲甚麼嫖娼後能傳染了花柳病呢？這是因爲微小的損傷，人眼睛不能發現的緣故，若用擴大鏡或顯微鏡來檢查就一定能發現有損傷的，而且由於粗暴的性交行爲也有發生損傷的可能。

三 花柳病的害處！

花柳病是三大慢性病之一（三個中一個是「微毒」、一個是「結核」、一個是「癩病」），這種病足以促成人類的退化甚至滅亡。而微毒又是其中最惡最陰險的，爲什麼呢？因爲像鼠疫、霍亂等的急性傳染病，迅雷般的短時日能死亡多數的人，因此我們每一個人都很注意警惕，而且因爲它表面化，所以容易防止。然而微毒不然，它偷偷的利用人的弱點，在暗裡侵蝕着人的生命，

像特務一樣的可惡，它的害處是很大的。

据一般的統計報告說：作母親的患梅毒，有百分之九十七發生流產、死產。

哈爾濱市立醫院精神病科的統計，患重症精神病患者百人中有二十個人以上是因爲梅毒而發生的。

再看看淋病對人類的危害如何：

淋病能使男子的生殖能力大減，据一般調查說：由於作父親的患淋病。

因爲淋病而斷種無後代的至少十個人中有一個，最多者是十個人中有四至五個。

由於作母親的患淋病而減少生小孩，一百個不妊者有四十八個是因淋病而造成的。

又据某人的調查說：「不妊症的百分之四十五是由於淋病」云。

如果把男女因爲患淋病而不能生殖的百分數加在一起：

最低百分之五五 最高百分之八九

如果再把眼睛放寬些，回頭看一看因爲梅毒而流產、死產的數目；以至於因梅毒而成瘋子的數目，簡直使我們發抖了。

四 談談各種花柳病！

一、微毒（楊梅毒瘡）

微毒是花柳病中最惡的一種，不僅能害一人，而且能把病毒遺傳給後代子孫，使我們無辜的子孫死亡，或變成廢人。又因為起始外面的症狀很輕，常不能引起人的注意，在不知不覺中而腐蝕我們的精神和肉體。

（一）微毒是怎樣傳染的？

- （1）最普通最多的，是由於和有微毒病的人的性交，病菌附着於陰部而傳染的。
- （2）由口而傳染的：例如和口腔粘膜有楊梅瘡子的人接吻，或接觸口腔有微毒疹的人用的器皿為媒介而傳染的。
- （3）刮臉刀、剃頭刀不清潔，有微毒螺旋體也能傳染。
- （4）給先天微毒兒吃奶，由乳房能傳染；反之，母親（或奶媽子）有微毒也能傳給嬰兒。這

一點是要特別注意的，求人給吃奶須選擇健康的。如給別人的嬰兒吃奶也要注意該嬰兒有沒有微毒，有微毒的要自覺的不給他吃。

(5) 醫務人員手指受傷，在從事診療中也能傳染給自己。有的人以為到廁所裡受「賊風」或順尿線能傳染，這是絕對沒有事。

(二) 微毒的症狀和經過

梅毒發病的經過很長，是一種慢性傳染病，因此根據梅毒的固有症狀分為四個期，而且各期的症狀也是不同。同時有的微毒者，不一定按着一、二、三、四期順序的發展，也有不出現前三期，直接到第四期微毒。

第一期微毒：由於和有微毒的人發生性交那天起到七、八個禮拜的中間為第一期微毒。在生殖器上被傳染的地方，先生出一個疙疸叫做「初期硬結」又名硬性下疳。

初期硬結：最好在皮膚或粘膜看不見有很小的傷口，微毒螺旋體附着於該處，經過了兩三個禮拜（潛伏期）不知不覺的在皮膚或粘膜上，發生一個又圓又硬的小疙疸，即不疼又不痒（所以有的人自己乾脆不知道），這就是「初期硬結」。有時充分發育能達到豆大。同時又經過了兩三天，



第 4 圖 甲 硬性下疳

中央皮膚變爛，或由腫子及皮膚的抹擦，而把上層皮膚掉去，就成了瘡面，瘡面上有血水，即不疼又不痒，周圍發硬不發紅，瘡面是乾淨的。而且這種下疳不疼是一種特徵（第四圖甲、乙）。

無痛性橫痃：（股骨

部淋巴腺腫大）在初期硬結發生以後很快的在大腿根部發生疙疸，表面皮膚無變化，疙疸不痛而且硬，有如鴿子蛋大，並且內面永遠不化膿，這種變化曰：『無痛性橫痃』。


第二期梅毒（全身梅毒）：

經過了兩三個月以後

由於第一期入於第二期
 病毒週流於全身，於是
 成了全身黴毒。而於胸
 背部，或手、足、顏面
 發生麻疹樣淡紅色的疹
 子，即不痛又不痒，往
 往被我們忽略。另外根
 据病人的體質、營養狀
 態，則發現各種各樣的
 疹子，不能一概而論，
 有的臉上起粉刺樣的丘
 疹，呈紅銅色而且硬
 固的，我們俗語叫它“



第 4 圖 乙 唇部硬性下疳




第 5 圖 口唇硬性下疳引起的惡性微毒

“楊梅瘡子”。(第五圖)
 又有的在臉上呈環狀的
 (第六圖) 水疱樣的微
 毒丘疹。另外多在會陰
 部起騷猴子狀的白色
 「扁平濕疣」，俗語叫
 做“落後”。患部非常
 濕潤，出少量的水，發
 痒的厲害(第七圖)，
 在這地方有無數的微毒
 螺旋體存在，傳染性很
 大，有的人常誤認為痔
 瘡。



第 6 圖 環狀丘疹性微毒疹，男，24歲

有的人咽頭發紅，
啞嚥子，傳染性也很
大。又有的人眼球發紅
（虹膜炎），有的掉頭
髮，多從耳朵後部發
生，甚至有的完全變成
禿子。這叫做“微毒性
脫毛症”（第八圖）。
比如從前有過微毒
的人，發現汎發性掉頭
髮者，當趕快到醫院去
檢查，提高警惕，有病
則快治。




第 7 圖 扁平濕疣（落後）女，18歲

第三期微毒：傳染

後三年就入於第三期，
 病毒深入內部，主要的
 是侵害各內臟、骨、
 肌肉。於是在皮膚下
 層生出又圓又硬的小疙
 疸，壓之稍痛，逐漸
 向皮膚表面進行成“橡
 皮瘤”（或名樹膠腫）
 破潰者很難治癒（第九
 圖）。

而且內部也能發生
 這樣的變化，如侵害鼻



第 8 圖 微毒性脫毛症

額骨時，則鼻中隔發生破潰而脫落出現鼻樑塌陷，或在上額部發生一個孔洞經常流出膿汁，有臭味，臉上非常醜陋，俗語叫做『昇天』。得上了微毒絕不能自然自癒。例如：有的人微毒疹出現又消失，消失又出現，這種現象叫微毒疹再發。如果徹底治療，不能再發，否則早晚必定再發。又有