

中醫中藥驗方彙編

(第一集)

·* 湖南醫學院 ·*

1959.2.





說 明

自从党提出開展学习中醫中藥，大搞技術革新作为迎接 1959 年献礼的号召以后，学习祖國醫學的运动在全院热烈地開展着，我們也在想，在这个运动中應該做些什么事情？根据同志們的反映，希望能將一些先进效高的驗方編印成冊，以便于临床应用和參攷，特別是下放的同志們更迫切要求有这样一些資料。我們便將从保定帶回的一些驗方选择一些較簡單易行，疗效較好的加以彙集，以及把公社医院同志們在实际工作中应用有效的驗方收集起来，分类整理，編成这个冊子，供同志們參攷，由于時間較倉促，也沒什么經驗，有些也未完全編进去，也許有些不适合的，希望同志們提出意見。

湖南医学院西医学习中医班

1959 年元旦



目 录

一、傳染病	1—22
① 麻疹	1
② 白喉	3
③ 感冒	7
④ 腮腺炎	9
⑤ 痢疾	10
⑥ 瘧疾	14
⑦ 絲虫病	17
⑧ 鉤虫病	19
⑨ 腸寄生虫病	21
二、內科	23—39
① 呼吸系統(咳嗽、哮喘、肺結核、肺癰、咯血、胸膜炎、肺炎)	23
② 消化系統(腹瀉、消化不良、胃及十二指腸潰瘍病、肝炎、肝硬化)	28
③ 泌尿系統(腎炎、血尿)	34
④ 高血壓病	35
⑤ 關節病	37
⑥ 血液系統(再生障礙性貧血、紫癜)	38
⑦ 糖尿病	39
三、外科	40—49
① 腹部外科	40
① 腸梗阻	40
② 疝	40
③ 闌尾炎	40
④ 胆道蛔虫病	42
⑤ 胆石症	42
② 泌尿外科(膀胱結石、腎結石、腎結核)	43
③ 骨科(骨結核)	43
④ 普通外科(燒傷、燙傷、炎症、外伤、出血、痔瘡、淋巴結核、血栓閉塞性脈管炎、破傷風、蛇咬)	44
四、婦產科	50—52
① 子宮頸炎症、糜爛	50
② 白帶、崩漏	50
③ 子宮脫垂	50

① 月經不調	51
② 安胎	51
③ 引產	52
④ 下奶	52
五、小兒科	53—60
① 小兒呼吸系統疾病(百日咳、哮喘)	53
② 小兒消化系統疾病(消化不良、腹瀉、吐乳)	57
③ 其他(鼻塞、高熱抽搐、口糜、走馬疳)	57
④ 小兒麻痺症、夜尿症、尿毒症	58
六、神經科	61—65
① 癲癇	61
② 神經衰弱	62
③ 神經痛、癱瘓、急性腦出血	63
④ 狂癲	64
⑤ 神經梅毒	64
七、眼科	66—67
① 結合膜炎、砂眼	66
② 角膜潰瘍	66
③ 青光眼	66
④ 先天性近視	66
⑤ 視網膜出血	67
⑥ 視神經炎、視神經萎縮	67
八、耳鼻喉科	68—71
① 針灸治聾啞	68
② 慢性咽炎	70
③ 扁桃體炎	70
④ 慢性鼻炎	71
⑤ 牙痛	71
九、皮膚科	72—77
① 凍瘡	72
② 皸裂	72
③ 麻瘋	72
④ 癬	74
⑤ 梅毒	74
⑥ 其他(鵝眼、皮膚結核)	77
十、腫瘤(腦瘤、子宮頸癌、肺癌)	78—79

傳染病

一、麻 疹 類

①主治：小兒麻疹出不透而色暗不鮮，高熱汗少，咳喘鼻煽，有併發肺炎的象徵。

藥物：觀音柳二把，或鮮芫荽几撮。

用法：將藥先煎水，煎后傾入浴盆中，用大孔篩子一張，放置薰浴盆上，在無風的房內薰之。

②主治：麻疹發熱隱隱之間，而不透出，服之即出。

藥物：蘇叶 黃芩 荊芥 升麻 葛根 浙貝 各一錢五分

防風 牛子 各二錢 甘草 卜荷 枝子 各一錢

用法：水煎服 一日三次

③主治：外用預防——雷击散。

藥物：牙皂三錢五分 麝香三分 辛夷二錢 桔梗二錢 朱砂二錢五分

雄黃二錢五分 薄荷二錢 防風二錢 蒼朮三錢 蒼耳子二錢

細辛一錢五分 陳皮二錢 半夏二錢 枯礬二錢

白芷一錢五分 貫仲二錢 藿香二錢 甘艸二錢

制法：以上18味藥，共重三兩六錢八分，研成極細，每二錢五分用甘油一兩調和均勻，浸泡一夜，用消毒細紗布濾過，將濾出之甘油裝入玻璃瓶內，嚴塞瓶口，勿令洩氣，以免走失藥味。

用法：用點眼用的小玻璃棒（洋火棍包以絨球亦可）蘸綠豆大的甘油一滴，塗入鼻腔中部，不可太靠里靠外，每次只點一個鼻孔，每七天點一次。上次如點左鼻孔，下次即點右鼻孔，兩鼻孔輪替點。每年冬末春初或麻疹流行期，共連點四次，約需一月，這算一個預防療程，可以起預防麻疹傳染的效用。

④主治：內服預防。

藥物：初生兒自落臍帶一段，鏡面硃砂。

制法：將臍帶置新瓦上，用炭火四圍烘之，俟濕將盡，放地上涼透，研成粉，另以硃砂細研水飛，按臍帶粉五分，硃砂二分五厘的比例配合成一劑。

用法：上藥一劑，用生地黄、當歸各一錢，煎濃汁3.5酒杯，調和藥面一天分數次抹小兒口中或乳母乳頭上，令兒吮下。一日之內用盡，次日大便機圯，終身無瘡疹諸疾。

⑤主治：麻疹流行時，小兒發熱、頭、身痛，未明是否為麻疹，此方主之傷風、感冒，用亦無妨。

藥物：薄荷叶一錢 葛根一錢 茶穗八分 蘇叶八分 連翹二錢
粉甘草五分 黃芩五分 竹叶一錢 桑叶一錢

用法：水煎服，日服三次。

加減法：蘇叶天暖少用，黃芩天寒少用，无汗加葱白三寸，淡豆豉二錢，咽喉痛加射干一錢，牛蒡子一錢。喘促加瓜蒌仁一錢五分，蘇子一錢五分。嘔吐加淡竹茹一錢，鼻衄加白茅根三錢。唇干齒燥、舌苔焦黃、口渴，加麥冬二錢，花粉一錢五分。大便實，加麻仁二錢，枳實八分。小便赤，加赤苓一錢，灯芯三分。

⑥主治：毒熱壅滯，面赤身熱。或間有譫語煩渴。

藥物：生石膏三錢 麻黃一錢 黃柏三錢 黃連二錢 黃芩三錢 梔子三錢
淡豆豉三錢

用法：水煎服。

⑦主治：預防麻疹。

藥物：黑豆五錢 赤小豆五錢 綠豆五錢 藕節五个 毛銀花二錢 甘艸六分

用法：水煎服。

⑧主治：麻疹隱伏不現聲嘶喘咳。

藥物：麻黃 杏仁 甘艸 兜鈴 前胡 大力 黃連 知母

用法：煎服。

⑨主治：出疹口舌腐痛，時熱時咳。

藥物：銀花三錢 連翹二錢 菊花三錢 桑叶二錢 炒大力二錢
生地四錢 玄參三錢 寸冬二錢 蘆根五錢 淡竹叶三錢
川貝一錢 薄荷一錢四分

用法：煎服。

⑩主治：疹后体虛陰氣不復，食欲不振，便秘，時咳。

藥物：生地四錢 玄參三錢 寸冬二錢 冰糖五錢 大沙參五錢

用法：煎服。

⑪主治：麻疹出后忽沒。

藥物：向日葵盤盤。

用法：在鍋內蒸熱取出，稍帶微溫，用以擦抹患兒腦背部，片時麻疹即再出現。

⑫主治麻疹：

處方：粉乾葛八分 生杭芍一錢 升麻四分 西河柳八分 芥穗八分
炙杏仁八分 芫荽子五分 紫草二分

用法：水煎，分三次溫服。

⑬主治：預防麻疹：

處方：銀花根兩斤 野菊花三斤 貫仲五斤 大青葉五斤

制法：用水兩百斤煎成一百斤分給小兒每人一斤，分四次服。試驗有效。

⑭主治：麻疹不出。

處方：紫背浮萍一碗。

用法：用水兩碗煎開，俟稍涼，浸毛巾擰干，乘熱敷前胸、背及胛手彎等，冷後更換，其疹自出，有特效。

（附註）：宜于麻疹出不出用。

⑮主治：麻疹不出。

處方：芫荽葉一斤。

用法：水燒開後放下芫荽葉煎一、二沸，將水置于小盆內，先薰後抹疹未出之皮膚上，麻疹自然透出。

⑯主治：麻疹不出。

藥物：筴薹菜。

用法：用筴薹菜煮水抹麻疹出得不好的地方，可立即變紅出疹，一方面口服，效果甚好。

二、白 喉

①硃砂、巴豆膏治療白喉：

藥物：巴豆去壳研成細末，用瓶子盛起，放在冷暗處，不使其過熱及干燥，以防破壞其性能。

用法：用時，取巴豆粉末、硃砂各0.5克，敷布在銀元大小的普通膏藥上（普通藥店可買到），貼于患者前額兩眉間上方，8小時後揭

去，在貼膏藥處有輕度灼熱感，並出現皮炎及水泡，可塗少許龍胆紫預防感染，不日自動吸收脫皮，並無瘢痕及色素沉着。貼藥後病人有口渴及少量出汗，再無其他副作用。貼藥後24—72小時體溫降至正常，白喉內薄膜脫落。

④主治：白喉。

方名：養陰清肺湯。

藥物：生地六錢 玄參五錢 丹皮二錢 甘草一錢 白芍四錢 麥冬三錢 貝母二錢 薄荷八分

⑤土牛膝治白喉：（俗稱對節菜，蛾子草）。

①用鮮土牛膝洗淨搗爛，加入等量的溫開水漱口直至白腐脫離為止。

②或鮮土牛膝根一兩，加水一碗，煎至12分，一日兩次，小兒酌減，服後24—30小時，白腐漸脫離。

（安徽治88例全部治癒）

⑥治白喉：

處方：蜈蚣一條（用米炒黃），血竭、乳香、沒藥、甲珠，川貝，硃砂，雄黃，凡茶各一錢，元寸三分。

用法：共為細末，每次用五分，點舌上以津液溶化，徐徐吞嚥。

⑦養陰清肺加減湯：

生地三錢 薄荷一錢 麥冬三錢 甘艸一錢 白芍三錢 蒲公英六錢 銀花五錢 丹皮三錢 連翹五錢 元參三錢 川貝三錢 板豆根三錢 每日1—2劑，分數次服。

便秘加大黃、元明粉，利尿加燈草、車前，健胃加山楂、神麴、砂仁，強心加吉林參、黃耆、六神丸，嘔吐加半夏、枳殼、竹茹。

⑧吹藥：

處方：月石四錢 元寸五錢 乳香一錢 黃柏四錢 芙蓉三錢 明礬二錢 熊胆一錢 牛黃一錢 血竭一錢 沒藥一錢 豆根三錢 鴨嘴三錢 大梅一錢 花蜘蛛10個

制法說明：乳香沒藥要去油，黃柏熊胆炒，鴨嘴，芙蓉豆根須焙枯，花蜘蛛10個以絲線縛住足腹，集中放在銅瓢內或瓦片上再加上明礬粉，（明礬粉堆在蜘蛛上用碗蓋住放在火上，慢火烘之，蜘蛛與明礬塔在一處，移開候冷，研成細末。

以上藥物分別研成細粉，篩下粗粒，再混合在一起，放在乳鉢內加工搗勻，收入磁瓶內待用，（如无花蜘蛛可用壁錢，不過壁錢內須有很多小蜘蛛，才能使用）。

吹藥方法：可用喉槍（吹粉器）或用竹筒將藥物吹入喉內，如无以上設備，可用硬紙剪成手指大小，將紙固定于竹籤上把藥物放在紙上送入喉內亦可，吹藥每日3—4次，至白膜消退為止。

⑦服藥：

方一：生地四錢 寸冬三錢 玄參四錢 連翹三錢 牛子三錢 白牛夕一兩
浙貝三錢 銀花三錢 射干二錢 豆根二錢 川朴二錢 檳榔三錢
草果二錢 馬勃二錢 白芍三錢 丹皮錢半 甘艸一錢
服三付，每日可吃兩付（小兒五歲以下減半）連續不斷地服至白膜消退為止。

方二：白牛夕甘草合劑：

就地採取白牛夕，并莖根一併挖出，洗淨泥土，切碎，每人量為牛夕一兩，甘草三錢，煎煮服用，凡發病之家屬均可服用，共服1—2次，有着極显著的預防作用。

⑧拔毒膏藥：

當地藥店購買斑苗虫，使其干燥后研成細末再用一般膏藥，用火烤開剪成兩半邊，再剪成一半，將斑苗粉放在膏藥上，呈菜豆大小，以棉籤蘸水，點在甲狀軟骨的双側，把膏藥貼上，隔10小時后，頸部皮膚起泡，告訴家屬將膏藥拔去，用針刺破水泡流出毒液，以消毒劑塗抹破皮處，黃水流出，喉痛減輕。

除以上治療還須配合青霉素注射。

（醴陵白喉防治小組应用療效達80%以上）

⑨吹喉散：

处方：青黛粉三錢五分 三黃散一兩 露香一錢 雄黃一錢 硼砂一錢五分
元明粉三錢五分 鹿角霜五錢 白礬二錢 甘草二錢 珍珠粉二錢
冰片二錢

用法：研末后用噴霧器多次吹入咽喉。

⑩嗽喉散：

精製 薄荷 蒲公英 黃花草 五倍子 甘草 砂仁各二兩二錢

每次1—2錢，每日多次泡開水含嗽。

⑪調蜜散：

桔梗 薄荷 甘草 三黃散 元明粉各三兩
用蜜調成糊狀，每次口服1—2克。

⑫陰熱白喉：

生地一兩 川貝四錢 元參八錢 薄荷二錢五分 丹皮四錢
白芍四錢 甘草四錢 款冬六錢 土牛膝根一兩

⑬陽熱白喉：

石膏五錢 阻艸四錢 生地一兩 白芍四錢 土牛膝根一兩
銀皮四錢 藍根四錢 甘草二錢 黃柏四錢 枝子四錢 馬兜鈴四錢

⑭風熱白喉：

桑葉四錢 葛根一兩 薄荷三錢 川貝四錢 甘草二錢 木通三錢
竹葉三錢 銀花四錢 蔓皮四錢 土牛膝根六錢

⑮白喉散：

牛黃二錢 珍珠(煨)三分 硃砂三分 血竭一錢 五倍子一兩
琥珀三分 梅片(冰片)三分 龍骨一錢 兒茶一錢 象皮去油一錢
乳香沒藥去油各一錢

珍珠取荏豆大者，放溫水內泡三天，每日換水一次，取出涼干，再放入豆腐里蒸一小時，取出洗淨晾干后，放入銅杓，用磁酒杯罩住，放炭火上煨；將銅杓不停搖動，至微黃而顯淺灰色時取出，用乳鉢研細。

琥珀用紅色透明者，加灯草少許，同研成細末。

以上十二味，分別研細后，用絹羅篩過，然后稱准分量，同放入大乳鉢內，混合研半小時，再過一次絹羅即成。

保存：放入磁瓶或玻璃瓶內，將口蓋緊，严防潮濕，洩氣，用時再研為極細粉末。

用法：吹入咽喉扁桃體病灶處，令患者閉口片刻，低頭流涎5—15分鐘，漱口，每日噴撒1—3次，每次撒一層，至症狀完全消失。

用藥時忌食甜、醋、梨、鷄、魚、羊肉，并臥床休息，（大多數病例三日治癒）。

⑩治白喉單方：

獨子大蒜搗碎，放于對側橈動脈上，若兩側都要放，几小時后即可好轉。
(岳北公社醫院用過有效)

⑪預防白喉：

①白菊花根煎水對片糖每天4次，連服四天。

②元參三錢 麥冬三錢 銀花四錢 甘蟬錢半煎水服。

③黃、白菊花，金銀花，甘草，四藥(量不一定)，共煎水服，
(當茶喝)

④1%碘甘油塗扁桃體及咽部。

三、感 冒 類

①主治：時行感冒以及瘟疫溫毒等症。

藥物：黑豆五錢炒 甘草二錢 黃土五錢 銀花五錢 白朮二錢

配制：貯于鍋中加水煎煮。

用法：一日二次分服。

②主治：傷風感冒頭疼冷燒骨節痛。

藥物：葱根五錢 葱連鬚三個 生姜三大片 大棗三枚 紅糖少許

配制：水煎服。

用法：服用后出汗病癒。

③主治：流行傳染、傷風感冒。

藥物：白芷一兩 紅麴一兩 肉桂二錢 丁香一錢 硃砂三錢 卜荷冰三分
冰片五分

配制：以上藥共為細末，此藥用鼻聞之或口服之均可，每付三分特效。

④主治：流感。

藥物：生葱白二兩 淡豆豉四錢 煎劑熱服，頭痛加白芷一錢

⑤主治：流感。

藥物：用鮮茵陳或鮮青蒿在身上搓揉，蓋被休息。

⑥主治：流感、惡寒重、發熱輕、無汗或有汗不透、咳嗽痰多、氣喘乾嘔胸滿、舌苔白、脈弦滯、屬有飲夾表症。

藥物：麻黃七分 北五味五分 細辛三分 桂枝1.5錢 半夏三錢 白芍三錢
干薑一錢 炙甘草一錢

⑦主治：流感、清涼解熱、解毒祛疫劑、太陽風溫、初起發熱不惡寒而渴者、辛涼平劑、銀翹散主之。

藥物：銀花 連翹 牛蒡子各一兩 淡豆豉 荊芥 薄荷 甘草 竹叶各五錢

服法：上藥爲末每服六錢，解毒根煎湯，香氣大出，即飲服，勿過責，病重者約二時一服，日三服，夜一服，輕者三時一服，日二服，夜一服。

加減法：高熱者加生石膏，在兩三日內者加麻黃絨三分，頭痛加桑葉、菊花、辛夷，身痛加桑皮、金銀藤，咽痛者加前胡，咽痛紅腫加板立根、大青葉、馬勃，咳嗽加杏仁、貝母，口渴加天花粉，便秘加大黃，心煩加山梔、蓮子心，鼻衄加大小蓀、藕節、鮮茅根，嘔吐加半夏、竹茹。

⑧主治：流感。

方名：葱豉桔梗湯。

藥物：鮮蔥白五錢 連翹二錢 桔梗 1.5 錢 淡竹叶 30 片 山梔三錢
淡豆豉五錢 甘草八分

服法：水煎溫服。

如咽阻喉痛者加紫金錠四粒磨沖，大青葉三錢，胸痞者去甘草加枳殼二錢，寇仁八分，如發疹加蟬衣一錢，皂角刺五分，大力子三錢，如咳嗽痰多加杏仁三錢，橘紅一錢半，如鼻衄加側柏葉四錢，鮮毛根五錢，如熱症發炎加黃芩二錢，荳豉二兩煎湯化水，如火旺發燥，加生石膏八錢，知母四錢。

⑨主治：流感、重傷風標準用。

藥物：黃芩二錢 連翹三錢 薄荷八分 蟬衣一錢 桑皮一錢 枇杷葉三錢 枳殼一錢 杏仁三錢 象貝三錢 赤芍二錢 竹茹三錢 桑葉 1.5 錢
如熱高可加生石膏八分，淡竹叶 30 片，痰多劇咳者加竹瀝，小便秘赤加木通二錢。

⑩主治：小兒流感（併發肺炎）。

藥物：麻黃五錢 二花六錢 連翹六錢 生石膏六錢 浙貝母六錢

制法：先將麻黃用稀鹽酸 25cc 加水 500cc 后過 24 小時去液將麻黃加入上四味藥內，加水過 42 小時去渣，將麻黃洗液加白糖一斤，蜂蜜一斤共煮濃縮至 2000cc。

用法： 1 歲 3—5 cc
 2—5 歲 5—10 cc } 每日三次
 6—10 歲 10—20 cc }

⑪主治：流感。

藥物：麻黃二錢 杏仁二錢 甘草 1.5 錢 陳皮 1.5 錢

用法：水煎服。

⑫主治：流感。

方名：六叶合剂。

藥物：方剂組成：鮮藿香叶五錢，鮮佩蘭叶三錢，陳茶葉三錢，薄荷叶三錢，冬桑叶三錢，陳紫苏叶八分，甘草錢半，如无鮮佩蘭叶可用藥店買的干佩蘭叶，对熱甚者可用大青叶，煩熱口干者可用淡竹叶。

服法：用熱開水泡十分鐘左右，泡時加蓋，乘熱作茶飲一日三次，重者服一星期，輕者 1—3 天。

⑬治流感土藥：

用路边姜一把加生姜少許，煎服

（望城东风公社用过有效）

⑭治流感土方：

葱、豆豉水、辣椒打湯做菜吃。

（岳北公社医院用过效好）

⑮預防流感單方：

青蒿、老姜、茶葉水作茶喝。

（望城东风公社医院用过有一定效力）

⑯針灸治流感：

穴位：風府 風池 大椎 合谷 列缺 太陽 委中 曲池。

四、腮 腺 炎

①主治：慢性腮腺炎。

（此病西醫无特殊方法治療，用中藥有显效）

处方：大貝母三錢 菊花三錢 黑山梔三錢 石決明五錢 桔梗五分
 制莖蚕三錢 赤芍錢半 夏枯草三錢 絲瓜絡錢半 鈎藤三錢

荆芥防风各錢半

②主治：流行性腮腺炎。

用冷濕泥局部敷用，平均兩天體溫下降，腫脹消失。

③主治：流行性腮腺炎。

處方：銀花 連翹 黃芩 黃連 板藍根 牛子 大青叶 馬勃 僵蚕 元參 甘草

④主治：流行性腮腺炎。

處方一：赤小豆研末备用。

用法：水調敷患处。

附註：同時內用板藍根三錢煎服。

處方二：天葵子 夏枯草 浙貝各等分

用法：水煎服。

處方三：蒲公英四兩 鷄蛋二枚

用法：將蒲公英搗如泥，加鷄蛋清調勻敷患处。

處方四：大黃二兩 白芨一兩 赤小豆一兩 米醋四兩

用法：共研末先將米醋煮沸調。

五、痢 疾 類

①主治：久痢不癒或脫肛。

藥物：當歸三錢 生芍三錢 沒石子三錢

用法：水煎服（連服三、四劑即癒）。

②主治：治痢。

藥物：生椿皮四錢 生地榆一兩 貫眾炭五錢 烏梅、大棗各九個

配制：水煎。

用法：口服。

③主治：痢疾。

藥物：鮮鋪地錦二兩（干者則用一兩）

用法：水煎服。

④主治：急性痢疾。

藥物：川連二錢 黃芩三錢 檳榔二錢 杭芍二錢 广木香二錢 肉桂一錢、

當歸三錢 甘草一錢

⑤主治：赤痢久不癒。

藥物：豬大腸一尺 蓮子四兩

配制：將蓮子裝入豬腸中同煮熟。

用法：大腸和蓮子一同食之。

⑥方名：止痢丹。

主治：痢疾嘔吐不食。

藥物：廣木香三錢 川黃連三錢 廣砂仁二錢

配制：共為細面。

用法：每周歲用三分，每日早晚兩次。

⑦方名：止痢散。

主治：紅白痢疾，初起三、五天里急后重者用之。

藥物：黃芩三錢 川樸二錢 木通三錢 滑石三錢 陳皮三錢 白芍三錢

香附四錢 木香三錢 榔片二錢 枳殼三錢 川連一錢半

用法：水煎服，以上成人量。

⑧主治：赤痢、白痢，大便下血及鼻出血。

藥物：側柏叶炙三錢 山查皮炙三錢 椿根白皮（蜜炙）三錢

配制：共為細末。

用法：成人每服三錢，早晚各服一次，鼻出血加百帥靈。

⑨主治：細菌性痢疾。

藥物：木耳二兩 白糖二兩

用法：水煎頓服。

⑩方名：民間土方。

主治：細菌性赤痢（急性赤痢）

藥物：鮮馬齒莧四兩洗淨。

用法：搗水煮，空心服，一劑痊癒。用乾者一兩水煎服，初起二日內有效。

⑪方名：獨聖散。

主治：赤痢。

藥物：黃小米。

配制：用砂鍋把米炒黑微存性，研為細末。

用法：米湯送下，成年人每服二錢，小兒減半日服兩次。

⑫主治：久痢久瀉。

藥物：赤石脂五錢 煨牡蠣五錢

用法：水煎服。

⑬主治：痢疾。

藥物：好茶叶三錢 煎沸五分鐘，紅痢加白糖一兩，白痢加紅糖一兩，紅白痢用紅白糖各五錢煮三茶盞。

用法：一日分三次服。

⑭主治：奴佛卡因穴點封閉治療菌痢。

穴位：下腕 天樞 氣海 足三里 針刺入1寸2分深以0.5%Procaine 3c.c 注入穴點，隔日一次。

針法：垂直自大點刺入須有酸、麻、脹、重感覺后，回抽見血再注入。

⑮主治：痢疾。

穴位：下腕 天樞 氣海 關元 足三里

大便次數過多或沉熱下痢過頻者，神闕隔鹽艾絨灸發熱者配大椎，合谷，曲池，陽交，委中，箕門。頭痛者配百會，上星，風池，風府。周身關節炎加陽輔。后重而大便不通留針 支溝，天樞，陽陵，足三里

⑯主治：慢性頑固性菌痢。

穴位：中腕 神闕 天樞 足三里

大便次數由每天10余次減至1—2次。

⑰主治：小兒紅白痢。

藥物：生熟山查 焦茵陳 九疊片各2—3錢 煎服。

⑱主治：痢疾。

藥物：陳芋頭荷子（去年之芋頭梗子）加糖（紅痢用紅糖，白痢用白糖）煎水服。

⑲主治：痢疾土方：

藥物：板粟花（晒干后）煎水服。

⑳主治：赤痢土方：

藥物：八月炸（即炸瓜）之壳（晒干后）煎水。

㉑主治：痢疾：

處方：止痢香參丸。

藥物：廣香一兩 苦參五錢 甘草四錢

制法：共研細末米湯為丸每服三錢。

白痢用生姜煎湯送下，赤痢甘草煎湯送下。

禁口痢用石蓮子、砂仁各三錢煎湯送下。

②主治痢疾：

處方：大蒜子、薤白子各等分。

用法：合搗為丸日服二次，每次服三錢。

③主治痢疾：

處方：野馬齒莧搗汁一碗，鴨蛋清適當。

用法：不煮冷服。

④主治痢疾：

處方：山楂一兩 茶葉二兩 紅白糖各五錢

用法：先將楂茶兩味煎好，每日一劑。

⑤主治痢疾：

處方：好茶葉 胡椒 紅白糖各等分。

用法：用開水泡當茶飲之。

⑥主治：久痢不止。

處方：大蒜一棗用火煨熟食三次即癒。

⑦主治痢疾：

藥物：①黃柏干流浸膏 0.9 克，每日四次，連服三日。（0.2 克等于 1 克原生藥）。

② 2 % 黃柏水溶液留滯灌腸。

⑧主治痢疾：

處方：香蓮丸（急性痢方）。

藥物：厚朴二兩五 川連二兩 桔梗二兩 甘草二兩 滑石三兩 白芍五兩
黃芩二兩五 當歸五兩 青皮二兩五 廣木香二兩五 枳實二兩五錢
檳榔二兩

研末為丸兩錢重，每服 2—4 丸白開水送下。

⑨主治痢疾：

處方：白頭翁湯（急性痢）。

藥物：黃連 白頭翁 黃柏 秦皮 水煎服，分量酌用。

⑩主治痢疾：

處方：芍藥湯（急性痢）。