

盛丹菁 編著



44096

14.731/SDJ

孕产妇保健知識

YUN CHAN FU BAO JIAN ZHI SHI



上海科学技术出版社

內容提要

一个怀孕的妇女，要经历 280 天左右的时间，然后养出她心爱的孩子，又须经过产后休息，才完成这一段生理过程。在这漫长的日子里，如果不注意孕产期卫生，是很容易损害健康的。

本書主要目的，是通过孕产妇卫生知識的介紹，来提高孕产妇的健康水平，从而保証生产，加速我国社会主义建設。內容包括：女子生理的特点，怎样證明怀孕，为什么要做产前檢查，怀孕时的生活制度以及对分娩、无痛分娩、产后該注意些什么，护理新生儿的道理等，全面細致地用通俗語言表达出来，对孕妇和已婚妇女很有帮助，也可作为接生員业务学习的資料。

孕产妇保健知識

盛丹青 編著

*

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版业营业許可證出 033 号

上海新华印刷厂印刷 新华書店上海发行所總經售

*

开本 787×1092 纸 1/32 印张 2 字数 39,000

1959年7月第1版 1959年7月第1次印刷

印数 1—22,000

统一書号：T14119·782

定 价：(七) 0.16 元

63-1

18859

44096

前 言

怀孕和分娩是妇女的生理現象，是件极寻常的事情；但不注意孕产期卫生，也很容易損害健康。目前，絕大多数的妇女都踏上了工作崗位，每个工作单位、生产部門，都有女同志在辛勤地劳动着。为了提高孕产妇身体健康，保証产后早日恢复工作，更好地为社会主义建設貢献出一分力量，把怀孕和分娩的保健知識介紹給广大的妇女們，有着重要的意义。

这本书将妇女的生理特点、孕产期的正常經過以及孕产期内应当注意的卫生事項等方面，比較詳細全面地介紹出来，对妇女保健工作者有一定的帮助。不到之处，尚希讀者多提意見。

作者于 1959年3月



大 9 0 0 5 2 2 1 6 大

目 次

一、孕产期保健的意义	1
二、女子生理上有什么特点	3
三、是不是怀孕了	10
四、为什么要按时去做孕期检查	13
五、怀孕时期应当怎样照顾自己	20
六、哪些是怀孕时期常有的现象	28
七、什么时候应当立刻找医生检查	33
八、无痛分娩法有用吗	35
九、准备生娃娃	39
十、分娩究竟是怎么回事	45
十一、怎样护理新生儿	50
十二、产后注意事项	54
产后可能遇到的问题	54
注意身体健康，保证产后按期工作	59

一、孕产期保健的意义

解放以后，新中国光芒万丈，气象万千。不仅在工农业生产上突飞猛进，在卫生保健事业方面，亦在蓬勃地不断发展。这些年来，新設的医学院校、医院、保健院、联合診所、門診部，如雨后春笋，不計其数。自从农村人民公社成立以来，更健全了层层負責的保健网，实现了队队有医生、社社有医院。这种种措施，大大地加速了保健工作的进展，促进了人民健康水平的提高。

从政府在妇幼保健設施方面所做的工作看来，如普遍設立妇幼保健院、所、站，大量訓練保健員、接生員；以及产假、产假內工資照发、生育輔助費等等各方面的規定，完全可以了解妇幼保健工作是受到特別关怀的。

或許，有人会想，妇女怀孕和生育是件很平常的事，不必大講特講，的确，怀孕和生育这两件事，都是妇女的生理現象，也都是很平常的事。但是不要忘了，虽然是生理現象，也会发生病理变化，而平常不过的事，也可能有反常情況的。所謂怀孕就是卵子和精子的結合。从一个简单的受精卵开始，发展到一个有血、有肉、有骨骼、有神經、有生命的人，一般需要經過 280 天的千变万化方能生育出来。胎儿的生长和发育，不但需要時間、空間，更需要大量营养的供給。为了滿足胎儿的需要，母亲身体內必然要发生許多相应的变化。胎儿是在母亲子宫内生长的，那么，胎儿逐渐在长大，子宫就要随着膨

大。子宫的膨大和胎儿的生长、发育一样需要一定的营养供給，再加上孕妇本身的消耗，孕妇的心脏、血液、內分泌腺等各器官，都要发生一系列的变化，才能适应。在这么一段长时间內，孕妇身体內起着很大的变化，是不是需要特別的照顧呢？是需要的。会不会发生不正常情况、发生疾病呢？是有可能的。既然如此，那么就應該強調孕期檢查的重要性，講究孕期保健。只有这样，才能保障孕妇的健康，保証胎儿的正常孕育。

怀孕到了足月以后，就要生育。有些人認為生育是件平常的事，用不到重視。其实，即使怀孕期間平平安安一切正常，也并不是說分娩就一定順利。从分娩統計上来看，順产确是占絕大多数，但并不是說難产就沒有了。除了難产以外，还有其他可能发生的危害性，如流血过多、会阴撕裂、产后感染等。但是利用目前的医学知識，完全能够保証妇女在怀孕和分娩期間的安全。并且，通过学习苏联的先进經驗，推行了无痛分娩法，更进一步解除了几千年来威胁妇女的分娩疼痛。所以，将孕期檢查和新法接生很好地結合起来，确实是孕产妇健康的有力保障。

解放以来，妇女在社会上的地位已大大地提高了，妇女都积极的参加了生产、建設祖国的社会主义事业。因此，积极提高妇女的健康水平，是关系着各条生产战线上跃进的大事。所以，講究孕产期保健，不单是为了保障下一代的健康和幸福，也是为了更好地完成当前的生产任务。

二、女子生理上有什么特点

男女两性的基本区别，在于生殖器官的构造不同。在出生后的最初几年中，婴儿的性别是很难从外貌和体型上来辨别的。因为在儿童时期内，男孩与女孩的发育、成长并没有什么显著的区别。但是，到达七、八岁以后，就有不同了，女孩子骨盆长得比男孩宽大，臀部、乳部以及耻骨前部的脂肪组织逐渐增加。等到进入青春发育期以后（一般年约十二、三岁），不但全身体格迅速发展，内外生殖器官渐渐发育；到了青春发育期末，更有月经的来潮，女性在这个时候已将成熟了。以后，不仅骨盆渐渐扩大变成妇女型状，两腋窝有腋毛长出，阴部亦开始有阴毛生长——初起时，阴毛软、短而稀少，以后逐渐变长、变密而卷曲，全身皮下脂肪均有显著的发育，尤其在髋部、肩部及乳部等处多量沉积而形成了女子的丰满体态。在这个时候，女性与男性已迥然不同。

女性生殖器官的构造究竟是怎样的？

女性的生殖器官分为内、外两部分。外生殖器是指在体表的可以看得见的部分（图1），包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂和处女膜。内生殖器却是指在身体内的部分，有阴道、子宫、输卵管和卵巢。下面简单地讲讲各个部分。

阴阜 就是耻骨联合前面微微隆起的外阴部分。它是由皮肤及很厚的脂肪层构成的。未成年的女孩子，阴阜上面没




图1 女子外生殖器

有阴毛，成年女子的阴阜上面却是阴毛丛生。

大阴唇 位于女阴部的两侧。前面与阴阜相连，后面在会阴部、肛门之前互相连合。女孩子进入青春发育期以后，大阴唇中的脂肪组织逐渐增加、变厚而隆起，它的表面也有阴毛生长。未婚或未曾生育

过的女子，两侧大阴唇的边缘紧靠，遮蔽阴道口。生育多次的经产妇，两侧大阴唇的边缘却是相互分离的。

小阴唇 在大阴唇的内侧。表面湿润而呈粉红色。两侧小阴唇的前方互相结合而将阴蒂包围在内。在后方，它们也是相连的。

阴蒂 被包围在小阴唇前方连合内，很是敏感。

处女膜 过去被看作是很神秘的东西，其实，它只是附在阴道口的一张膜而已。正常的处女膜中央有一孔，孔的大小、形状及膜的厚薄，各人不同。初次性交以后，处女膜往往破裂，但并不一定都有出血。这层膜裂开以后，再自行结疤，开孔的边缘就不整齐或者变成数个小瓣。分娩以后，阴道口往往看不见处女膜而只有留下的不清楚的残痕。以下谈谈女子内生殖器(图2)。




图2 女子内生殖器

阴道 位于处女膜以内。它的外口比較狭窄，内部逐渐扩大而頂端連接子宮的下部。它是个能扩張的管道，是性交的地方，而娃娃也是經過这个地方生出来的。

子宮 是个盆腔器官。形状象个倒放的梨子。上面寬大的一端是子宮体；子宮体的頂部是子宮底；下面呈圓柱形的部分是子宮頸。正常的子宮，約有三寸長、二寸寬（子宮体部）、一寸厚。子宮是个肌肉器官，当中有个空腔。这个空腔，上面与連接在子宮底两侧的輸卵管腔沟通，下面开口于子宮頸，直通阴道，称为子宮頸口或者子宮外口。平时，月經就是从子宮腔內排出来的，而怀孕时，胎儿就住在这个空腔内。正常的子宮位置是微向前傾而稍微前屈的。它的前面是膀胱（俗称尿泡），儲小便，后面是直腸，积大便。

輸卵管 是輸送卵子的管子。左右各一根，連接在子宮底两侧的两只子宮角上。大約有三、五寸长。它一头通入子宮，另一头象个小喇叭，开口在腹腔内。卵巢产的卵子就是从

这个小喇叭的开孔钻进去到达输卵管的，如果在这里遇見精子，就会和它結合起来(精子和卵子的結合就是受孕)，然后被輸入子宫腔，在子宫內慢慢发育成胎儿。

卵巢 有一对，一边一个。在输卵管喇叭口处。色白，扁扁的象橄榄大小的长圆形东西(图 2, 3)。卵子就是从这里生出来的。卵巢中藏有几万个卵子。正常的女子大概每月只排一个卵子。排卵的时间在月经周期中，如果在这个时候性交，容易受孕。卵巢除了排卵外，更重要的是它有内分泌作用，它所分泌的东西是形成女性特征的主要因素。




图 3 骨盆腔縱剖面

什么叫做第二性征？

第二性征就是人在发育成熟后，身体上所显露出来标志性别的特征。女子的第二性征有：声門组织改变，使音调变高变窄；乳房隆起与膨大；乳头变大和突出；乳头周围的乳晕有色素沉着，色泽加深；骨盆变宽；脂肪组织沉积于全身各

部分，形成丰满、富有曲线的女性体态美；腋窝出现腋毛；阴阜生长阴毛等。

月经是怎么回事？

月经是子宫里面的一层内膜，受到卵巢内分泌素刺激以后，所发生的周期性生长、剥落变化而引起的子宫出血。第一次来的月经，称它为“初潮”。初潮的年龄有早迟，一般约在13~15岁间，相当于青春发育期的末期。所以妇女开始来月经，是表示身体和性器官的发育已经到了成熟的阶段。在这个时期，身体其他部分同时也起了变化：乳房渐渐长大，骨盆扩大，腋窝和阴部生毛，变得敏感，连爱美和害羞的心理也有了进一步的发展，而女性的一切特征都充分显现了。每次月经相隔的时间（月经的周期），平均是28天，但也有20多天或30几天来一次月经的。每次经血的时间3、5天不等。月经来的时间和多少是各人不同的，只要每次都是差不多的时间来，差不多的时间干净，差不多的量，都算是正常的现象。

有的人从来也没有月经，这是什么缘故？

月经是女子的正常生理现象，如果到了成熟的年龄一直就没有月经来潮，这个人是有病了。月经不来，不外乎下面几种原因。第一类是身体衰弱、营养不良、严重贫血或者是曾患重病，由于全身一般情况不良而引起的。第二类是生殖系统本身有问题，象没有卵巢、有卵巢但不起内分泌作用、子宫

发育不全或者沒有子宮、內生殖器官有結核性疾病等等。還有一种人叫“石女”，是有月經的，但是因为处女膜閉鎖、沒有開孔或者阴道有畸形閉鎖，月經血流不出来而积在里面。这种情形和上面所說的那两类是不同的，只要动动手术把处女膜切开或者阴道的阻塞部分打通就行了。正常的女孩子，一般到了十三、四岁，就應該來月經了，如果过了十五、六岁，月經還沒有來，那就應該請医生檢查，及早發現問題而进行对症治疗。

月經既然是妇女的生理現象，为啥有些人月經來时要肚子痛？

由于內分泌素的作用，在月經前或月經期中，子宮和盆腔內的血管有充血，所以常会觉得下腹部或腰部有痠脹等不舒服的現象。疲乏、无力、情緒低落等的全身反应亦很多見。如果妇女在月經前或月經期間有比較严重的下腹部痙攣性疼痛，甚至伴有恶心、嘔吐、昏暈等，就是“痛經”毛病了。痛經的原因很多。从月經第一次來就有肚子痛的，称它为“原发性痛經”。它的原因不外乎：

(一) 受到成年人的不良影响，思想認識不正确，对月經怀着恐惧的心理，認為月經來是一定要痛的。因而月經一來就觉得肚子痛了。

(二) 由于营养不良、体格不健全、缺乏适当的运动，对于疼痛的耐受力比較低而特別敏感，可能对別人說来只是点痠脹的感觉，对她就变了疼痛。

(三) 由于卵巢內分泌的失調，引起了子宮過分強烈或痙攣性的收縮而造成劇烈的腹痛。

(四) 子宮位置不正，過度地前屈前傾或後傾後屈，使月經血不能暢流。

(五) 子宮頸口太小，經血不容易排出。

後兩種情形引起的痛經常在結婚、生孩子以後減輕，或許就此不痛了。

原先來月經不痛，過了幾年以後反而發生痛經的是“繼發性痛經”。造成繼發性痛經最常見的疾病是卵巢、輸卵管、子宮的發炎，或長瘤子，以及一種叫做子宮內膜異位症的毛病。因此，如果月經來時肚子痛得厲害，最好還是請醫生檢查一下，找出它的原因。

月經來時能不能同房？

月經期間，絕對不能同房。因為這時子宮頸口是微微擴張的，而男子外生殖器常帶有細菌，這時期性交，細菌就會經過開放的子宮頸口進入子宮，引起發炎，甚至引起輸卵管炎。而性交的刺激也能引起盆腔器官的充血，造成經血過多和經期延長。所以，應該強調注意經期衛生。月經期間，除了不能同房外，還要經常保持陰部的清潔，月經帶要洗得干乾淨淨。不能洗盆浴。

三、是不是怀孕了

肯定一个妇女是不是已經怀孕，是件很重要的事情。对妇女來說，如果肯定是怀孕了，就要做好經濟上的打算和生活上的安排。在講到怎样知道是不是怀孕以前，先談談妇女是怎样受孕的。

在上一节里，已經說过女子的卵巢里藏有許許多的卵子。每隔 28 天左右，就有一个成熟的卵子从卵巢排出来。成熟的卵子本身沒有运动能力，它从卵巢里排出来以后，就流入腹腔。依賴輸卵管口上皮細胞的纖毛运动，得从腹腔进入輸卵管。在这个时候，如果同房的話，容易受孕。男子的精液內有許許多象小蝌蚪形状的精子，这种精子有活动的能力。同房后許多精子从女子的阴道向上游去，經過子宮頸进入子宮腔，在輸卵管內和成熟的卵子相遇。一个成熟的卵子往往被很多的精子包围住，但是其中只有一个精子能够鉆进卵子里去和它結合，成为受精卵——这就是受孕了。受精卵大約在受精后的第五天才到达子宮腔，慢慢发育变成一个胎儿。

怎样知道是怀孕了？

身体健康而曾經生过孩子的妇女，大都能知道自己是不是怀孕了。不过一个一向月經不大准或者新婚的妇女，对于自己是不是怀孕是不大知道的。在初受孕的阶段内，可以根据下列几种情形来判断：

1. 月經過期不来潮 一个已婚的妇女，如果身体很健康、月经也来得很准，突然月经过了期不来，很可以猜想出自己是怀孕了。不过，值得一提的是妇女的月经也不是每次都很难准。超前、落后，也是常有的事。所以，月经迟来几天并不一定是怀孕。不过月經過期不来仍然是怀孕的一个重要象征。但是也有几种情况，妇女虽然怀孕却不一定有月经的变化。例如：有些早婚的妇女月经尚未未来过就结婚而怀了孕，有些妇女经常是隔两三个月来一次月经的，往往有了孕还不知道；又有一部分妇女是在产后喂奶期中、月经尚未复潮的时候接着怀了孕（一般称为“暗有”）。和这些情况恰恰相反的，是有些妇女虽然已经怀了孕，却在该来月经的时候仍有少量的出血，把它当作月经，不相信自己已怀了孕。此外，还有很多情况可以使月经延期或者暂时停止，象环境的改变、气候的突变、情绪的波动以及全身性疾病、内分泌的紊乱、子宫有病等等。所以，单凭月經過期不来而肯定怀孕是不够的，应该还加上其他生理变化。

2. 小便次数的增加 怀孕的头二、三个月，小便次数常有增加的现象。有的甚至每隔一小时左右就要小便一次，很不方便。因为怀孕后子宫逐渐长大，压着了它前面的膀胱，膀胱里积了尿，孕妇就觉得腹胀想小便。等到子宫一天天地长大，向上升出了骨盆，不再压着膀胱时，这种现象就消失了。不过当怀孕足月的时候，胎儿的头下降到骨盆中，以致又压着了膀胱，这时小便次数增多的现象又回复了。

这种小便次数增多的现象是正常的，不用担心，不过要注意

意的，不要因为小便次数多、不方便就少喝开水，这会影响身体健康。

3. 食欲的改变 怀孕以后，不一定每个孕妇都有胃口的改变。有的人可能一切照旧，有的入却常常会想吃这样想吃那样，或者平时爱吃的东西現在不喜欢吃，平时不爱吃的东西倒反而想吃了，比較多見的是常常想吃点酸味道的东西。还有一部分孕妇什么也不想吃，甚至連聞到点油腻味、看見了食物就要打恶心、要想吐。嘔吐发生在早晨的較多，有人称它为“晨吐病”。

4. 乳部的变化 乳房觉得有点脹、不舒服，碰到它有点痛，是怀孕后乳房最早的变化征象。这和某些妇女在月經來潮前所感到的乳房脹滿和刺痛的情形很相象。或許，有的孕妇会发现自己乳房皮肤底下有一根根的青筋出現，这是由于血管分布增加的緣故。初次怀孕的妇女，可能还有乳头和乳头周围乳暈的顏色加深，和出現一顆顆小的突起物。

5. 下腹部膨脹 在怀孕的头一、二个月，孕妇有时会觉得小肚子有点发脹，这是因为子宮里面有东西在长大的关系，但是，这时候肚子还是平平的，自己摸不到什么。等到怀孕达三个月左右，小肚子就会有点隆起，肚皮薄的人还可以摸到有个象拳头大小的包块，这就是有孕的子宮。

6. 皮肤色素的沉着 除了乳头和乳暈的顏色加深以外，有些孕妇还会有臉部皮肤的变化：在鼻子两边的面頰上出現淡咖啡色的小斑点。此外，在下腹部，肚臍和阴阜之間也顯現一条顏色深深的綫紋，称做“妊娠綫”。

已婚妇女，如果有上述变化同时出現的話，大概可以確定已經怀孕了。

四、为什么要按时去做孕期檢查

把孕妇們对待孕期檢查的态度分析一下，大概有以下三种：

1. 重視孕期檢查，和医生合作得很好，并且，每次都按照預約的日期去医院檢查。
2. 抱着随随便便的态度，既不听医生的嘱咐，也不按照預約的时间去檢查，只是偶尔高兴才去檢查一次，不高兴就不去。
3. 不重視孕期檢查，直到将近足月时，才去医院挂号，目的仅在于登記一下，免得临产时找不到接生人員。

第一种态度是正确的，第二、三种是錯誤的。在怀孕期間，按时进行孕期檢查是一件十分重要的事。因为，只有通过檢查，医生才能了解孕妇和胎儿的情况是否正常。因为从开始受孕到分娩为止，当中要經過 280 天的时间，并且妊娠期孕妇身体上又要发生很多变化。在这么长一段时间內，身体內又在大起变化的时候，孕妇和胎儿两方面是都有可能发生不正常情况的。如果孕妇怕麻烦，不去医院檢查，医生就不能及时发现大人和娃娃有什么不正常的地方，而不能做到及时糾正。再說，医生还要指导孕妇保养身体的方法、教授无痛分娩法，在产前产后应当注意的事項等等，这一切对于初次妊娠的