



畜牧兽医丛书

万 鸡 场

河北省农林厅 编

河 北 人 民 出 版 社



16.6261
8.5

內 容 提 要

这本书包括了兩項內容：一个是介紹了集体养猪、养鸡及饲养管理等方面的一些具体經驗。一个是介紹了山区群众向自然作斗争，使荒山变成万鹅山的事迹。

畜牧兽医丛书

万 鹅 场

河北省农林厅 编

★

河北人民出版社出版（保定市裕华东路）

河北省书刊营业许可证第三号

河北人民印刷厂印刷

河北省新华书店发行

★

1959年2月第一版 1959年2月第一次印刷

787×1092 $\frac{1}{32}$ 开· $\frac{3}{8}$ 印张·6,000字

印数：1—8,000册 定价：(5)0.04元

统一书号：T 16095·143

前 言

发展养鷄是一种投資少收益大的副业生产。鷄蛋不仅是重要的出口物資，而且是改善人民生活的很好食品。随着人民公社的发展，各地虽然也注意了发展养鷄，但距离需要还相差很远，因此，还必须大力加以发展。

本書从两种不同的角度介紹了天津市新立村人民公社所屬的刘辛庄和蔚县化稍营人民公社所屬的小田洼創辦万鷄場和万鷄山的經驗，可以作为今后人民公社发展集体养鷄的参考。

由于編写時間仓促，有些經驗总结的还不够完善，請讀者多加批評指导。

河北省农林厅

1958年 四月

目 录

万鷄場	1
育雛	2
照明飼养	4
寒冷季节放鷄	5
万鷄山	6
大胆的计划	7
万鷄山在困难中成长	7
从失败中总结經驗教訓	9
养鷄发展到一万只	10

万 鷄 場

天津市新立村人民公社刘辛庄鷄場是1957年3月建立起来的，两年来在党的正确领导下，本着勤俭办場的方針，发挥了广大社員的积极性和創造性，使养鷄場在經營管理和生产技术方面都有了很大提高。建場初期場里沒有小鷄，社里就抽出两間馬棚改成暖炕孵化室，自己孵化小鷄。沒有小鷄房，就动員社員騰出几間旧房子临时养小鷄。他們就在这样簡陋的条件下，依靠群众，堅苦奋斗，使



养鷄数量由少到多；生产技术由低到高；場址由小到大，蒸蒸日上地发展起来了。現在全場养鷄已发展到12,485只（如图一），其中成年母鷄4,809只，混合中

图一 这是万鷄場放牧的鷄群

鷄4,809只，混合中

雛 5,759 只，小雞 1,917 只。1958 年孵化出雛率達到 80.12% 至 91%，雛雞成活率達到 96%，比過去有了很大提高。

該場發展養雞較快的主要關鍵是：

在黨的領導下，牢牢抓住了孵化、育雛及成雞飼養管理等一系列的中心環節，茲分別介紹如下：

育 雛

1、育雛溫度：在小雞發育成長中應給與適當的溫度。第一天溫度為 28°C 左右，以後只要小雞生長發育正常，就可每周降溫 $1-2^{\circ}\text{C}$ ，寒冷大風天氣溫度可高 $1-2^{\circ}\text{C}$ ，只要小雞不扎堆，不張嘴呼吸，溫度就算正常。5—6 周時，如室內溫度正常就可酌情不用人工升火加溫，讓小雞在舍內自然溫度下成長。取暖設備為每三間育雛舍內按裝兩個煤爐，白天和黑夜都要有專人值班，隨時負責看管爐火，使舍內溫度晝夜平衡。下半夜時，室外溫度下降，舍內溫度可比常溫高 $1-2^{\circ}\text{C}$ 為好。為了保溫和管理方便，舍內要按小雞數放置足夠的方木箱（圍草席也可）墊上秸草，將小雞分成小群放在里面喂養（如图二）。



图二 育雛

2、小雞喂食
飲水：小雞出壳后毛干了，就可由孵化室移到育雛室开始喂食，将飼料撒在背影明显的紙或草席上，引导小雞啄食。在喂食之前要先飲些温水，水

温保持 $31 - 33^{\circ}\text{C}$ 。为防止沾湿小雞羽毛和弄脏飲水，最好用碟子或碗盛水讓小雞喝。头三天喂一些煮八成熟的小米，三天后就可增喂魚虾头等动物性飼料，并給 13% 的細糠或玉米糠、3% 的青菜、2.5% 的蛋皮粉和 0.5% 的食盐。三周后逐漸換喂混合糠、土杂粮等較粗的飼料；以后則在原飼料的基础上多样配合，并按小雞的发育阶段，随时掌握小雞的日粮。当小雞发育到三十三天后，即可由飲温水而改为飲凉水。

3、遮光育雛：将育雛舍內所有的光亮处堵住，保持舍內黑暗无光（越黑越好），使小雞吃飽喝足适当运动之后，在黑暗的环境下安靜的睡眠。两

周内仅在小雞吃食、飲水和运动时打开遮光設備，以后則慢慢縮短遮光時間，三周后完全撤去遮光設備，讓小雞在温暖的舍內自然光綫下成长。用这种方法养的小雞消化能力强、爱吃食、长的快，同时还便于管理，不整天乱叫。

4、通风换气：該社的育雛室都設有通风换气裝置。在房的后牆有入气孔，房頂上有出气窗。在不能打开門窗換气的寒冷天，則打开换气孔調換舍內空气，經常保持舍內的空气新鮮，这样就能帮助小雞发育。

5、清洁卫生：舍內經常进行清扫消毒工作，垫草勤換。地面勤扫，潮湿的地方撒点石灰，保証舍內清洁干燥。霉烂和殘剩飼料和脏水不給小雞吃、喝，飼槽、水盆經常洗刷和消毒，以减少疫病流行，提高育雛成活率。

照 明 飼 养

在十二月昼短夜长的季节里，采用了人工照明的方法（按时开电灯）来飼养成雞。在昼短夜长的季节，雞只往往因为缺乏运动减少吃食面影响产卵。为解决这个問題，就在雞舍內安上弱光灯泡和

强光灯泡，每日在天明前两小时左右，先后打开弱光灯和强光灯，鷄見亮就都从栖架上飞下来吃食和运动。由于灯光对鷄眼的刺激，运动量和吃食量增加，提高了产卵率。在实行人工照明前最高产卵率为50%左右；经过人工照明后，一个月产卵率就上升到80.52%，比灯光饲养前提高产卵率30.52%。

寒冷季节放鷄

从头年封冻后到第二年解冻前，除大风雪天外，一直将成鷄放在运动場上饲养（如图三）。运动



图三 万鷄場的一角

場面要中間高两边低，两边修有流暢的排水沟，这样不易积水。雨雪后，及时修正場面，扫除积雪，保持場面的干燥。运动場的兩端最好有防风設備，这样即便是在

雪后有风的天气也能照常放鷄。成鷄由于在場外的

經常放养得到了充足的阳光照射，增强了营养，羽毛洁白美观，产卵率也較前提高。

万 鷄 山

蔚县化稍营人民公社所屬的小田洼，位于桑干河南岸，背靠鳳凰山，是丘陵地带，地势高于当地平川五百五十公尺。过去树稀草少、滿山一片荒凉；經過三年来的生产建設，大大改变了模样。不仅鷄兔布滿山沟、还有遍野的花果树木，山上山下裝飾的万紫千紅，出現了前所未有的景象。

由于小田洼土壤瘠薄，丰收的1955年，亩产仅



达90斤。群众中历
有“干山头、穷山
沟，劳苦一年吃一
秋”的歌謠（如图
四）。

图四 未經改造的鳳凰山

大胆的計劃

1956年初實現高級农业合作化后，生产力得到了解放；在党的领导下，社管理委员会提出了一个发展多种經濟的計劃——要在鳳凰山养鷄、在王家坡沟养兔、沟坡培植花果树木。要把荒山变成牧草丛生，花果遍野的万鷄山；要把穷山沟变成綠树成蔭，花草密茂的万兔沟。真正做到地里不收山上收，山上不收沟里收，沟里不收树上收，树上不收圈里收，永远立于不败之地，彻底改变山区的贫困面貌。

万鷄山在困难中成长

这个計劃立即受到了党总支部的重視和多数群众的欢迎与支持；但也遭到少数人的嘲笑和反对。

他們前怕狼后怕虎，不敢想更不敢干。有的說：

“山上沒有水怎么行？”也有的說：“祖祖輩輩沒有在山上养过鷄，更沒听說在沟里养兔，年青的人們就会瞎胡鬧。”虽然受到“保守派”一些冷諷热嘲，但沒有阻擋住积极分子的冲天干劲，他們說：

“在我們的英雄时代里，正是要人們去作前人不敢想更沒有做过的事。”山上沒有水，就发动积极分

子出主意、想办法、开动脑筋、請教老农，在山上找水。当时，党总支書記王步寬和原农业社主任張



图五 社員在清水泉打水

貴忠等帶着工具上山找水，踏遍整个鳳凰山，終于找到了傳說中的“关老爷飲馬水”，挖出了清水泉，解决了用水的問題（如图五）。因此，群众的干劲更足了。

同时，还在山的周圍挖了魚鱗坑、植树、盖鷄舍。人們爬上陡坡担水运料，不怕劳苦、艰苦奋斗，終于战胜了重重困难；在鳳凰山上建起了拥有28間的第一排鷄



图六 鳳凰山上的第一排鷄舍

舍（如图六），并发动了五十多名男女劳力在王家坟

沟将五、六丈的大崖砌成了整齐而又光滑的大沟，沟内挖了一百多个洞穴，沟底修成了平整的运动场，并盖起了三间宿舍，开始了养鸡。

从失败中总结经验教训

鸡山建立不久，由于缺乏饲养管理经验，小鸡上山早，气候的剧烈变化，曾一度造成大批死亡，这样鸡就一天比一天少了。到1957年春，1,700多只鸡，死的只剩下几十只了。这样一来，“保守派、观潮派”又发起了进攻。这个说：“当初就不该闹，真是劳民伤财”；那个说：“不听老人言，吃亏在眼前，怎么样？这回还有啥说的？”埋怨、指责不一而足；部分干部和积极分子也失去了信心，有的还主张散摊子，不想再干下去。可是，张贵忠和一部分积极分子不甘心这样失败，下决心坚持下来。正当这个时候，县委书记史庆祥同志下乡到了该社，有力地支持了“促进派”，并向大家说明“任何新事物的成长都不是一帆风顺的，只要总结经验、接受教训、依靠群众、继续干下去，一定会胜利”。同时帮助党支部和农业社总结了经验教训并组织辩论，统一了思想”；改进了饲养管理，采



取小雞晚上山、分散喂養，專人管理、等措施。雞的死亡率大大減少，成活率都在85%以上，并作到了保質保量、按時交歸社里（如图七）。

图七 万雞山的雞群

养雞发展到一万只

1958年初，为了适应农业生产大跃进新形势的需要，又在山頂、山腰、山脚盖起了四排雞舍共76間；在沟坡又挖了1,200个洞穴，添盖宿舍7間，并确定了专人飼養。組成了一支拥有32人的专业队，种植了苜蓿、南瓜、蔬菜等390余亩飼料作物。現在，鳳凰山已遍布雞群，总数已达10,500多只，同时还进一步健全了飼養制度，分工負責，制定了經常性的飼養管理、防疫卫生及奖惩制度。由于責任明确、奖惩分明，从而大大激发了飼養管理人員的积极性和創造性。他們除种植飼料作物外，还收集

农副产品，采集野草、野菜进行飼料加工。作到了定額管理、分群定槽喂養，采取少添勤喂（大鷄一天四次、小鷄六次）、定时定量的給食飲水，老弱幼小分別加强飼養管理。

在防疫卫生上，每天清舍二次，七天消毒一次，随时注意檢查鷄的营养和吃食情况，病者隔离喂養，特殊照顧，在八月上旬普遍进行了鷄新城疫疫苗刺种。

三年来，在发展养鷄的同时，还挖了12万多个魚鱗坑，普遍种植了桃杏树，現已成活各种树木52,511株，葡萄31架，大片造林10,656亩。在党的正确领导与总路綫的光輝照耀下，过去的秃山头穷山沟一跃变成了“鷄兔滿山沟、花果綠油油”的地方了。万鷄山、万兔沟和花果山的理想，已經逐步变成现实。