



各种代饲品喂猪的经验

陕西人民出版社

各种代飼品喂猪的經驗

赵 汝 成 整 理

陝 西 人 民 出 版 社

一九五八年·西安

各种代飼品喂猪的經驗

赵汝成 整理

陕西人民出版社出版（西安北大街109号）
西安市書刊出版業營業許可証出字第001号
地方國營洛陽印刷厂印刷 新華書店陝西分店發行

787×1092 1/32 · 1 音印張 · 27,040字

一九五八年六月第一版

一九五八年八月第三次印刷

印数：45,001—545,000 定价：(5)一角一分

統一書号：T 16094 · 86

編 者 的 話

節約糧食，廣泛利用代飼品來养猪，是今後我們發展生猪生產解決飼料問題的主要辦法。目前，許多地區的農民喊着飼料缺乏，有的濫宰架子猪、割割母猪、廉價出售和丟棄子猪，其所以發生這種現象，都是由於不善于利用代飼品。一提起养猪就想到糧食，這是不符合節約糧食的原則的。有的農民願意節省糧食，但不知道究竟有那些代飼品可以喂猪，怎樣調制猪才肯吃。這本書里介紹了我省陝南、關中、陝北十幾個縣、鄉、社一百好幾十種用代飼品养猪的好經驗，還介紹了各種代飼品調制的方法。這些經驗和方法告訴我們：“猪吃百樣草，只要人肯找，找盡百樣草，沒糧也長膘。”這些經驗又都是真正的土生土長的完全適合我省各地區的情況，如能加以大力推廣和廣泛利用，我省养猪事業也必定會來個大躍進。

最後，要特別聲明的，是這些材料的來源都是從陝西報、專區報和一些縣報上選擇剪集的。其中有些經驗方法的介紹，比較粗糙浮淺，還不夠細緻具體、鮮明生動。但為了互相交流，取長補短，在這裡把它作為資料性的東西介紹出來，供大家在养猪生產方面學習參攷。

1958年3月

目 录

- 一 談談养猪..... 罗正偉、閻鳳琴 (1)
- 二 介紹我省能喂猪的代用
 飼料和調制方法 陝西省服务廳研究科 (3)
- 三 怎样用青綠飼料喂猪 康巨鶴 (8)
- 四 鎮巴大楮乡解决猪飼料缺乏的办法 鎮巴报 (10)
- 五 沔县余家溝社迅速发展猪群的經驗 沔县报 (13)
- 六 洵阳紅星社不用粮食喂肥猪 陝西日报 (15)
- 七 平利前进社用百草喂猪的方法 安康报 (18)
- 八 城固毛家嶺乡解决猪源、
 飼料問題的办法 郭鵬軒 (20)
- 九 褒城华山乡解决猪飼料問題的經驗 灵 运 (23)
- 一〇 藍田大量社代飼品喂猪經驗..... 林崗、曉风 (25)
- 一一 岐山三联社安下庄队的养猪經驗..... 岐山县报 (27)
- 一二 王三斗用代飼品喂猪的經驗..... 建 本 (30)
- 一三 朝邑县东方紅社生猪丰产經驗 ... 郝拯民、成中和 (31)
- 一四 介紹几种猪飼料 声强、国紅 (33)
- 一五 宜川英明社代飼品喂猪經驗..... 江 虹 (34)
- 一六 我們社里用发酵飼料喂猪的經驗..... 王德彪 (36)
- 一七 米脂五星社对于“缺粮食能不能养猪”
 的辯論..... 侯宗岐 (37)
- 一八 猪的成长需要那些养分? 长安县报 (39)

一 談 談 養 豬

养猪是积肥、增产粮食的好办法，还可以解决城乡人民的吃肉問題，增加出口物資，換回机器，支援国家的建設。对个人說来也可以增加收入。象西安市雁塔区北池头农业社，1956年养猪得純利一万多元，占全年农业收入12.9%。1957年上半年初步估計可得純利二万四千多元。1956年他們社用养猪所得純利买了一千多斤粮食解决了缺粮戶的吃粮問題。同时还买了解放式水車十部、播种机二部、双輪双鐮犁六部、耕牛十五头、騾子二头、还盖了飼养室、倉庫等。从他們的事实来看，养猪的好处是很多的。

怎样才能把猪养肥养大呢？俗話說：「喂猪沒窍，圈干食飽」。从这句话来看，主要的是做好飼养和管理。

一、选择飼料：要使猪长得快、长得肥，先要让猪吃飽吃好。而飼料的选择便是其中的关键問題。猪吃的飼料很多，并不是象有些人所說的一定要吃粮食，沒有粮食就不能养猪。北池头农业社和全国很多农民利用野草野菜喂猪，不仅节约了粮食，而且猪也长的快、长的肥。

根据西安市北池头农业社的試驗，榆錢子、榆树叶、杏树叶、桃树叶、楊树叶、柳树叶、桑树叶、棗树叶、柿树叶、洋槐叶花、枸树叶；野草野菜里的酸溜溜、刺莧叶、地菜、野人莧、苦楝叶、回窖菜、馬齿菜、蒲公英、苦苣菜、喇叭花、野苜蓿、燕麦、野萝卜、扫子菜、牛舌头、摺薺、米蒿蒿、野豌豆、野芝麻、野菊花等，都可以喂猪。还有冬瓜、

南瓜、西瓜、黃瓜、西葫芦等的花蔓、爛瓜等。蔬菜中的紅萝卜、蓮花白的根叶、菜豆叶、茄子叶、辣子叶、萵笋叶和紅苕蔓叶、花生蔓、洋芋蔓、荞麦叶、干壳芝麻叶、向日葵花茎、谷糠、豌豆及各种豆皮等，都是好飼料。这些野草野菜在我們陝西地区多得很，只要我們勤寻找，猪的飼料是根本不成問題的。

二、調制飼料：有了以上这些飼料，如果再适当进行加工調制一下，那喂猪的效果就更好了。調制的办法也很簡單，经常采用的是使飼料发酵。发酵就是把野草野菜树叶等切去硬根，取去泥土，把腐爛的揀去，经过洗淨，切成一寸长，一层一层的裝在缸內，裝到离缸口七、八分的地方，用脚踏实，把磨下的豆浆水（或开水）灌滿，用草盖子或破麻袋盖好，压上石头。过一兩天后，飼料便下沉，再倒上些开水或豆浆水，压实盖好，把缸口用泥封好，使它发酵，大約过六七天就能取出来喂猪了。

三、飼养方法：喂猪是个細致的工作，往往同样的飼料，同样的一槽猪，喂的好了，就长得快，不得病；喂的不好，长得慢，还常常生病，有时还可能死掉。所以喂猪应该注意几点：

（1）飼料要新鮮清洁，过陈和腐爛的飼料，不要喂猪，免得猪吃了消化不好，容易生病。

（2）喂猪要耐心，勤添少放。因为一次添滿一槽，猪就会挑食，不好好吃，如果能夠耐心地勤添少放，猪就能吃飽、吃好。

（3）喂猪次数，大小不一样。大猪一天可以喂兩次，剛断过奶的小猪，一天要喂三、四次。喂的时间，要根据季

节改变，冬天在太阳出来后喂第一次，太阳下山前喂第二次；夏天上午要喂的早，下午要喂的晚些。

(4) 猪饲料，冬天要煮到六成熟再喂，夏天现割现喂最好。在夏天趁野草多的时候，收集一些，晒干、弄碎，贮藏到冬天，煮一煮喂。夏天饲料要凉些，并且新鲜，猪爱吃，冬天，饲料要温暖。

四、細心管理：猪的管理工作，最要紧的是猪圈保持清洁干净。若是潮湿肮脏，猪就容易得病。冬天，猪圈里铺的褥草，要勤换勤晒。猪圈要定期消毒，可用碱水洒，或者经常洒些石灰。每天要让猪在圈外有半小时活动，可以促进它的健康。此外，还要经常给猪洗刷、饮水。冬天每天中午一次，夏天可饮两次。猪槽也要经常洗刷，为了不让槽内剩残渣，当猪每次吃完后，在猪槽内慢慢洒些麸皮，这样猪就把槽内残渣舔干净，不浪费，又卫生。

(西安畜牧学校 罗正伟 閻鳳琴)

二 介绍我省能喂猪的代用

饲料和调制方法

猪是一种杂食性动物，除粮食而外，还有很多代用饲料可以喂猪。尽量争取利用代用饲料来养猪是今后发展生猪生产的主要办法。

猪的代用饲料潜力在我省非常丰厚，以关中来讲，可利用养猪的代饲品有：棉花叶、包谷心、各种豆科枝叶及荚皮、红苕蔓、洋芋蔓……等。好多地方经验证明，棉花叶是一种很好

的代飼料。關中盛產棉花，可收集到大量的棉葉；但以往，農民不知道它能喂豬，使大量的棉葉凋落田野，白白糟踏了。

陝北地區多產雜糧，可利用的代飼品也很多，主要的有：高粱殼、谷殼、南瓜蔓、洋芋蔓、包谷心、各種豆科枝葉及莢皮……等。過去，群眾除高粱殼、谷殼收藏起來用以喂牛羊而外，其餘則視若廢物，隨意拋棄，任雨淋日晒，最後差不多都當柴燒了，合理利用的很少，這是很可惜的。

陝南是本省主要產稻區，而且還習慣大量種植蠶豆。稻殼、蠶豆莖葉都可喂豬，應很好的利用。同時，陝南氣候溫暖，秋播時還套種蘿卜、油菜等，這類作物的葉、根都可作為養豬飼料來利用。

此外，就全省範圍來說，可以利用的代飼品還有取之不尽，用之不竭的樹葉、野草、野菜。例如榆樹、槐樹、桑樹、構樹、棗樹、柳樹、洋槐樹、蘋果樹、沙果樹、杏樹、柿樹等樹的葉子與苦菜、甜苣菜、馬牙菜（有的地方叫肥娃草）、蒲公英、刺莧、灰條、野菠菜、野苣荬、野芹菜、野莧菜、蟋蟀草……等野生植物，都是養豬的寶貴飼料；但必須趁青嫩茂盛時期抓緊採集，越是青嫩營養價值越高。

以上概括地介紹了我省各地區可利用的代飼品，下面我們就着重談談上述各類代飼品的調制方法。

一、豆科枝、葉及莢皮：黃豆、黑豆、綠豆、蠶豆、豇豆等的枝、葉及莢皮含有較多蛋白質與礦物質，營養價值很高，能夠促進豬的肌肉、骨骼的發育，是養豬的好飼料，尤其適合喂架子豬和公、母豬，因此應大量推廣利用。

這類代用品最簡易的調制方法是：在收穫後，先將落坊的碎葉篩過貯存，然後再將枝蔓與莢皮鋸成五分左右的小節，

晒干或烘干再碾再筛，或用磨磨成细粉更好。喂时用开水烫煮柔软，掺合少许糠麸就行。

豆科枝蔓与莢皮是一种粗硬纤维较多的东西，在物质条件允许下，还可采用碱化方法来处理。这种方法也简单易行，只要把切碎的原料浸入以3%的生石灰与400%——500%清水合成的石灰水中，经过一两个钟头捞出来滤干，放一昼夜后就可喂猪。碱化法的优点是能把粗硬纤维变软，猪吃了好消化，而且还增加了饲料的钙质，对猪的生长发育有好处。

二、稻壳、谷壳、高粱壳：这些东西有点粗硬，但是都含有一定的养分，经过适当泡制后都可喂猪。如稻壳约含蛋白质2.74%，脂肪1.93%，碳水化合物12.6%；谷壳和高粱壳也含有多种多样的养料，有维生素、矿物质和不少的脂肪、蛋白质及糖类等，所以都是值得利用的代饲品。

这些壳类代饲品最简易的调制方法，就是先把它放在锅里炒脆或充分晒干，然后用碾子碾细或磨成粉末即行。不过喂时须掺其它饲料，能与油渣混喂最好，配合青饲料喂也行。这种方法适宜于养猪不多、原料量较少的家户采用。集体养猪而又有大量原料的农业社或饲养单位，还可采用另一种方法，就是变糟法。这个方法比较复杂，需要时间也较长。但可以提高饲料的营养价值和适合猪的口味。用这个方法处理时，还可掺些青绿的野草、野菜、树叶、豆叶等。变糟的具体办法是：先把各种原料混合起来，加水搅匀（水加至能用手把原料捏成块并稍有小水点下滴时为宜），然后填入窖内，踩实、封严，上盖以二、三尺厚的土，经过四、五个月后，窖内原料即发酵变糟，质地松软，并带有酒香味，

猪很喜爱吃。这样的饲料，母猪和架子猪可喂全日饲料量的四分之三，肥猪可喂二分之一。

三、包谷心：过去，我省农民一般的都把包谷心当作了燃料，其实它是一种很好的饲料。它含有较多的糖类，能在体内发生大量的热，能增强猪的各种机能活动作用；同时也能增加体内脂肪的功效，故适合催肥用。调制方法有两种：一种是把脱粒的包谷心晒干或炕干，先用木棒或斧头砸碎，再碾或磨成细粉就行。喂时煮熟，并配合些野草、野菜或与煮熟的泔水掺喂为宜。另一种方法是：把包谷心晒干碾碎，放在锅内煮后再浸泡一昼夜，然后用磨豆腐的办法磨成细糊来喂猪。这样处理可以提高饲料的消化率，猪也喜欢吃，有条件时应推广采用。只是这样处理的饲料不能象用第一种方法处理的那样便于长久保存，此外别无缺点。

四、红、白苕蔓、洋芋蔓、花生蔓、南瓜蔓：这些东西都有一定的营养价值，许多地方已经利用得很有成效。这些蔓类代饲品一般适宜采用青贮办法来处理。红、白苕蔓及白皮品种的洋芋蔓，在收获时，一般茎叶青绿，是良好的青贮原料。花生蔓可在掏花生前收割，据有些地方试验的结果，在收获花生的前10天，离地三寸割取上部青绿的枝叶，并不影响花生的成熟与产量。总之，这些蔓类代饲品在不影响其果实成熟的前提下都应尽早收割，以保持其青绿多汁的特点；至少应争取在下霜前收割，如一旦被霜打，不仅质量降低，且不易保存。这些蔓类都不宜单独青贮，适宜混贮，如红白苕蔓可与20%的花生蔓及5%至8%的谷糠混贮，南瓜蔓、洋芋蔓可与包谷叶秆对半混贮，也可与含糖较多的其他代用品如萝卜叶或者再加上5%的谷糠混贮，这样可以改良饲料的质

量 and 口味。青貯原料的含水量一般在70—75%为宜，如含水量过多，可晾一下再裝窖，不足时应噴洒适量的清水。

五、白菜帮、根：白菜帮和白菜根是一种多汁飼料，含有較多的糖类养分，猪很喜爱吃。在秋季收穫白菜时，应将剝下的菜帮子（亦叫边叶）全部收集起来，把菜根也随时切下收集起来，然后洗淨青貯。如与10%的谷糠混貯，气味將比單貯更好。喂猪时切碎煮熟，也可生熟掺合来喂。

六、萝卜茎叶：白萝卜、紅萝卜、黃萝卜、胡萝卜等的茎叶不仅含有很多糖分，而且还有丰富的維生素，营养价值很高，是猪喜爱吃的一种多汁青飼料。萝卜茎叶可采用風干法或发酵法来調制。前一种方法簡單易行，但飼料的营养不免要受些損失。其具体調制过程是：先把萝卜茎叶捆成小把或扎成辮子，掛在能避雨遮光的地方，让它慢慢風干后压碎貯存。喂时燙軟，与粉渣、豆漿、泔水掺合喂較好。后一种方法帶些技术性，比較麻煩，但能提高飼料的利用率，改善飼料味道，促进猪的食欲。其具体操作法近似腌酸菜，即先把萝卜茎叶洗淨切碎（五分——一寸长），煮到六、七成熟（或把三分之一煮为六、七成熟，或完全不煮亦可，不过煮熟发酵猪更爱吃），然后裝入磁缸內，一层一层压实。缸裝至八成滿时为止。最后用石头压住（不要加盖，如遇天雨則要盖严），再向缸里倒入泔水或清水，經常使之淹过原料二寸，以隔絕外界空气接触，防止腐爛变質。这样经过5至7天即可喂猪。如酸性过强，猪不爱吃，喂时可加些食盐或用清水淘一下。

七、棉花叶：棉花叶也含有不少的糖类养分，应广泛采集利用。采集的方法很多，一种是在棉花成熟前进行采摘基叶

与疯长枝（这对棉花成熟非但无影响，且有促进作用）；一种是在收花时附帶摘集老叶；再一种是采集棉花秆未拔前着在上边的叶子或拔后保留的干叶。棉叶的調制法最簡單，即將收集起来的棉叶阴干碾碎，篩去粗糙的渣滓后保存在干燥的地方，喂时用沸水燙軟，摻合些糠麸或糟等其他飼料。

八、树叶、野草、野菜：前述各种树叶都含有丰富的蛋白質、鈣質和維生素；各种野草、野菜的营养价值更高，有丰富的蛋白質和維生素，尤其維生素的含量是其他飼料所不及的。这类代飼品都可采用发酵法处理；可以煮熟后发酵，亦可生发酵；可以单独发酵，也可加些糠麸发酵。如单独发酵，喂时要拌些糠麸或豆渣，这样可提高飼料营养，猪也肯吃。发酵好的飼料如短时不能喂完，可将缸口用泥封严，放置阴凉处，这样可保存兩三月不坏。采来的野草，野菜要是青嫩的話，頂好青飼，这样养分更多；数量多的話还可青貯，以保持其青綠新鮮的特点。

以上仅是擇其主要者加以介紹，其实各地区可寻找到的代用品絕不止这些，只要稍加重視，还能找到很多种。至于調制方法同样不限于上述种种。飼养工作者在实践中仍可创造出更多更好的調制方法来，并且使現有的調制方法进一步得到改进！

（陕西省服务廳研究科）

三 怎样用青綠飼料喂猪

俗話說：“猪多，糞多，粮食就打的多”。这是說养猪

的好处很多。現在农家养猪，一般都需要找青綠飼料，就是用各种树叶、野菜，野草給猪吃。这些飼料要让猪吃的好，在喂的时候，需要加工。这里介紹几种加工的方法：

一、切碎煮熟法：把采集来的树叶、野菜先用水洗淨，切成寸半长，放在鍋里煮一兩开，撈出来放凉，就可喂猪。有些树叶、野菜有苦味，还須在煮后放入清水內浸泡半天或一天，使去掉苦味和毒液，才能喂猪。这样做不但可以杀死病菌，軟化飼料，猪喜欢吃，容易消化，还能充分吸收飼料里的养分。

二、发酵法：一种是发酵悶軟。就是把采集来的树叶、野菜，經過洗淨，切碎（一寸长），放到鍋里煮七、八开后，撈出来裝到缸里，踏实，等到缸裝滿八成时，压上一块大石头，倒滿水。大約3至4天后，就完全发酵，能取出喂猪。有的还把煮熟的东西掺入一半多未煮的青飼料合用。另一种是糠麸发酵。把煮好的飼料和糠麸（玉米粉，豆餅也可），同时放在缸里发酵。裝缸的时候，放一层煮好的飼料（放三至四寸厚），再放一层糠麸（一寸多厚）。并且层层踏实，等到缸裝滿八成时，加滿水或豆漿，过上4至6天发酵后，就能取出喂猪。如果这些飼料一时用不完，或者准备以后用，还可阴干或碾碎囤貯。

三、碾碎浸泡法：这种方法是把阴干的树叶、野菜，經過碾碎、篩过（篩剩下的大的不用），然后放入缸內，加上溫水浸泡。天冷时，浸泡3至5天，天热时，浸泡一兩天，一般浸泡1至5天即可。浸泡过的飼料，应是用手摸去柔軟，指捻容易碎最好，有些群众把浸泡的飼料加入三分之一的玉米心粉，糠麸，油餅等，拌勻，或者把浸泡过的飼料，

取出再煮兩三开，又放凉喂猪的办法也好。

四、砸碎碾面：这种方法是把收集的玉米心，油餅等，经过砸碎，碾面或磨成粉后，加入湯水，喂給猪吃。不过，应当注意，在給猪喂这种飼料时，还須掺入树叶和野菜。有些地方的群众还把玉米心经过砸碎，放到鍋里煮后，浸泡一夜，再经过象磨豆腐一样，磨成細模糊一样来喂猪。这样使猪对玉米心的营养物利用率高，但制成后不可久放。

上面这些经过加工的飼料，在給猪喂的时候必須要注意以下几点。

(1) 不要单独用发酵飼料喂猪，应配合玉米心粉，糠、麸或未发酵的飼料喂；小猪可以少配合些，克郎猪以后配合飼料要逐渐加多。

(2) 喂时要勤添。克郎猪习惯后可尽量加多。母猪产前和产后半个月不喂或少喂发酵飼料。母猪生猪仔半月后，每半个月可逐渐增加喂量。此外，对大母猪每日喂食盐二钱，能增进食欲，帮助消化。

(3) 喂量要以猪的大小、习性和食欲增加或减少，并应生熟間喂，以补偿某些养分的不足。

(4) 为了增进猪的食欲，可用玉米心粉、糠、麸，在喂时边撒边搅，猪就舐尽吃光，避免浪费。

(康巨鶴)

四 鎮巴大猪乡解决猪飼料缺乏的办法

鎮巴县大猪乡1957年生猪生产：按戶計算，每戶平均养

猪十二头：按人計算，平均每人养猪兩头半，大大地突破了沔县余家溝社創造的每戶平均养猪七头半，每人平均养猪一·二七头的先进事迹。超过了全国农业发展綱要（修正草案）要求1967年达到农村平均每戶养猪二头半到三头的三倍。

大楮乡位于大巴山区，全乡四百四十戶、二千另六十三人，共有十二个农业社。据10月份調查統計：全乡圈存猪一千八百七十六头，其中母猪四百三十五头，种公猪九头、肥猪和架子猪一千四百三十二头，連1957年出售的仔猪三千四百另四头，共五千二百八十头，平均每戶养猪十二头，平均每人养猪兩头半。比1956年全乡养猪一千三百五十三头增加三点九倍。1958年1月尚有一百七十二头母猪怀孕待产，每头母猪产仔猪成活按七头計算，还可生仔猪一千二百另四头。計劃到1958年底全乡养猪可达六千四百八十四头，每戶平均养猪达十四点七头，每人平均养猪超过三头。

該乡大量养猪的結果，全乡光养猪收入就可达六万另五百六十元，平均每戶收入可达一百三十七元，預計可接近甚至超过全年农业收入。由于养猪收入的增加，当地农民生活也得到了改善。如林家湾社簡家槽村的貧农胡繼蘭，全家兩個大人，兩個孩子，1957年养肥猪三头、母猪三头，光出售小猪就收入二百七十多元，还积肥一万九千多斤。养猪收入不但保証了吃油、鹽、穿新衣、零用等开支外，还新修了新草房、买了兩床花被子。据統計：全乡主要靠喂猪增加收入修新房的有五十七戶，修房一百四十八間。

大楮乡养猪事业能获得如此大发展的原因主要是：

一、加强領導，干部帶头；抓住問題关键，利用当地真人真事進行宣傳，发动农民多喂猪。自中共中央和国务院发布

关于发展生猪生产的规定后，乡上成立了生猪生产指导委员会，专门负责领导，该乡生猪生产委员会认为要大量发展养猪业，必须首先多喂母猪，繁殖仔猪；同时干部必须带头。该乡所有乡、社干部都热烈地响应这一号召，全乡十二个农业社的生产队长以上干部一百一十九人，其中除两人没喂母猪外，其余一百一十七名干部共喂养一百三十一头母猪。如林家湾社付主任胡繼蘭、长嶺社付主任邹凤蓮、老屋基社的生产队长甯美順各喂了三头母猪。在干部带头喂母猪的同时，党支部又利用本乡的真人真事：如茶园社贫农高建西和大溝社社員段永貴、謝立珍等戶自1953年开始，就各喂母猪两头，逐年增加收入，因而修起了十一间住房、四间猪圈、添置了七床花被子的事例来向当地农民进行宣传，从而掀起了全乡喂母猪、多喂猪的热潮。许多没有喂母猪的农民都主动地通过亲戚、邻居关系互相赊欠、伙喂等办法喂起了母猪。如林家湾社在付主任胡繼蘭的宣传教育和带动下，全社喂猪五十一头，1957年已售出小猪四百二十头。以全乡来说四百四十戶就喂了四百三十五头母猪，平均每戶近一头。

二、既从多方面挖掘飼料潛力，又培植了永久性的飼料来源。大楮乡因山坡地多，土地瘦薄、粮食产量不高，因此不可能用粮食来发展该乡的养猪业。那末又如何解决飼养問題呢？他們首先是尽量利用农村产品，如黃豆叶、小豆叶、胡豆叶、燕麦糠等十多种。其次是充分利用野草、树叶来喂猪。俗話說“猪吃百样草，看你找不找”。經大楮乡农民找到可供猪吃的猪草、树叶如次江花、黃狗头、鵝雞婆、秦巴子、構叶、野桑叶、家蚕叶等共一百多种。勤劳的农民不論天晴、下雨都在找猪草，参加社里劳动时，也隨身帶上背